

KISS ANDREI

Prin bunăvoința d-lui Manci Cosmin din Timișoara s-a semnalat faptul, că la Pescăria Ghiroda Nouă, lângă Timișoara, la data de 22. 09. 1996 s-au capturat 2 exemplare de **Stercorarius parasiticus** (L.), lup-de-mare mic, dintr-un grup de 3 exemplare, care zburau după insecte la 1-1,5 m distanță față de cel care l-a împușcat. Păsările au fost naturalizate, 1 exemplar, balg, fiind cedat "Colecției ornitologice D. Linția" de la Muzeul Banatului din Timișoara.

Această specie, ce cuibărește pe insulele și zonele litorale arctice, la nord de 60° latitudine nordică, nu a fost semnalată, nici ca apariție accidentală, în Banat. În perioada pasajelor, de regulă toamna (IX-X) apare, aproape cu regularitate, pe litoralul Mării Negre, în compania pescărușilor. De la aceștia consumă hrană vomitată în urma goanei la care le supune. Altădată consumă broaște, pui de păsări, ouă, mamifere mici, insecte și chiar cadavre. S-a observat, când migrează în zonă fără apă, ciugulind fructe mărunte de toamnă (KEVE, A.).

Având în vedere variabilitatea accentuată a penajului, în special la juvenili, în literatură se atrage atenția (1), că în natură se pot confunda ușor speciile **Stercorarius parasiticus** cu **Stercorarius longicaudus**.

Considerând util, în speranța redescoperirii apariției speciilor de **Stercorarius** și în alte zone, să prezentăm aici, în comparație, datele biometrice ale exemplarelor noastre, cu cele din literatură accesibilă nouă, (Tabel 1), precum și părerea renumitului ornitolog bănățean DIONISIE LINȚIA, hotărâtoare în determinările viitoare. După el pasărea adultă se prezintă astfel: Scufia capului este brun negricioasă, conturată aspru cu alb, culoarea care acoperă laturile capului, gâtul și gușa; mantaua, încapând de la cerbicea ocru-gălbuie, este ușor sur-cenușie; de asemenea și părțile de dedesubt, dar ceva mai deschise; remigele sunt negru-brunatice; rectrice la negru-brunatice mat, la vârf cel mai închis. Ciocul negru, ceara și colțul gurii verde-alunii. În schimb pasărea tânără de **Stercorarius parasiticus** se prezintă astfel: Mantaua este brună ca ciocolata, cu dungi albe tulburii, semiluanre, la capătul penelor; fața, capul și grumazul posterior sunt sur-brunatice deschis cu pete rahiale întunecate; gâtul este albicios, pieptul ușor pătat cu sur-închis, pânțele alb curat, iar spre laturi galben-brunatic deschis, bandat întunecat. Ciocul albastru plumburiu. Picoarele albastru-

plimburi. Membranele înotătoare albicioase. Irisul brun. După această prezentare a penajului, pasărea aflată la Muzeul Banatului dar și celălalt, par a fi exemplare tinere, aproape tipice.


Un caracter de identificare pentru **Stercorarius parasiticus** este, că rectricele mediene nu depășesc pe celelalte niciodată cu mai mult de 11 cm (pe când la **Stercorarius longicaudus** depășește întotdeauna cu cel puțin 16 cm, ajungând la 20 cm). Totuși la o vârstă tânără această comparație este anevoioasă.

Cel mai bun criteriu, spune D. LINȚIA, după care ne putem conduce la identificarea precisă a acestor două specii este culoarea rachiselor de la primele patru remige, care la **Stercorarius parasiticus** sunt albe, suflate ușor cu un galben ca paiul, cu steagul intern spre rădăcină alb, iar vârfurile rachiselor de la rectrice par a fi ieșite puțin în afară (la **Stercorarius longicaudus** se termină rotunjite).

Tabel nr. 1


Autori de referință Dimensiuni biometrice	LINȚIA, D.	KEVE, A.	TIMIȘOARA	
			ex. 1/Mascul	ex. 2/Mascul*
Lungime aripă	32-33 cm	30,5-32,8 cm/M 30,5-32,2 cm/F	33,6 cm	3,5 cm
Lungime totală	45-47 cm	-	51,6 cm	54,3 cm
Lungime tars	4,3 cm	4,2- 4,5 cm	4,1 cm	4,3 cm
Lungime cioc	3 cm	2,7- 3,5 cm/M 2,7-3 cm/F	2,9 cm	3 cm
Lungime coadă	-	17,5-21,5 cm/M 17-20,5 cm/F	22,9 cm	21,6 cm
Lungime talpă (deget mijlociu)	-	-	5,6 cm	5,3 cm
Lungime gheară posterioară	-	-	0,5 cm	0,5 cm
Amvergura	-	-	97 cm	103 cm
Greutatea	-	306-585 g/M 315-636 g/F	370 g	405 g
Lungimea cozii la a V-a pereche de rectrice	12,6-14,1 cm	-	14 cm	13,9 cm
Lungimea cu care rectricele median depășește pe celelalte	max. 11 cm	-	8,9 cm	7,7 cm

* - în colecția Muzeului Banatului Timișoara



Stercorarius parasiticus (L.) 1758

Lup-de-mare mic
Ghiroda Nouă/Jud. Timiș
22.09.1996



Stercorarius parasiticus (L.) 1758

Lup-de-mare mic
Ghiroda Nouă/Jud. Timiș
22.09.1996

STERCORARIUS PARASITICUS (L.) 1758 IM BANAT

Zusammenfassung

Am 22 September 1996 neben Temeswar Wurden 2 Exemplare **Stercorarius parasiticus (L.) 1758** geschossen. Diese Art wurde bis jetzt im Banat nicht beobachtet.

BIBLIOGRAFIA

1. LINȚIA, D., (1955) - Păsările din R.P.R., Ed. Academiei R.P.R., vol. III, pp. 389-392, București.
2. KEVE, A., (1973): Aves, Madarak, Akad. kiad., pag. 6/45, Budapest.

Adresa autorului:

KISS ANDREI
Muzeul Banatului Timișoara
P-ța Huniade nr. 1
1900 Timișoara
România