

B. C. U.

248478

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Seminar științific

SPAȚII LINIARE ORDONATE TOPOLOGICE

Conducător științific :

Prof. dr. doc. ROMULUS CRISTESCU

Membru corespondent al Academiei
R. S. România

Nr. 3 (1982)

BUCUREȘTI — 1982



BIBLIOTECA CENTRALĂ
UNIVERSITARĂ
BUCUREȘTI

Cota 248678
Inventar 642800

Seminar științific

SPATII LINIARE ORDONATE TOPOLOGICE

Conducător științific

PROF. DR. DOC. ROMULUS CRISTESCU

Membru corespondent al Academiei R.S.R.

Nr. 3 (1982)

Tipografia Universității din București

Biblioteca Centrală Universitară	
BUCUREȘTI	
Cota	248 400
Inventar	642.300

P R E F A T A

Scopul publicației de față, acum la numărul 3, este de a prezenta unele rezultate din acele domenii ale analizei funcționale care au constituit obiectul preocupărilor membrilor seminarului științific de Spații liniare ordonate topologic. Funcționând de 15 ani la Facultatea de Matematică din București, seminarul menționat reunește un număr însemnat de matematicieni din diverse centre universitare din țară. La el au participat și unii matematicieni străini veniți la doctorat sau specializare.

În anul 1980 a fost organizat primul colocviu național al acestui seminar, care s-a desfășurat la Craiova între 25 și 27 octombrie. Au urmat al doilea colocviu desfășurat la Brașov (13-15 iunie 1981) și al treilea colocviu la Craiova (15-17 mai 1982).

Prezentul număr conține câteva articole al căror conținut a făcut obiectul conferințelor la cel de al treilea colocviu. Sînt incluse de asemenea rezumatele unor comunicări prezentate la același colocviu.

CUPRINS

Articole

pag.

1. Romulus Cristescu - Asupra unor topologii local solide
pe spații liniare ordonate 1
2. Constantin Niculescu - Progrese recente în teoria
operatorilor definiți pe latici Banach 30
3. G.Păltineanu - Conuri laticiale în teoria aproximării . . . 46
4. Nicolae Popa - Spații simetrice p-normate ($0 < p < 1$) . . . 66

Comunicări (rezumate)

1. Mircea Cîrnu - Operatori liniari Carleman 85
 2. Romulus Cristescu - Operatori liniari pe spații de funcții
vectoriale. 87
 3. Gh. Grigore - Siruri Vitali convergente 89
 4. Stelian Găină - Măsurii vectoriale pe latici 91
 5. Eufrosina Minzatu - O teoremă de reprezentare cu aplicații
în termodinamică 97
 6. Octav Olteanu - O teoremă de prelungire a unor operatori
afini 99
 7. Mircea Popovici și Ovidiu Sandru - Ultraproduse de spații
reticulate cvasinormate 100
 8. Nicolae Tița și Horiana Tudor - Aplicații ale numerelor
de entropie ale unui operator 101
 9. George Turcitu - Operatori mărginiți pe latici Banach . . . 103
 10. Mihai Voicu - Semigrupuri pozitive pe latici local-convexe 105
 11. Constantin Volintiru - Spații Banach separabile cu dual
neparabil 107
 12. Dan Vuza - M-produse tensoriale perfecte de latici Banach
perfecte. 108
- Lista referatelor prezentate la seminarul științific . . . 110

Asupra unor topologii locale solide pe

spații liniare ordonate

de

Romulus Cristescu

În acest articol se prezintă unele din principalele rezultate privind topologiile locale solide semi (ω) -continue pe spații liniare reticulate, precum și câteva rezultate privind topologiile semi (o) -continue, sau topologiile care satisfac "condiția (A_0) ". Prin definiție, o topologie liniară pe un spațiu liniar reticulat, satisface condiția (A_0) , dacă orice șir crescător și majorat de elemente ale spațiului, este un șir (τ) -Cauchy. Această condiție este necesară și suficientă pentru ca o topologie local solidă și semi (ω) -continuă, să fie (ω) -continuă.

Conținutul acestui articol se bazează pe rezultatele autorilor trecuți în bibliografia de la sfârșitul articolului.

Terminologia utilizată este cea din [9].

Pentru diverse noțiuni de teoria spațiilor liniare ordonate a se vedea și [10].

§ 1. Topologii liniare pe spații liniare reticulate

Toate topologiile considerate în acest articol vor fi presupuse topologii separate. Notăm prin N mulțimea numerelor naturale și prin R mulțimea numerelor reale. În cazul unui spațiu liniar ordonat topologic, vom indica prin litera o referirea la ordine (de exemplu: mulțime (o) -mărginită) și prin τ referirea la topologia dată pe spațiul considerat (de exemplu: mulțime (τ) -mărginită).

În tot articolul vom nota cu X un spațiu liniar reticulat arhimedian.

Definiția 1.0 Mulțime $A \subset X$ se numește mulțime Fatou,

dacă este solidă și dacă pentru orice șir generalizat crescător $\{x_\delta\}_{\delta \in \Delta}$ de elemente pozitive din A , pentru care există $x = \bigvee_{\delta \in \Delta} x_\delta$ rezultă $x \in A$. Dacă șirul generalizat se înlocuiește cu un șir ordinar atunci A se numește mulțime σ -Fatou.

Definiția 2. Se numește topologie Fatou pe X , orice topologie liniară τ pe X pentru care există o bază de vecinătăți ale originii formată din mulțimi Fatou. Dacă mulțimile Fatou se înlocuiesc cu mulțimi σ -Fatou, atunci τ se numește topologie σ -Fatou.

Topologiile Fatou (resp. σ -Fatou) se mai numesc și topologii local solide semi (ω)-continue (resp. semi (o)-continue).

Definiția 3. Se numește seminormă Fatou pe X , orice seminormă solidă p pe X care are proprietatea: dacă $0 \leq x_\delta \uparrow x$, atunci $p(x_\delta) \uparrow p(x)$. Dacă șirul generalizat se înlocuiește cu un șir ordinar, atunci p se numește seminormă σ -Fatou.

Observația 1. Se poate arăta că dacă p este o seminormă solidă pe X , atunci condiția ca p să fie o seminormă Fatou este echivalentă cu condiția: dacă $\{x_\delta\}_{\delta \in \Delta}$ este un șir generalizat de elemente din X și dacă există $\{\nu_\delta\}_{\delta \in \Delta}$ cu $|x_\delta - x| \leq \nu_\delta, \forall \delta \in \Delta$ iar $\nu_\delta \downarrow 0$, atunci

$$p(x) \leq \lim_{\delta \in \Delta} p(x_\delta)$$

Analog, o seminormă solidă p pe X este o seminormă σ -Fatou, dacă și numai dacă

$$x = (o)\text{-}\lim_{n \in \mathbb{N}} x_n \implies p(x) \leq \lim_{n \in \mathbb{N}} p(x_n)$$

2. O topologie local convexă pe X este o topologie Fatou (resp. σ -Fatou) dacă și numai dacă este definită de o mulțime de seminorme Fatou (resp. σ -Fatou).

Definiția 4. O topologie liniară τ pe X satisface condiția (A_0) , dacă orice șir crescător și majorat de elemente pozitive din X este (τ) -Cauchy.

Observația 3. Dacă o topologie liniară τ pe X satisface condiția (A_0) , atunci orice șir generalizat crescător și majorat de elemente pozitive din X este (τ) -Cauchy.

Intr-adevăr, fie $0 \leq x_\delta \uparrow_{\delta \in \Delta}$ și $x_\delta \leq y, (\forall \delta \in \Delta)$. Dacă $\{x_\delta\}_{\delta \in \Delta}$ nu ar fi (τ) -Cauchy, atunci fie W o vecinătate a originii astfel ca pentru orice $\delta \in \Delta$ să existe $\delta', \delta'' \gg \delta$ cu $x_{\delta'} - x_{\delta''} \notin W$. Prin inducție, putem obține un șir crescător de indici $\{\alpha_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ așa ca $x_{\alpha_{n+1}} - x_{\alpha_n} \notin W$ ceea ce contrazică faptul că X satisface condiția (A_0) .

Teorema 1. Dacă τ este o topologie local solidă pe X , următoarele condiții sînt echivalente:

- (i) Topologia τ este (ω) -continuuă,
- (ii) Topologia τ este Fatou și satisface condiția (A_0) .

Demonstrație. (i) \Rightarrow (ii). Dacă topologia τ este (ω) -continuuă, atunci orice mulțime solidă și (τ) -închisă este o mulțime Fatou. De aici rezultă că τ este o topologie Fatou.

Fie acum $0 \leq x_n \uparrow_{n \in \mathbb{N}}$ și $x_n \leq y_0, (\forall n \in \mathbb{N})$. Să notăm cu A mulțimea majoranțelor șirului $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ și fie

$$B = \{y - x_n \mid y \in A, n \in \mathbb{N}\}$$

Evident $B \subset X_+$. Fie acum z un minorant oarecare al lui B . Din $z \leq y - x_n, \forall y \in A, \forall n \in \mathbb{N}$, rezultă $y - z \in A$. Prin inducție, obținem $y - mz \in A, \forall m \in \mathbb{N}, \forall y \in A$. În particular, $x_1 \leq y_0 - mz, \forall m \in \mathbb{N}$, deci $mz \leq y_0 - x_1, \forall m \in \mathbb{N}$. Spațiul fiind arhimedian rezultă $z \leq 0$. Deci $\inf B = 0$. Mulțimile A și B fiind dirijate la stînga, există un șir generalizat $\{y_\delta\}_{\delta \in \Delta}$ de elemente din A , astfel ca, notînd $\Lambda = \Delta \times \mathbb{N}$ și $z_\lambda = y_\delta - x_n$ pentru $\lambda = (\delta, n)$, să avem $z_\lambda \downarrow_{\lambda \in \Lambda} 0$. Rezultă, prin ipoteză, $(\tau)\text{-}\lim_{\lambda \in \Lambda} z_\lambda = 0$. Fie W o vecinătate oarecare a originii și W_0 o vecinătate echilibrată a originii așa ca $W_0 + W_0 \subset W$. Fie $\lambda_0 = (\delta_0, n_0) \in \Lambda$ așa ca $z_\lambda \in W_0$ dacă $\lambda \gg \lambda_0$. Dacă $n \gg n_0$, atunci din

$$x_n - x_m = (x_n - y_{\delta_n}) + (y_{\delta_n} - x_m) \in W_0 + W_0 \subset W$$

rezultă că $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ este un șir (τ) -Cauchy.

(ii) \Rightarrow (1). Fie $x_{\delta} \downarrow 0$. Cu condiția (A_0) rezultă că $\{x_{\delta}\}_{\delta \in \Delta}$ este un șir generalizat (τ) -Cauchy. Într-adevăr, în caz contrar, fie W_0 o vecinătate a originii astfel încît pentru orice $\delta \in \Delta$ să existe $\delta', \delta'' > \delta$ cu $x_{\delta'} - x_{\delta''} \notin W_0$. Prin inducție se poate obține un șir crescător de indici $\{n_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ astfel încît $x_{n_{k+1}} - x_{n_k} \notin W_0$. $\forall n \in \mathbb{N}$. Avem $0 \leq x_{\delta_n} - x_{\delta_{n+1}} \uparrow$ și $x_{\delta_n} - x_{\delta_{n+1}} \leq x_{\delta_n}$, dar $\{x_{\delta_n} - x_{\delta_{n+1}}\}_{n \in \mathbb{N}}$ nu este un șir (τ) -Cauchy, ceea ce contrazică condiția (A_0) .

Fie acum W o vecinătate Fatou oarecare a originii. Există deci $\delta_0 \in \Delta$ așa ca $x_{\delta_0} - x_{\delta_0''} \in W$, dacă $\delta', \delta'' > \delta_0$. Pentru un indice $\delta' > \delta_0$ avem

$$0 \leq x_{\delta'} - x_{\delta''} \uparrow \begin{matrix} \delta'' > \delta' \\ \delta'' > \delta' \end{matrix} x_{\delta'}$$

deci $x_{\delta'} \in W$, dacă $\delta' > \delta_0$. Rezultă (τ) - $\lim_{\delta \in \Delta} x_{\delta} = 0$, adică topologia τ este (ω) -continuă.

Observația 4. Dacă X este un spațiu liniar reticulat topologic, (τ) -complet și cu topologia (ω) -continuă, atunci X este complet reticulat.

Într-adevăr, dacă $0 \leq x_{\delta} \uparrow \Delta$ și $x_{\delta} \leq a$, ($\forall \delta \in \Delta$), atunci cu teorema 1 și Observația 3, rezultă că $\{x_{\delta}\}_{\delta \in \Delta}$ este (τ) -Cauchy. Spațiul X fiind (τ) -complet, există $x = (\tau)$ - $\lim_{\delta \in \Delta} x_{\delta}$ și avem $x_{\delta} \uparrow x$ (căci spațiul are con închis).

Exemple (1). Pe spațiul $C([0,1])$ (al funcțiilor reale continue definite pe segmentul $[0,1]$) înzestrat cu ordinea punctuală, topologia dată de norma obișnuită este semi (ω) -continuă.

(2) Fie $B(T)$ spațiul liniar complet reticulat (cu ordinea punctuală) al funcțiilor reale mărginite, definite pe o mulțime infinită. Topologia convergenței punctuale pe $B(T)$ este o topologie (ω) -continuă, iar topologia dată de norma obișnuită este semi (ω) -continuă, dar nu este (ω) -continuă.

(3) Fie T o mulțime oarecare (nevidă) și

$$c_0(T) = \{x: T \rightarrow \mathbb{R} \mid \{t \in T \mid |x(t)| \geq \varepsilon\} \text{ finită}, \forall \varepsilon > 0\}$$

Cu operațiile obișnuite și ordinea punctuală $c_0(T)$ este un spațiu liniar complet reticulat, iar formula

$$\|x\| = \sup\{|x(t)| \mid t \in T\}$$

definește o normă solidă și (ω) -continuă pe $c_0(T)$ (față de care spațiul este și complet).

(4) Să considerăm spațiul (l^2) cu ordinea și norma obișnuită. Topologia normei este solidă și (ω) -continuă. Dacă $\mathcal{R}((l^2))$ este mulțimea operatorilor regulați care aplică (l^2) în el însuși iar $\mathcal{L}((l^2))$ mulțimea operatorilor liniari (τ) -continui (care aplică (l^2) în el însuși), atunci $\mathcal{R}((l^2)) \subset \mathcal{L}((l^2))$. Cu operațiile și ordinea obișnuite, $\mathcal{R}((l^2))$ este un spațiu liniar complet reticulat, dar restricția la acest spațiu, a normei obișnuite de pe $\mathcal{L}((l^2))$, nu este o normă Fatou.

§ 2. Unele proprietăți ale topologiilor Fatou

Teorema 2. Dacă X este însestrat cu o topologie Fatou τ , atunci există o topologie Fatou $\tilde{\tau}$ și numai una pe extensia Dedekind \tilde{X} a lui X , așa ca $\tilde{\tau}/X = \tau$

Demonstrație. Fie \mathcal{W} o bază de (τ) -vecinătăți Fatou ale originii în X . Pentru orice $V \in \mathcal{W}$ să punem

$$\tilde{V} = \{y \in \tilde{X} \mid \exists \{x_\delta\}_{\delta \in A} \subset V, 0 \leq x_\delta \uparrow |y|\}$$

Are loc egalitatea

$$\tilde{V} = \{y \in \tilde{X} \mid 0 \leq x \leq |y|, x \in X \Rightarrow x \in V\} \quad (1)$$

Intr-adevăr, dacă $y \in \tilde{V}$, atunci $0 \leq x_\delta \uparrow |y|$ cu $x_\delta \in V$; dacă $0 \leq x \leq |y|$ cu $x \in X$, atunci $0 \leq x_\delta \wedge x \uparrow x$ iar $x_\delta \wedge x \in V$ (căci V este solidă), de unde $x \in V$, căci V este mulțime Fatou. Reciproc, dacă $y \in \tilde{X}$, $0 \leq x \leq |y|$ și $x \in X$ implică $x \in V$, atunci din $0 \leq x_\delta \uparrow |y|$ cu $x_\delta \in X$ rezultă, prin ipoteză, $x_\delta \in V$, deci $y \in \tilde{V}$.

Pentru orice $V \in \mathcal{W}$, mulțimea \tilde{V} este absorbantă și solidă, după cum se verifică cu ușurință. Dacă $V, V_0, V_1, V_2 \in \mathcal{W}$

atunci

$$\widetilde{V_1 \cap V_2} \subset \widetilde{V_1} \cap \widetilde{V_2}$$

$$V_0 + V_0 \subset V \Rightarrow \widetilde{V_0} + \widetilde{V_0} \subset \widetilde{V}$$

Dacă $0 \leq y \uparrow y$ în \widetilde{X} cu $y \in \widetilde{V}$, atunci pentru orice y_0 , există un șir generalizat $\{a_{\sigma_i \lambda_i}\}_{\lambda_i \in \Lambda(\sigma_i)}$ de elemente din $V \cap X_+$ astfel încît $a_{\sigma_i \lambda_i} \uparrow y_0$. Pentru orice $\sigma_i \in \Delta$ și $\lambda_i \in \Lambda(\sigma_i)$, ($i=1,2,\dots,n$) avem (în baza lui (1)) $\bigvee_{i=1}^n a_{\sigma_i \lambda_i} \in V \cap X_+$ iar mulțimea elementelor de forma $\bigvee_{i=1}^n a_{\sigma_i \lambda_i}$ este dirijată la dreapta. Deci y se poate reprezenta ca marginea superioară a unui șir generalizat de elemente pozitive din V . Prin urmare $y \in \widetilde{V}$.

În concluzie, sistemul $\widetilde{\mathcal{W}} = \{\widetilde{V} | V \in \mathcal{W}\}$ este o bază de vecinătăți ale originii pentru o topologie Fatou pe \widetilde{X} și evident $\widetilde{\tau}|_X = \tau$.

Fie acum τ' o topologie Fatou pe \widetilde{X} cu $\tau'|_X = \tau$. Dacă W este o (τ') -vecinătate Fatou a originii, atunci mulțimea $V = W \cap X$ este o (τ) -vecinătate a originii în X . Dacă $y \in \widetilde{V}$, atunci din $0 \leq x_f \uparrow |y|$ cu $x_f \in V$, rezultă $x_f \in W$ și prin urmare $|y| \in W$ căci W este o mulțime Fatou. Deoarece W este în particular o mulțime solidă, rezultă $y \in W$. Dacă $\widetilde{V} \subset W$ ceea ce arată că $\tau' \leq \widetilde{\tau}$. Pe de altă parte, dacă $V \in \mathcal{W}$, atunci există o (τ') -vecinătate Fatou a originii așa ca $W \cap X \subset V$ (căci $\tau'|_X = \tau$). Dacă $y \in W$, atunci există un șir generalizat $\{x_f\}_{f \in \Delta}$ de elemente din X așa ca $0 \leq x_f \uparrow |y|$ căci $y \in \widetilde{X}$. Rezultă $x_f \in W \cap X$ căci W este solidă și $0 \leq x_f \leq |y|$. În consecință $x_f \in V$ și deci $y \in \widetilde{V}$. Am arătat astfel că $\widetilde{\tau} \leq \tau'$ și deci $\tau' = \widetilde{\tau}$.

Definiția 5. Un spațiu liniar ordonat Z se zice că este (o)-separabil dacă pentru orice submulțime $A \subset Z$ care admite margine superioară, există o submulțime $B \subset A$, cel mult numărabilă, astfel ca $\sup A = \sup B$.

Exemple (5). Orice spațiu de tip (KB) este un spațiu

(o)-separabil (a se vedea [10]).

(6) Spațiul $B(T)$ al funcțiilor reale mărginite, definite pe un segment T , este un spațiu liniar complet reticulat în raport cu ordinea punctuală, dar nu este (o)-separabil.

(7) Spațiul (\mathfrak{m}) al tuturor șirurilor mărginite de numere reale (cu ordinea obișnuită) este un spațiu liniar complet reticulat (o)-separabil.

În lema care urmează vom ține seama că într-un spațiu liniar reticulat arhimedian Z , un subspațiu liniar reticulat E este (o)-dens, dacă și numai dacă, pentru orice element $z > 0$ din Z , există $a \in E$ așa ca $0 < a \leq z$ (a se vedea [9]).

Lema 1. Dacă E este o bandă într-un spațiu liniar reticulat arhimedian Z , atunci $E = E^{\perp\perp}$.

Demonstrație. Mulțimea E fiind solidă, este (o)-densă în $E^{\perp\perp}$. Într-adevăr, în caz contrar fie $0 < z \in E^{\perp\perp}$, astfel ca $\{a \in E \mid 0 < a \leq z\} = \emptyset$. Rezultă $\{a \mid \wedge z = 0, \forall a \in E, \text{ deci } z \in E^{\perp}$ și prin urmare $z = 0$, ceea ce este contradictoriu.

Mulțimea E fiind (o)-densă în $E^{\perp\perp}$, pentru orice element pozitiv $z \in E^{\perp\perp}$ avem

$$z = \sup \{a \in E \mid 0 \leq a \leq z\}$$

de unde $z \in E$ căci E este o bandă. Deci $E^{\perp\perp} \subset E$, iar incluziunea contrară are loc chiar dacă E ar fi o mulțime carecăr.

Lema 2. Fie Z un spațiu liniar reticulat arhimedian (o)-separabil înzestrat cu o topologie Fatou. Dacă \mathcal{G} este mulțimea tuturor șirurilor $\{W_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ de vecinătăți Fatou ale originii, cu proprietatea $W_{n+1} + W_{n+1} \subset W_n$, atunci

$$Z = \bigcup \{F^{\perp} \mid F = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} W_n, \{W_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{G}\} \quad (1)$$

Demonstrație. Să notăm cu G mulțimea din membrul drept al egalității (1). Pentru a arăta că $G = Z$ este suficient să demonstrăm că G este o bandă (o)-densă în Z (a se vedea [9], p.153).

Mulțimea G este un subspațiu liniar al lui Z .

Intr-adevăr, dacă $F_1 = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} W_n^1$, ($i=1,2$) cu $\{W_n^i\}_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{F}$
 și punem $W_n = W_n^1 \cap W_n^2$, atunci $\{W_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{F}$. Deci dacă $x_1 \in F_1^\perp$,
 ($i=1,2$) și $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, atunci notînd $F = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} W_n$, atunci
 $\alpha x_1 + \beta x_2 \in F^\perp$ căci $F^\perp = (F_1 \cap F_2)^\perp$

Mulțimea G este evident solidă, deci G este un subspațiu normal.

Pentru ca G să fie o bandă, este suficient ca

$$0 \leq x_j \uparrow z, s_j \in G, (\forall j \in \Delta) \implies z \in G \quad (2)$$

Cum însă spațiul Z este (o)-separabil, putem să presupunem în (2) că $\Delta = \mathbb{N}$.

Fie deci $0 \leq x_n \uparrow z$ cu $x_n \in G, (\forall n \in \mathbb{N})$. Pentru orice $n \in \mathbb{N}$ să considerăm un șir $\{W_{nj}\}_{j \in \mathbb{N}} \in \mathcal{F}$ astfel ca, punînd

$$F_n = \bigcap_{j \in \mathbb{N}} W_{nj}, \quad (n \in \mathbb{N})$$

să avem $x_n \in F_n$. Să punem acum

$$W_j = \bigcap_{n=1}^{\infty} W_{nj}, \quad (j \in \mathbb{N})$$

Se observă că $\{W_j\}_{j \in \mathbb{N}} \in \mathcal{F}$ și că

$$\bigcap_{j \in \mathbb{N}} W_j \subset \bigcap_{j \in \mathbb{N}} W_{nj} = F_n, \quad (\forall n \in \mathbb{N})$$

Punînd $F = \bigcap_{j \in \mathbb{N}} W_j$, avem $F \subset F_n$, de unde $F_n^\perp \subset F^\perp$ și deci $x_n \in F^\perp, (\forall n \in \mathbb{N})$. Rezultă $z \in F^\perp \subset G$ deci G este o bandă în Z .

Să arătăm că G este (o)-densă în Z .

Să observăm mai întii că dacă $F = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} W_n$ cu $\{W_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{F}$ atunci F este o bandă. Intr-adevăr, deoarece F este o mulțime Fatou, este suficient să arătăm că F este un subspațiu liniar. Dar aceasta, rezultă imediat, căci dacă $a, b \in F$, atunci $a, b \in W_{n+1}, \forall n \in \mathbb{N}$, de unde $a+b \in W_n, (\forall n \in \mathbb{N})$ deci $a+b \in F$. Cum F este solidă, F este un subspațiu liniar.

Fie acum $0 < z \in Z$ și să considerăm o vecinătate Fatou W a originii așa ca $z \notin W$. Să considerăm un șir $\{W_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{F}$ cu $W_1 = W$. Deoarece spațiul Z este arhimedian, punînd $F = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} W_n$

avem $F = F^{\perp\perp}$ (lema 1) deci $z \notin F^{\perp}$. Există atunci $a \in F^{\perp}$, $a > 0$, astfel ca, notînd $b = z \wedge a$, sîm avem $b > 0$. Din $0 < b \leq a$ și $a \in F^{\perp}$ rezultă $b \in F^{\perp}$, deci $0 < b \leq z$ cu $b \in G$.

Mulțimea G este deci (0) -densă în Z și lema este demonstrată.

Lema 3. Fie Z un spațiu liniar σ -reticulat și $\{A_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ un șir de submulțimi solide care satisfac condițiile

- (i) $z = (0)\text{-}\lim_{n \rightarrow \infty} z_n, z_n \in A_j, (\forall n \in \mathbb{N}) \Rightarrow z \in A_j$
- (ii) $A_{j+1} + A_{j+1} \subset A_j, (\forall j \in \mathbb{N})$

Fie $\{c_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ un șir (0) -mărginit de elemente din Z care satisface condiția

$$c_{n+1} - c_n \in A_{n+2}, (\forall n \in \mathbb{N}) \tag{3}$$

Atunci

$$\left(\lim_{n \in \mathbb{N}} c_n\right) - c_n \in A_n, (\forall n \in \mathbb{N}) \tag{4}$$

$$\overline{\left(\lim_{n \in \mathbb{N}} c_n\right) - c_n} \in A_n, (\forall n \in \mathbb{N}) \tag{5}$$

Demonstrație. Vom stabili (4), relația (5) stabilindu-se într-un mod asemănător. Să notăm $b = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n$.

Fie $n, m \in \mathbb{N}$. Pentru orice $k \in \{1, 2, \dots, m\}$ avem

$$|c_n - c_{n+k}| \leq \sum_{j=1}^{n+k-1} |c_j - c_{j+1}| \in A_{n+2} + \dots + A_{n+m-1} \subset A_{n+1}$$

și deci

$$\begin{aligned} 0 \leq c_n - \bigwedge_{j=n}^{n+m} c_j &= \bigvee_{j=n}^{n+m} (c_n - c_j) \leq \bigvee_{j=n}^{n+m} |c_n - c_j| \leq \\ &\leq \sum_{j=n}^{n+m-1} |c_j - c_{j+1}| \in A_{n+1} \end{aligned}$$

Rezultă

$$c_n - \bigwedge_{j=n}^{n+m} c_j \in A_{n+1}, (\forall n, m \in \mathbb{N})$$

și cu condiția (i) din enunțul lemei, punînd $b_n = \bigwedge_{j=n}^{\infty} c_j$, deducem

$c_n - b_n \in A_{n+1}, (\forall n \in \mathbb{N})$. Prin urmare

$$\begin{aligned} |b_{n+m} - c_n| &\leq |b_{n+m} - c_{n+m}| + |c_{n+m} - c_n| \leq \\ &\leq |b_{n+m} - c_{n+m}| + \sum_{j=n}^{n+m-1} |c_{j+1} - c_j| \in A_{n+m+1} + A_{n+1} \subset A_n \end{aligned}$$

de unde $b_{n+m} - c_n \in A_n$ și deci $b - c_n \in A_n$.

Teorema 3. Să presupunem că spațiul X este (o) -separabil și înzestrat cu o topologie Fatou. Dacă $\{x_\delta\}_{\delta \in A}$ este un șir generalizat (o) -mărginit de elemente din X și $x = (\tau)$ - $\lim_{\delta \in A} x_\delta$, atunci există un șir crescător de indici $\{\delta_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ așa ca $x = (o)$ - $\lim_n x_{\delta_n}$.

Demonstrație. Să considerăm extensia Dedekind \tilde{X} a lui X . Ea este un spațiu liniar complet reticulat (o) -separabil. Înzestram \tilde{X} cu topologia Fatou dată de teorema 2. Are deci loc egalitatea (1) în care $Z = \tilde{X}$.

Fie $x = (\tau)$ - $\lim_{\delta \in A} x_\delta$ și $|x_\delta| \leq c, (\forall \delta \in A)$. Fie $c \in F^\perp$ cu $F = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} W_n$ iar $\{W_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{S}$ (cu notațiile din lema 2). Se observă ușor că există un șir crescător de indici $\{\delta_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ așa ca $x_{\delta_n} - x \in W_{n+1}, (\forall n \in \mathbb{N})$ deci

$$x_{\delta_n} - x \in W_n, (\forall n \in \mathbb{N}) \quad (6)$$

$$x_{\delta_{n+1}} - x_{\delta_n} \in W_{n+2}, (\forall n \in \mathbb{N}) \quad (7)$$

Punind $a = \lim_{n \in \mathbb{N}} x_{\delta_n}$, $b = \overline{\lim_{n \in \mathbb{N}} x_{\delta_n}}$ în spațiul \tilde{X} și ținând seama de (7), cu lema 3 avem

$$b - x_{\delta_n} \in W_n, (\forall n \in \mathbb{N})$$

De aici și din (6) rezultă

$$b - x = (b - x_{\delta_{n+1}}) + (x_{\delta_{n+1}} - x) \in W_{n+1} + W_{n+1} \subset W_n$$

deci $b - x \in F$.

Pe de altă parte, avem $x_\delta \in F^\perp, (\forall \delta \in A)$, de unde $b \in F^\perp$. De asemenea $x \in F^\perp$ căci $|x| \leq c$. Deci $b - x \in F^\perp$ și cum avem totodată $b - x \in F$ rezultă $b - x = 0$. În mod analog se arată că $a = x$, deci $x = (o)$ - $\lim_n x_{\delta_n}$.

Definiția 6. Un subspațiu liniar reticulat G al unui spațiu liniar reticulat Z se numește subspațiu exact, dacă din $A \subset G$ și din existența elementului a -sup A în G rezultă a -sup A și în spațiul Z .

Lema 4. Dacă G este un subspațiu liniar reticulat (ρ) -dens al unui spațiu liniar reticulat arhimedian Z , atunci G este un subspațiu exact. Dacă G este în plus complet reticulat, atunci G este un subspațiu normal.

Demonstrație. Este suficient să arătăm că dacă $s \downarrow 0$ în G atunci $s \downarrow 0$ și în spațiul Z . Să presupunem că afirmația h -ar fi adevărată. Fie deci $s \downarrow 0$ în G și $s \in Z$ așa ca $0 < s \leq s_\delta$ ($\forall \delta \in \Delta$). Cum G este (ρ) -dens în Z (iar Z este arhimedian), există $a \in G$ astfel ca $0 < a \leq s$. Rezultă $0 < a \leq s_\delta$, $\forall \delta \in \Delta$, contradictoriu.

Să presupunem acum că G este și complet reticulat.

Fie $0 < a \leq b \in G$ ou $a \in Z$. Fie $a_\delta \uparrow a$ în Z cu $0 \leq a_\delta \in G$, ($\forall \delta \in \Delta$). Spațiul G fiind complet reticulat, există $c \in G$ așa ca $a_\delta \uparrow c$ în G . Cum G este un subspațiu exact al lui Z , rezultă $a_\delta \uparrow c$ și în Z . În consecință $a=c \in G$ și lema este demonstrată.

Dacă Z și Y sînt două spații liniare topologice, o funcție $f: Z \rightarrow Y$ se spune că este uniform continuă, dacă pentru orice vecinătate V a originii în Y , există o vecinătate W a originii în Z astfel ca $f(s_1) - f(s_2) \in V$ dacă $s_1 - s_2 \in W$.

Lema 5. Pentru ca o topologie liniară τ pe un spațiu liniar reticulat Z , să fie local solidă, este necesar și suficient ca funcția $f: Z \rightarrow Z$ dată de formula $f(x) = x_+$ să fie uniform (τ) -continuă.

Demonstrație. Necesitatea rezultă din inegalitatea

$$|a_+ - b_+| \leq |a - b|, \quad (\forall a, b \in Z)$$

Reciproc, să presupunem că f este uniform (τ) -continuă.

Fie V o vecinătate carecare a originii și V_1 o vecinătate echilibrată a originii astfel ca $V_1 + V_1 \subset V$. Fie de asemenea W_1, V_2, W_2

Cda. 58/962 Fasc. 2

vecinătăți echilibrate ale originii astfel ca $V_2 + W_2 \subset W_1$, iar din $a-b \in W_1$, să rezulte $a_+ - b_+ \in V_1$, ($i=1,2$). Să notăm cu ρ acoperirea solidă a lui W_2 . Avem $V_0 \subset V$. Într-adevăr, fie $|z| \leq |\rho|$ cu $c \in W_2$. Avem $c_+, c_- \in V_2$ și deci $|\rho| \in W_1$. Din $z_+ - (z_+ - |\rho|) = |\rho| \in W_1$ rezultă

$$z_+ = z_+ - (z_+ - |\rho|)_+ \in V_1$$

În mod analog, $z_- \in V_1$ și deci $z \in V$.

Teorema 4. Să presupunem că X este înzestrat cu o topologie local solidă și fie Y completatul lui X ca spațiu liniar topologic. Au loc următoarele:

(i) (τ) -Închiderea în Y a mulțimii X_+ este un con în Y , și în raport cu ordinea dată de acest con, Y este un spațiu liniar reticulat topologic, iar X este un subspațiu liniar reticulat.

(ii) Pentru ca X să fie un subspațiu normal al lui Y este necesar și suficient ca orice (σ) -segment al lui X să fie (τ) -complet.

Demonstrație. (i) Să notăm cu H închiderea lui X_+ în Y . Este evident că H este un con în Y . Fie acum $y \in H \cap (-H)$ și

$$y = (\tau)\text{-lim}_{\delta' \in \Delta'} a_{\delta'} = -(\tau)\text{-lim}_{\delta'' \in \Delta''} b_{\delta''}$$

cu $a_{\delta'}, b_{\delta''} \in X_+$. Atunci

$$(\tau)\text{-lim}_{(\delta', \delta'') \in \Delta' \times \Delta''} (a_{\delta'} + b_{\delta''}) = 0$$

în spațiul X . Fie V o vecinătate solidă a originii în X și

$(\delta'_0, \delta''_0) \in \Delta' \times \Delta''$ astfel ca

$$(\delta', \delta'') \succ (\delta'_0, \delta''_0) \implies a_{\delta'} + b_{\delta''} \in V$$

Din $0 \leq a_{\delta'} \leq a_{\delta'_0} + b_{\delta''_0}$ rezultă atunci

$$\delta' \succ \delta'_0 \implies a_{\delta'} \in V$$

deci $(\tau)\text{-lim}_{\delta' \in \Delta'} a_{\delta'} = 0$ în X . Rezultă $y=0$, deci H este un con în spațiul Y .

Funcția $f_0: X \rightarrow Y$ dată de formula $f_0(x) = x_+$ este

uniform (τ) -continuu. Spațiul Y fiind (τ) -compleș, f_0 se prelungește în mod unic într-o funcție uniform (τ) -continuu $f: Y \rightarrow Y$. Pentru orice $y \in Y$ avem $f(y) = y_+$. Într-adevăr, fie $y = (\tau)\text{-lim}_{\delta \in \Delta} x_\delta$ cu $x_\delta \in X$, $(\forall \delta \in \Delta)$. Din

$$f(x_\delta) - x_\delta = (x_\delta)_+ - x_\delta \in X_+$$

rezultă $f(y) - y \in Y_+$, deci $f(y) \geq y$ în Y . Avem evident și $f(y) \geq 0$ în Y . Fie acum $z \geq y, 0$ în Y . Se pot considera două șiruri generalizate $\{a_\delta\}_{\delta \in \Delta}$, $\{b_\delta\}_{\delta \in \Delta}$ de elemente din X_+ (avînd aceeași mulțime de indici Δ) așa ca $z = (\tau)\text{-lim}_{\delta \in \Delta} a_\delta$ și $z - y = (\tau)\text{-lim}_{\delta \in \Delta} b_\delta$. Notînd $c_\delta = a_\delta - b_\delta$ avem $y = (\tau)\text{-lim}_{\delta \in \Delta} c_\delta$ și

$$a_\delta - f(c_\delta) = a_\delta - (c_\delta)_+ \geq 0$$

de unde, trecînd la (τ) -limită, $z - f(y) \geq 0$. Am arătat astfel că $f(y) = y_+$ în spațiul Y . Deci Y este un spațiu liniar reticulat, iar X este evident un subspațiu liniar reticulat. Pe de altă parte, aplicația $y \rightarrow y_+$ fiind uniform (τ) -continuu, topologia lui Y este local solidă (lema 5).

(ii) Să presupunem că X este un subspațiu normal al lui Y . Fie $0 < x \in X$ și $\{x_\delta\}_{\delta \in \Delta}$ un șir generalizat (τ) -Cauchy de elemente din X cu $0 \leq x_\delta \leq x, (\forall \delta \in \Delta)$. Există atunci $y = (\tau)\text{-lim}_{\delta \in \Delta} x_\delta$ în spațiul Y și $0 \leq y \leq x$ în Y . Cum X este subspațiu normal al lui Y , rezultă $y \in X$.

Prin urmare, segmentul $[0, x]$ al spațiului X este (τ) -complet în X . Dacă $a, b \in X$ și $a < b$, atunci $[a, b] = a + [0, b - a]$, deci $[a, b]$ este (τ) -complet în X .

Reciproc, să presupunem că orice (o) -segment al lui X este (τ) -complet. Fie $0 \leq y \leq x \in X$ cu $y \in Y$. Fie $y = (\tau)\text{-lim}_{\delta \in \Delta} x_\delta$ cu $0 \leq x_\delta \in X, (\forall \delta \in \Delta)$. Putem evident presupune $0 \leq x_\delta \leq x, \forall \delta \in \Delta$ (căci în caz contrar, înlocuim x_δ prin $x_\delta \wedge x$). Cu ipoteza, rezultă $y \in Y$. Tinînd seama că X este și subspațiu liniar reticulat rezultă că X este subspațiu normal.

Observația 5. Se poate arăta că dacă X este înzestrat cu

o topologie local solidă iar Y este completatul lui X ca spațiu liniar topologic, atunci (τ) -închiderea în Y a unei submulțimi solide a lui X este o mulțime solidă în Y .

Teorema 5. Dacă X este înzestrat cu o topologie Fatou, atunci orice submulțime Fatou a lui X este (τ) -închisă.

Demonstrație. Să notăm cu \mathcal{F} mulțimea tuturor șirurilor $\{W_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ de vecinătăți Fatou ale originii în X , cu proprietatea $W_{n+1} + W_{n+1} \subset W_n$. Să notăm cu G mulțimea din membrul drept al egalității (1). Mulțimea G este (o) -densă în X (a se vedea demonstrația lemei 2 în care s-a arătat că G este (o) -densă în Z fără a folosi (o) -separabilitatea lui Z).

Să presupunem că X este complet reticulat.

Fie A o submulțime Fatou a lui X și $x_0 \in \bar{A}$. Dacă $x \in G$ și $0 \leq x \leq |x_0|$ atunci $x \in \bar{A}$ căci \bar{A} este solidă. Fie acum $x \in F^\perp$ cu $F = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} W_n$, $\{W_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{F}$. Pentru orice $n \in \mathbb{N}$ există $x_n \in A$ așa ca $x - x_n \in W_{n+1}$. Putem presupune $0 \leq x_n \leq x$ (în caz contrar înlocuim x_n prin $|x_n| \wedge x$) deci $x_n \in F^\perp$, $(\forall n \in \mathbb{N})$. Cu lema 3, notînd $z = \lim_{n \in \mathbb{N}} x_n$, avem $z - x_n \in W_n$ și prin urmare $z - x \in W_n$ (căci $x_n \leq x$). Dar atunci $z - x \in F$ și cum din $x \in F^\perp$ și $z \in F^\perp$ rezultă $z - x \in F^\perp$, deducem $x = z \in A$.

Am arătat deci că dacă $0 \leq x \leq |x_0|$ cu $x \in G$ atunci $x \in A$. Pe de altă parte, G fiind (o) -densă în X , există un șir generalizat $\{x_\delta\}_{\delta \in \Delta}$ de elemente din G așa ca $0 \leq x_\delta \uparrow |x|$. Deci $x \in A$, $(\forall \delta \in \Delta)$ și în consecință $x \in A$, deci A este (τ) -închisă.

Dacă X nu este complet reticulat, vom considera extensia Dedekind \tilde{X} a lui X , înzestrată cu topologia Fatou dată de teorema 2. Punînd

$$\tilde{A} = \{y \in \tilde{X} \mid \exists \{x_\delta\}_{\delta \in \Delta} \subset A; 0 \leq x_\delta \uparrow |y|\}$$

\tilde{A} este o mulțime Fatou în \tilde{X} , deci este închisă în topologia lui \tilde{X} . Rămîne să observăm că $A = \tilde{A} \cap X$ iar $\tilde{A} \cap X$ este (τ) -în-

chisă în X .

Teorema este demonstrată.

Următoarea teoremă a lui H.Nakano, a fost redemonstrată de C.D.Aliprantis și O.Burkinshaw.

Teorema 6. Dacă X este un spațiu liniar complet reticulat și înzestrat cu o topologie Fatou, atunci orice (σ) -segment al lui X este (τ) -complet.

Demonstrație. În baza teoremei 4, este suficient să arătăm că X este un subspațiu normal în completatul topologic Y . În acest scop, vom arăta că X este (σ) -dens în subspațiul normal Z generat de X în Y . Cu lema 4 va rezulta $X=Z$.

Fie deci $0 < y \leq x \in X$ cu $y \in Y$. Fie $\{V_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ un șir de vecinătăți Fatou ale originii în X care satisfac condiția $V_{n+1} + V_{n+1} \subset V_n, (\forall n \in \mathbb{N})$. Să notăm cu W_1 închiderea lui V_1 în Y și fie $y \notin W_1$. Să considerăm un șir generalizat $\{x_\delta\}_{\delta \in \Delta}$ de elemente din X astfel ca $0 \leq x_\delta \leq x, (\forall \delta \in \Delta)$ și $y = (\tau)\text{-lim}_{\delta \in \Delta} x_\delta$ în Y . Notînd cu W_n închiderea lui V_n în Y , fie $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ un șir de indici, așa ca, notînd $a_n = \delta_n$ să avem

$$y - a_n \in W_n, a_{n+m} - a_n \in V_{n+2}, (\forall n, m \in \mathbb{N})$$

Cu lema 3, notînd $c = \overline{\lim}_{n \in \mathbb{N}} a_n$, avem $c - a_n \in V_n$ deci $y - c \in W_n$ ($\forall n \in \mathbb{N}$). Să punem $E = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} V_n$ și

$$B = \{z \in X_+ \mid z - c \in E\}$$

Avem $B \neq \emptyset$, căci $c \in B$. Fie $b = \inf B$ în X . Deoarece E este o bandă în X , avem $b - c \in E$. Rezultă $b > 0$ căci dacă am avea $b = 0$, ar rezulta $c \in E$ și deci $y \in W_1$, contradictoriu.

Fie acum S_1 o vecinătate Fatou a originii în X , cu $S_1 \subset V_1$. Fie $\{S_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ un șir de vecinătăți Fatou cu $S_{n+1} + S_{n+1} \subset S_n$ iar $S_n \subset V_n, (\forall n \in \mathbb{N})$. Ca și mai înainte, notînd cu T_n închiderea lui S_n în Y , putem găsi $e \in X_+$ așa ca $y - e \in T_n, (\forall n \in \mathbb{N})$. Rezultă, tot ca mai înainte, $b - e \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} S_n$

Cu definiția lui b , obținem $b \leq e$ și deci

$$0 \leq (b-y)_+ \leq (e-y)_+ \in T_1$$

de unde $(b-y)_+ \in T_1$ căci T_1 este solidă. Deoarece S_1 a fost o vecinătate Fatou oarecare a originii în X , conținută în V_1 , rezultă $(b-y)_+ = 0$ deci $b-y \leq 0$. Prin urmare $0 < b \leq y$ cu $b \in X$, deci X este (o) -dens în Z .

Lema 6. Să presupunem că X este înzestrat cu o topologie local solidă și fie Y completatul lui X ca spațiu liniar topologic. Dacă X este un subspațiu normal al lui Y , atunci X este (o) -dens în Y .

Demonstrație. Fie $0 < y \in Y$ și $y = (\tau)\text{-}\lim_{\delta \in \Delta} x_\delta$ cu $0 \leq x_\delta \in X$ ($\forall \delta \in \Delta$). Putem presupune $x_\delta \leq y$, ($\forall \delta \in \Delta$) căci în caz contrar înlocuim x_δ prin $x_\delta \wedge y$ și cum X este subspațiu normal al lui Y , avem $x_\delta \wedge y \in X$. Avem deci $0 \leq x_\delta \leq y$ și cum $y > 0$, există $\delta_0 \in \Delta$ astfel încât $x_{\delta_0} > 0$. Spațiul Y fiind arhimedian rezultă că X este (o) -dens în Y ([9], pag. 151).

Teorema 7. Dacă X este înzestrat cu o topologie Fatou, atunci X este (o) -dens în completatul topologic Y al lui X iar topologia lui Y este o topologie Fatou.

Demonstrație. Dacă X este complet reticulat, atunci cu teoremele 6 și 4 rezultă că X este un subspațiu normal al lui Y , iar cu lema 6, X este (o) -dens în Y .

Dacă X nu este complet reticulat, atunci considerăm extensia Dedekind \tilde{X} a lui X înzestrată cu topologia Fatou dată de teorema 2. Spațiul \tilde{X} este (o) -dens în completatul său topologic Z . Dar închiderea topologică a lui X în Z reprezintă completatul topologic Y al spațiului X . Rezultă că X este (o) -dens în Y .

Fie acum \mathcal{W} o bază de vecinătăți Fatou ale originii în X . Pentru orice $V \in \mathcal{W}$ să notăm cu V' (τ)-închiderea lui V în spațiul Y . Deoarece familia $\{V' \mid V \in \mathcal{W}\}$ este o bază de vecinătăți ale originii în spațiul Y rămâne să arătăm că dacă $V \in \mathcal{W}$ atunci V' este o mulțime Fatou. Cu observația 5, mulțimea V' este solidă. Fie acum

$\{y_\delta\}_{\delta \in \Delta}$ un șir generalizat de elemente din V' așa ca $0 \leq y_\delta \uparrow y$ în Y . Pentru orice $\delta \in \Delta$ există un șir generalizat $\{a_{\delta\lambda}\}_{\lambda \in \Lambda(\delta)}$ de elemente din X așa ca $0 \leq a_{\delta\lambda} \uparrow y_\delta$ (deoarece X este (o)-densă în Y). Cum V' este solidă iar $y_\delta \in V'$ rezultă $a_{\delta\lambda} \in V' \cap X$. Există atunci (ca și în demonstrația teoremei 2) un șir generalizat $\{b_\xi\}_{\xi \in \Xi}$ de elemente din V așa ca $0 \leq b_\xi \uparrow y$. În consecință $y \in V'$.

Observația 6. Să presupunem că X este înzestrat cu o topologie local convexă definită de o mulțime \mathcal{P} de seminorme Fatou. Fie Y completatul topologic al lui X și pentru orice $p \in \mathcal{P}$ să notăm cu \bar{p} prelungirea prin (τ) -continuitate a lui p la Y . După cum se știe, topologia lui Y este definită de familia de seminorme $\{\bar{p} \mid p \in \mathcal{P}\}$.

Se poate arăta că fiecare funcțională \bar{p} este o seminormă Fatou și că

$$\bar{p}(y) = \sup \{p(x) \mid 0 \leq x \leq |y|; x \in X\}, (y \in Y)$$

7. Dacă X este un spațiu reticulat local convex atunci topologia tare $\beta(X_\tau^*, X)$ este o topologie Fatou.

Intr-adevăr, fie A o submulțime (τ) -mărginită a lui X și pentru $f \in X_\tau^*$ să punem

$$p_A(f) = \sup \{ |f(x)| \mid x \in A \}$$

După cum se știe, topologia $\beta(X_\tau^*, X)$ este definită de mulțimea tuturor seminormelor p_A .

Orice seminormă p_A este evident solidă. Fie acum $0 \leq f_\delta \uparrow f$ în X_τ^* . Dacă nu am avea $p_A(f_\delta) \uparrow p_A(f)$, atunci ar exista un număr $\varepsilon > 0$ astfel ca

$$p_A(f_\delta) \leq p_A(f) - \varepsilon, (\forall \delta \in \Delta)$$

Considerind un element pozitiv $a \in A$ astfel ca $p_A(f) - \varepsilon < f(a)$, șirul generalizat $\{f_\delta(a)\}_{\delta \in \Delta}$ nu converge către $f(a)$ ceea ce este contradictoriu.

§ 3. Unele proprietăți ale topologiilor σ -Fatou

Teorema 8. Dacă X este un spațiu liniar complet reticulat înzestrat cu o topologie σ -Fatou, atunci orice (o) -segment al lui X este secvențial (τ) -complet.

Demonstrație. Să notăm cu Y completatul lui X ca spațiu liniar topologic și fie

$$Z = \left\{ y \in Y \mid y = (\tau)\text{-}\lim_{n \in \mathbb{N}} x_n; x_n \in X, \forall n \in \mathbb{N} \right\}$$

Mulțimea Z este un subspațiu liniar reticulat al lui Y , iar X este un subspațiu liniar reticulat al lui Z . Vom arăta că X este un subspațiu normal al lui Z . În baza lemei 4, este suficient să arătăm că X este (o) -dens în Z .

Fie $0 < y \leq x \in X$ cu $y \in Z$. Există deci un șir $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ de elemente din X așa ca $y = (\tau)\text{-}\lim_{n \in \mathbb{N}} x_n$ și $0 \leq x_n \leq x, \forall n \in \mathbb{N}$. Fie W o vecinătate σ -Fatou a originii în X astfel ca $y \notin \overline{W}$ și să considerăm un șir $\{W_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ de vecinătăți σ -Fatou ale originii în X cu $W_1 = W$ și $W_{n+1} + W_{n+1} \subset W_n, (\forall n \in \mathbb{N})$.

Se poate presupune că $x_{n+1} - x_n \in W_{n+2}, (\forall n \in \mathbb{N})$ (în caz contrar putem considera un subșir convenabil al șirului $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$). Notînd $a = \lim_{n \in \mathbb{N}} x_n$, cu lema 3 și cu faptul că $W_n \subset W, (\forall n \in \mathbb{N})$ rezultă $a - x_n \in W, (\forall n \in \mathbb{N})$. Cum $y \notin \overline{W}$, avem $a > 0$.

Să considerăm acum o vecinătate σ -Fatou oarecare V a originii în X și fie $\{V_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ un șir de vecinătăți σ -Fatou ale originii în X , astfel ca $V_1 = V$ și $V_{n+1} + V_{n+1} \subset V_n, (\forall n \in \mathbb{N})$. Să considerăm un subșir $\{x_{k_n}\}_{n \in \mathbb{N}}$ al șirului $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ așa ca

$$x_{k_{n+1}} - x_{k_n} \in V_{n+2}, (\forall n \in \mathbb{N})$$

Notînd $b = \lim_{n \in \mathbb{N}} x_{k_n}$, avem $0 < a \leq b$ și cu lema 3, avem $b - x_{k_n} \in V$ căci $V_n \subset V$. Rezultă $b - y \in V$ și cum $(a - y)_+ \leq (b - y)_+$ rezultă mai departe $(a - y)_+ \in V$. Deoarece V a fost o vecinătate σ -Fatou a originii, oarecare, rezultă $(a - y)_+ = 0$. Deci $0 < a \leq y$ cu $a \in X$.

Am arătat astfel că X este (o) -densă în Z și în consecință

X este subspațiu normal al lui Z . Fie acum $0 < x \in X$ și $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ un șir (τ) -Cauchy de elemente din X , cu $0 \leq x_n \leq x$. Există atunci $y = (\tau)\text{-}\lim x_n$ în spațiul Y și deci $y \in Z$. Dar atunci $0 \leq y \leq x$ în Z și cum X este subspațiu normal al lui Z rezultă $y \in X$ și deci segmentul $[0, x]$ este secvențial (τ) -complet. Pentru un segment oarecare, ținem seama de egalitatea: $[a, b] = a + [0, b-a]$, ($a < b$).

Teorema 9. Dacă X este un spațiu liniar σ -reticulat înzestrat cu o topologie σ -Fatou, iar G este un subspațiu normal secvențial (σ) -închis, atunci topologia cit în X/G este o topologie σ -Fatou.

Demonstrație. Fie $l : X \rightarrow X/G$ aplicația canonică și V o vecinătate σ -Fatou a originii în X . Mulțimea $\hat{V} = l(V)$ este solidă. Într-adevăr, dacă $|l(x)| \leq |l(y)|$ cu $y \in V$, atunci punând

$$z = (|y| \vee x) \wedge |x|$$

avem $|z| \leq y$ deci $z \in V$. Deci, din

$$l(z) = ((-|l(y)|) \vee l(x)) \wedge |l(x)| = -l(x)$$

rezultă $l(x) \in \hat{V}$.

Fie acum $0 \leq x_n \uparrow x$ în X/G unde $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ este un șir de elemente din \hat{V} . Punind $\hat{x}_n = l(x_n)$, $\hat{x} = l(x)$, putem presupune $0 \leq x_n \leq x$ cu $x_n \in V$, ($\forall n \in \mathbb{N}$). Notînd $a = \lim_{n \in \mathbb{N}} x_n$, avem $a \in V$, de unde

$$\hat{x} = \bigvee_{n \in \mathbb{N}} \hat{x}_n = \lim_{n \in \mathbb{N}} \hat{x}_n = \hat{a} = \hat{V}$$

și teorema este demonstrată.

Observația 8. Se poate demonstra că dacă X este înzestrat cu o topologie σ -Fatou (sau Fatou) atunci topologia cit în X/G este o topologie σ -Fatou (resp. Fatou).

§ 4. Unele proprietăți ale topologiilor care satisfac condiția (A_0) .

Teorema 10. Dacă X este înzestrat cu topologie local solidă, următoarele condiții sînt echivalente :

- (i) Topologia lui X satisface condiția (A_0) ,

(ii) Orice șir (o)-mărginit și ortogonal de elemente din X este (τ) -convergent către 0.

(iii) Dacă un șir $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ (o)-mărginit de elemente din X are proprietatea că pentru un anumit $m \in \mathbb{N}$ are loc egalitatea

$\bigwedge_{i=1}^m |x_{j_i}| = 0$ oricare ar fi numerele naturale $j_1 < j_2 < \dots < j_m$, atunci $(\tau)\text{-}\lim_n x_n = 0$.

Demonstrație. (i) \Rightarrow (ii). Fie $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ un șir ortogonal de elemente din X și $|x_n| \leq y, (\forall n \in \mathbb{N})$. Punind

$$y_n = \sum_{i=1}^n |x_i| = \bigvee_{i=1}^n |x_i|$$

avem $0 \leq y_n \uparrow$ și $y_n \leq y, \forall n \in \mathbb{N}$. Cu (i) rezultă că șirul $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ este (τ) -Cauchy. Dacă W este o vecinătate solidă carecarea a originii atunci există $n_0 \in \mathbb{N}$ așa ca $y_m - y_n \in W$ dacă $m, n \gg n_0$. Luind $m = n+1$ rezultă $|x_n| \in W$ dacă $n \gg n_0$ și deci $x_n \in W$ dacă $n \gg n_0$. Prin urmare $(\tau)\text{-}\lim_n x_n = 0$.

(ii) \Rightarrow (iii). Afirmatia (iii) este adevărată pentru $m=1$ în baza lui (i). Să presupunem că este adevărată pentru un anumit m și fie acum $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ un șir (o)-mărginit așa ca $\bigwedge_{i=1}^{m+1} |x_{j_i}| = 0$ dacă $j_1 < j_2 < \dots < j_{m+1}$. Putem evident presupune $x_n \gg 0, \forall n \in \mathbb{N}$. Fie $d \in X$ așa ca $x_n \leq d, \forall n \in \mathbb{N}$.

Să punem acum $y_1 = 0$ și

$$y_n = (x_n - n \sum_{i=1}^{n-1} x_i - \frac{1}{n} d)_+, (2 \leq n \in \mathbb{N})$$

Se observă imediat că $0 \leq y_n \leq d, \forall n \in \mathbb{N}$.

Șirul $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ este ortogonal. Intr-adevăr, este suficient

să ținem seama că dacă $1 < n < m$ atunci

$$\begin{aligned} \frac{1}{m} y_m &= (\frac{1}{m} x_m - \sum_{i=1}^{m-1} x_i - \frac{1}{m} d)_+ \leq (\frac{1}{m} x_m - \sum_{i=1}^{m-1} x_i - x_n - \frac{1}{m} d)_+ \leq \\ &\leq (\frac{1}{m} d - \sum_{i=1}^{m-1} x_i - x_n)_+ \leq (\frac{1}{m} d + n \sum_{i=1}^{m-1} x_i - x_n)_+ = (x_n - n \sum_{i=1}^{m-1} x_i - \frac{1}{m} d)_+ \end{aligned}$$

Cu (ii) rezultă $(\tau)\text{-}\lim_n y_n = 0$.

Mai departe, să definim $x_1=0$ și

$$x_n = \left(\bigwedge_{i=1}^{n-1} x_i \right) \wedge x_n, \quad (2 \leq n \in \mathbb{N})$$

Fie $1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_m$ cu $j_i \in \mathbb{N}$. Dacă $j_1=1$, atunci evident $\bigwedge_{i=1}^m x_{j_i} = 0$. Această egalitate are loc și dacă $j_1 > 1$ deoarece

$$\bigwedge_{i=1}^m x_{j_i} \leq \left(j_1 \sum_{i=1}^{j_1-1} x_i \right) \wedge \left(\bigwedge_{i=1}^m x_{j_i} \right) \leq j_1 \sum_{i=1}^{j_1-1} \left(\bigwedge_{k=1}^m x_{j_k} \right) \wedge x_i = 0$$

Prin ipoteza inducției rezultă $(\tau)\text{-}\lim_n x_n = 0$.

Faptul că $(\tau)\text{-}\lim_n x_n = 0$ rezultă acum din inegalitățile

$$0 \leq x_n \leq y_n + \frac{1}{n} d, \quad (2 \leq n \in \mathbb{N})$$

valabile datorită egalității

$$x_n = y_n + \left(n \sum_{i=1}^{n-1} x_i + \frac{1}{n} d \right) \wedge x_n$$

(căci pentru orice $a, b \in X$ avem $a = (a-b)_+ + (a \wedge b)$)

(iii) \Rightarrow (i). Fie $0 \leq x_n$, $n \in \mathbb{N}$ și $x_n \leq y$, $(\forall n \in \mathbb{N})$ și să presupunem că șirul $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ nu este (τ) -Cauchy. Există atunci o vecinătate W a originii și un subșir $\{x_{k_n}\}_{n \in \mathbb{N}}$ așa ca $x_{k_{n+1}} - x_{k_n} \notin W$, $(\forall n \in \mathbb{N})$. Fie W_0 o vecinătate solidă a originii așa ca $W_0 + W_0 \subset W$ și fie $m \in \mathbb{N}$ așa ca $\frac{1}{m} y \in W_0$. Să notăm $x_n = x_{k_n}$ și să punem

$$y_n = (x_{n+1} - x_n - \frac{1}{m} y)_+, \quad (n \in \mathbb{N})$$

Evident $0 \leq y_n \leq y$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Să considerăm acum m numere naturale $j_1 < j_2 < \dots < j_m$. No-

tînd

$$e = \bigwedge_{i=1}^m y_{j_i}$$

avem

$$e \wedge \sum_{i=1}^m (x_{j_{i+1}} - x_{j_i} - \frac{1}{m} y) = e \wedge \sum_{i=1}^m \left(\frac{1}{m} y + y_{j_i} - x_{j_{i+1}} + y_{j_i} \right) >> \\ > e \wedge \sum_{i=1}^m y_{j_i} = e$$

de unde $e=0$. Cu (iii) rezultă $(\tau)\text{-}\lim_n y_n = 0$, deci există $n_0 \in \mathbb{N}$ așa

ca $y_n \in W_0$ dacă $n \geq n_0$. Dar

$$z_{n+1} - z_n \in W, (n \geq n_0)$$

căci (folosind iarăși identitatea $a = (a-b) + a \wedge b$) avem

$$z_{n+1} - z_n = y_n + (z_{n+1} - z_n) \wedge \frac{1}{m} y \in W_0 + W_0$$

dacă $n \geq n_0$.

Am ajuns astfel la o contradicție.

Teorema 11. Fie X un spațiu liniar reticulat topologic iar Y completatul topologic al lui X . Dacă topologia X satisface condiția (A_0) atunci și topologia lui Y satisface condiția (A_0) .

Demonstrație. Fie $0 \leq y_n \uparrow$ în X și $y_n \leq y, (\forall n \in \mathbb{N})$ în spațiul Y . Notînd $z_n = y - y_n$, avem $0 \leq z_n \downarrow$ și este suficient să arătăm că $\{z_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ este un șir (τ) -Cauchy. Fie deci W o vecinătate solidă a originii în Y . Fie $\{W_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ un șir de vecinătăți solide ale originii în Y astfel ca

$$W_1 + W_1 + W_1 \subset W \quad (8)$$

$$W_{n+1} + W_{n+1} \subset W_n, (\forall n \in \mathbb{N}) \quad (9)$$

Deoarece X este (τ) -densă în Y , pentru orice $n \in \mathbb{N}$ există un element pozitiv $x_n \in X$ așa ca $x_n \in W_{n+1} * z_n$. Punînd $a_n = \bigwedge_{i=1}^n x_i$, avem $0 \leq a_n \downarrow$ în X și prin urmare $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ este un șir (τ) -Cauchy. Există deci $n_1 \in \mathbb{N}$ așa ca $a_m - a_n \in W_1$ dacă $m, n \geq n_1$. Dar

$$|a_n - z_n| \leq \sum_{i=1}^n |x_i - z_i| \quad (10)$$

căci

$$a_n - z_n = \bigwedge_{i=1}^n x_i - z_n \leq x_n - z_n \leq \sum_{i=1}^n |x_i - z_i|$$

iar

$$z_n - a_n = z_n - \bigwedge_{i=1}^n x_i = \bigvee_{i=1}^n (z_n - x_i) \leq \bigvee_{i=1}^n (z_i - x_i) \leq \sum_{i=1}^n |x_i - z_i|$$

Să ținem acum seama că $|x_i - z_i| \in W_{i+1}$ și deci cu (9)

$$\sum_{i=1}^n |x_i - z_i| \in W_2 + \dots + W_{n+1} \subset W_1$$

Cu (10) rezultă $|a_n - z_n| \in W_1, (\forall n \in \mathbb{N})$. Avem deci pentru $m, n \geq n_1$

(folosind (8))

$$|x_m - x_n| \leq |x_m - a_m| + |a_m - a_n| + |a_n - x_n| \in W$$

deci $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ este un șir (τ) -Cauchy.

Teorema este demonstrată.

În definiția următoare se notează cu $No(A)$ subspațiul normal generat de o mulțime $A \subset X$.

Definiția 7. Dacă X este înzestrat cu o topologie liniară, o submulțime A a lui X se zice că este ovasi (o) -precompactă (resp. (o)-precompactă), dacă pentru orice vecinătate W a originii, există un element pozitiv $x \in X$ (resp. $x \in No(A)$) astfel ca

$$A \subset W + [-x, x]$$

Lema și teorema care urmează au fost demonstrate recent de M. Dubouox [11].

Vom nota cu $co(B)$ acoperirea convexă a unei mulțimi

B .

Lema 7. Fie Z un subspațiu reticulat local convex și B o submulțime solidă și (τ) -mărginită a lui Z cu proprietățile

- (i) orice șir ortogonal de elemente din B este (τ) -convergent către 0 ;
- (ii) orice șir crescător și (τ) -Cauchy de elemente pozitive din $co(B)$ este majorat.

În aceste condiții mulțimea B este (o)-precompactă.

Demonstrație. Dacă B este (o)-precompactă, atunci fie W o vecinătate solidă a originii astfel ca, pentru orice element pozitiv $z \in No(B)$ să existe un element pozitiv $y \in B$ cu $y \notin W + [-z, z]$. În particular $(y-z)_+ \notin W$ căci $(y-z)_+ = y-z \wedge y$. Prin inducție, rezultă existența unui șir $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ de elemente pozitive din B astfel ca

$$(y_{n+1} - \sum_{i=1}^n y_i)_+ \notin W, (\forall n \in \mathbb{N})$$

Șirul $\left\{ \sum_{i=1}^n \frac{1}{2^i} y_i \right\}_{n \in \mathbb{N}}$ este crescător și elementele sale sînt

în $co(B)$. Acest șir este (τ) -Cauchy (căci mulțimea $co(B)$ este (τ) -mărginită și deci șirul este (τ) -mărginit). Cu condiția (ii) există un majorant z_0 al șirului. Notînd

$$a_n = y_{n+1} - 4^n \sum_{i=1}^{n+1} y_i; \quad z_n = (a_n - \frac{1}{2^n} z_0)_+, \quad (n \in \mathbb{N})$$

avem $z_n \in B$, ($\forall n \in \mathbb{N}$) căci $0 \leq z_n \leq (a_n)_+ \leq y_{n+1} \in B$. Dacă $m > n$, atunci

$$\begin{aligned} \frac{1}{4^m} z_m &\leq \frac{1}{4^m} (a_m)_+ \leq \left(\frac{1}{4^m} y_{m+1} - y_{n+1} \right)_+ \leq \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^{m+1}} y_{m+1} - y_{n+1} \right)_+ \leq \\ &\leq \left(\frac{1}{2^n} z_0 + 4^n \sum_{i=1}^m y_i - y_{n+1} \right)_+ = (a_n - \frac{1}{2^n} z_0)_- \end{aligned}$$

de unde rezultă $z_m \perp z_n$. Dar din relațiile

$$z_n + \frac{1}{2^n} z_0 \geq (a_n)_+ \notin W$$

rezultă $z_n + \frac{1}{2^n} z_0 \notin W$ și prin urmare șirul $\{z_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ nu este (τ) -convergent către 0, contrar condiției (i).

Observația 9. Condiția (ii) din lema precedentă este îndeplinită dacă Z este (τ) -complet.

Teorema 12. Dacă X este un spațiu reticulat local convex, topologia lui X satisface condiția (A_0) , dacă și numai dacă orice submulțime cvasi (o) -precompactă a lui X este (o) -precompactă.

Demonstrație. Să presupunem că topologia lui X satisface condiția (A_0) . Cu teorema 11 în completatul topologic Y al lui X , topologia satisface de asemenea condiția (A_0) . Fie A o submulțime cvasi (o) -precompactă a lui X și B acoperirea solidă a lui A în spațiul Y . Mulțimea B este cvasi (o) -precompactă în Y .

Să arătăm acum că orice șir ortogonal de elemente din B este (τ) -convergent către 0. Fie deci $\{z_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ un șir ortogonal de elemente din B . Putem presupune $z_n \succ 0$ căci B este solidă. Să considerăm o vecinătate oarecare W a originii în Y și fie W_0 o vecinătate solidă a originii în Y așa ca $W_0 + W_0 \subset W$. Mulțimea B fiind cvasi (o) -precompactă, există un element pozitiv $z \in Y$ așa ca $B \subset W_0 + [-z, z]$. În particular $z_n - z_n \wedge z \in W_0$, ($\forall n \in \mathbb{N}$) (căci dacă $0 \leq y \in B$ atunci

există $0 \leq a \in W_0$ așa ca $y \leq a+z$ de unde $0 \leq y-y \wedge z = (y-z)_+ \leq a \in W_0$.
 Pe de altă parte, topologia lui Y satisfăcând condiția (A_0) (în
 baza teoremei 11), rezultă că $(\tau)\text{-}\lim_n z_n \wedge z = 0$ (cu teorema 10). Fie
 deci $n_0 \in \mathbb{N}$ așa ca $z_n \wedge z \in W_0$ dacă $n \gg n_0$. Rezultă

$$z_n = z_n \wedge z + (z_n - z_n \wedge z) \in W_0 + W_0 \subset W$$

dacă $n \gg n_0$, deci $(\tau)\text{-}\lim_n z_n = 0$. Cu lema 7 și Observația 9, mulțimea B
 și deci și A este (o) -precompactă în Y . Rezultă că A este (o) -pre-
 compactă în X .

Reciproc, să presupunem că orice submulțime cvasi (o) -precom-
 pactă a lui X este (o) -precompactă. Fie $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ un șir ortogonal
 și (o) -mărginit de elemente pozitive din X . El este evident cvasi
 (o) -precompact și, prin ipoteză, rezultă că este (o) -precompact. Să
 considerăm o vecinătate oarecare W a originii și fie
 $0 \leq z \in \text{No}(\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\})$ astfel ca $x_n - x_n \wedge z \in W, (\forall n \in \mathbb{N})$. Există
 $\alpha_i \in \mathbb{R}_+$ și $j_i \in \mathbb{N}, (i=1, \dots, k)$, astfel ca $z \leq \sum_{i=1}^k \alpha_i x_{j_i}$, deci dacă
 $n \gg j_i, (i=1, \dots, k)$, atunci $x_n \wedge z = 0$ și în consecință $x_n \in W$. Avem deci
 $(\tau)\text{-}\lim_n x_n = 0$ și cu teorema 10, topologia lui X satisface condiția
 (A_0) .

Complemente^{x)}

1. Se poate demonstra că un spațiu liniar reticulat arhimedi-
 an este (o) -separabil, dacă și numai dacă orice submulțime ortogonală
 și (o) -mărginită a spațiului este cel mult numărabilă.

2. Un spațiu liniar reticulat se zice că este σ -lateral
complet (resp. lateral complet) dacă pentru orice șir ortogonal
 (resp. orice mulțime ortogonală) de elemente pozitive, există marginea
 superioară^{xx)}.

x) Amintim că topologiile liniare considerate în acest articol
 se presupun topologii separate.

xx) Un spațiu liniar complet reticulat care este lateral
 complet, a fost numit în [10] spațiu maximal.

Spațiul liniar R^2 înzestrat cu ordinea lexicografică, este un exemplu de spațiu liniar reticulat lateral complet, care nu este arhimedian.

Spațiul liniar al tuturor funcțiilor reale măsurabile (L) definite pe un segment $[a, b] \subset R$, este un spațiu liniar σ -reticulat și σ -lateral complet în raport cu ordinea punctuală, dar nu este nici complet reticulat, nici lateral complet.

A. I. Veksler și V. A. Geiler [20] au demonstrat următoarea propoziție, redemonstrată apoi pe o cale mai simplă de S. J. Bernau [6].

Dacă X este un spațiu liniar reticulat arhimedian, lateral complet, atunci orice bandă a lui X este o componentă.

3. Următoarele rezultate au fost stabilite de D. H. Fremlin [13] pentru spații maxinale și generalizate de C. D. Aliprantis și O. Burkinshaw [5].

Dacă Z este un spațiu liniar reticulat σ -lateral complet atunci există cel mult o topologie Fatou pe Z și această topologie este (ω) -continuă.

Dacă Z este un spațiu liniar reticulat, lateral complet, înzestrat cu o topologie local solidă, atunci pentru ca această topologie să fie metrizabilă este necesar și suficient ca Z să fie (o) -separabil.

4. Fie X un spațiu reticulat local ^{convex} (cu topologia τ) și să notăm cu $|\sigma|(X, X_\tau^*)$ topologia local convexă definită de familia $\{p_f\}_{f \in X_\tau^*}$ a seminormelor de forma

$$p_f(x) = |f|(|x|) \quad , (x \in X)$$

Se poate arăta că pentru ca topologia τ a spațiului X să fie (ω) -continuă, este necesar și suficient ca topologia $|\sigma|(X, X_\tau^*)$ să fie o topologie Fatou.

5. Dacă Z este un spațiu liniar complet reticulat, atunci orice element $z \in Z$ se reprezintă în mod unic sub forma $z = y + a$, unde

y este un element difuz, iar a un element atomic ([9], Cap. V, § 2).

Fie Z un spațiu liniar complet reticulat înzestrat cu o topologie local convexă, local plină și (ω) -continuă. Un element $y_0 \in C$ din Z este difuz, dacă și numai dacă pentru orice seminormă monotonă și (τ) -continuă p pe Z și pentru orice număr $\varepsilon > 0$ există elementele ortogonale y_1, y_2, \dots, y_n așa ca $\sum_{i=1}^n y_i = y_0$ iar $\max_{i=1}^n p(y_i) \leq \varepsilon$ (a se vedea [8]).

6. Dacă Z este un spațiu liniar, o funcțională $p: Z \rightarrow \mathbb{R}_+$ se numește pseudonormă, dacă $p(z_1 + z_2) \leq p(z_1) + p(z_2)$ și $\lim_{\alpha \rightarrow 0} p(\alpha z) = 0$. O pseudonormă p definită pe un spațiu liniar reticulat Z se zice că este solidă, dacă $|z_1| \leq |z_2| \implies p(z_1) \leq p(z_2)$. O topologie local solidă pe un spațiu liniar reticulat Z este definită de mulțimea pseudonormelor (τ) -conținse și solide, adică pentru orice vecinătate W a originii, există o pseudonormă (τ) -continuă și solidă p pe Z astfel ca $\{z \in Z \mid p(z) < 1\} \subset W$.

O pseudonormă p definită pe un spațiu liniar reticulat Z se numește pseudonormă Fatou, dacă este solidă și dacă:

$0 \leq z \uparrow z \implies p(z_\delta) \uparrow p(z)$. O topologie Fatou, pe un spațiu liniar reticulat Z este definită de mulțimea pseudonormelor Fatou, (τ) -continue.

7. Se poate arăta că dacă Z este un spațiu liniar reticulat topologic (τ) -complet, atunci pentru ca topologia lui Z să satisfacă condiția (A_0) , este necesar și suficient ca topologia lui Z să fie (ω) -continuă.

Cu teorema 11 (din prezentul articol) rezultă că dacă X este un spațiu liniar reticulat topologic iar Y este completat topologic al lui X , atunci pentru ca topologia lui X să satisfacă condiția (A_0) este necesar și suficient ca topologia lui Y să fie (ω) -continuă.

Cda. 58/982 f. 503

Bibliografie

1. C.D. Aliprantis, On the completion of Hausdorff locally solid Riesz spaces. *Trans. Amer. Math. Soc.* 196 (1974), 104-125.
2. C.D. Aliprantis, Riesz seminorms with Fatou properties. *Proc. Amer. Math. Soc.* 45 (1974), 383-388.
3. C.D. Aliprantis and O. Burkinshaw, A new proof of Nakano's theorem in locally solid Riesz spaces. *Math. Z.* 144 (1975), 25-33.
4. C.D. Aliprantis and O. Burkinshaw, Nakano's theorem revisited. *Michigan Math. J.* 23 (1976), 173-176.
5. C.D. Aliprantis and O. Burkinshaw, On universally complete Riesz spaces. *Pacific Math. J.*, 71 (1977), 1-12.
6. S. J. Bernau, Lateral and Dedekind completion of Archimedean lattice group. *J. London Math. Soc.* 12 (1976), 320-322.
7. Romulus Cristescu, Clase de spații liniare semiordonate pseudonormate. *Studii și cerc. mat.* 7 (1956), 291-309.
8. Romulus Cristescu, Elemente difuze în spații ordonate local convexe. *Studii și cerc. mat.*, 26 (1974), 1289-1292.
9. Romulus Cristescu, Spații liniare topologice. Editura Academiei, 1974.
10. Romulus Cristescu, Ordered vector spaces and linear operators. Abacus Press 1976.
11. M. Dubrović, Order precompactness in topological Riesz spaces. *J. London Math. Soc.* 23 (1981), 509-522.
12. D. H. Fremlin, On the completion of locally solid vector lattices. *Pacific J. Math.* 43 (1972), 341-342.
13. D. H. Fremlin, Inextensible Riesz spaces. *Math. Proc. Cambridge Phil. Soc.* 77 (1975), 71-89.
14. C. Goffman, Completeness in topologically vector lattices. *Amer. Math. Monthly* 66 (1959), 87-92.
15. E. Langford and C.D. Aliprantis, Regularity properties of quotient

Riesz seminorms. *Nederl. Akad. Wetensch. Proc. Ser. A*, 78
(1975), 199-212.

16. I. Kawai, *Locally convex lattices*. *J. Math. Soc. Japan* 9 (1957), 281-314.

17. W. A. J. Luxemburg and A. C. Zaanen, *Notes on Banach function spaces*.
Nederl. Akad. Wetensch. Proc. Ser. A 66 (1963) Note II,
148-153, Note III, 239-250.

18. H. Nakano, *Linear topologies on semi-ordered linear spaces*. *J. Fac. Sci. Hokkaido Univ. Ser. I.*, 12 (1953), 87-104.

19. H. H. Schaefer, *On the completeness of topological vector lattices*.
Michigan Math. J., 7 (1960), 303-309.

20. A. I. Veksler, V. A. Geiler, *Siberian Math. J.*, 13 (1972), 30-35.

PROGRESE RECENTE IN TEORIA OPERATORILOR
DEFINIȚI PE LATICI BANACH

de Constantin P. Niculescu

Scopul conferinței noastre este acela de a face o trecere în revistă a citorva rezultate mai reprezentative obținute după 1977 în teoria operatorilor definiți pe latici Banach. Subiectele ce vor fi dezbătute sînt următoarele:

1. Operatori con absolut sumabili și majorizanți
2. Operatori compacți definiți pe latici Banach
3. Operatori continui în sensul ordinii.

În seminarul profesorului R. Cristescu, desfășurat la Facultatea de matematică din București, au fost deja tratate subiecte adiacente precum comportarea operatorilor p-absolut sumabili definiți pe latici Banach, teorema de structură a operatorilor slab compacți etc, motiv pentru care nu vor mai fi menționate și aici.

Autorul dorește să mulțumească colegilor Al. Leonte și G. Turcitu pentru sprijinul acordat în redactarea prezentei conferințe.

L. Operatori con absolut sumabili și majorizanți

Schlotterbeck [16] a remarcat că laticile Banach de tip AL și AM se pot caracteriza prin comportarea (din punctul de vedere al sumabilității) a șirurilor de elemente pozitive disjuncte :

(AL) O latică Banach este izomorfă cu un AL -spațiu dacă și numai dacă orice șir (slab) sumabil de elemente pozitive, disjuncte două câte două, este absolut sumabil.

(AM) O latică Banach este izomorfă cu un AM -spațiu dacă și numai dacă orice șir normic convergent la 0 este σ -mărginit .

Analogul operatorial al acestor rezultate îl reprezintă studiul (inițiat de asemenea de Schlotterbeck) operatorilor con absolut sumabili și majorizanți.

Fie L o latică Banach, X un spațiu Banach și T

Un operator $T \in \mathcal{L}(L, X)$ se numește con absolut sumabil dacă transformă orice șir sumabil de elemente pozitive într-un șir absolut sumabil.

Un operator $T \in \mathcal{L}(X, L)$ se numește majorizant dacă transformă orice șir normic convergent la 0 într-un șir σ -mărginit.

T este con absolut sumabil (majorizant) dacă și numai dacă T' este majorizant (con absolut sumabil).

Operatorii con absolut sumabili admit factorizări prin AL -spații iar cei majorizanți prin AM -spații.

În anul 1977 Cartwright și Lotz au caracterizat aceste

clase de operatori folosind șirurile disjuncte. Rezultatele lor sînt în particular importante pentru evidențierea de noi tehnici de disjunctare.

1.1 LEMA. Cartwright și Lotz [3]). Fie L o latice Banach, $0 \leq d'_k \in L'$ ($k = 1, 2, \dots, n$) funcționale disjuncte, $0 \leq x_k \in L$ ($k = 1, 2, \dots, n$) și $\varepsilon > 0$. Atunci există elemente disjuncte $d_k \in [0, x_k]$ astfel că

$$d'_k(x_k - d_k) < \varepsilon$$

pentru orice $k = 1, 2, \dots, n$.

Demonstrație. Considerăm aici numai cazul $n = 2$, cazul general rezultînd prin inducție. Fie $x = x_1 \vee x_2$. Deoarece $d'_1 \vee d'_2(x) = 0$, rezultă că există două elemente pozitive u_1 și u_2 în E astfel că $x = u_1 + u_2$ și

$$d'_1(u_1) + d'_2(u_2) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Fie $w_1 = u_2 - u_1 \wedge u_2$ și $w_2 = u_1 - u_1 \wedge u_2$. Atunci $w_1 \wedge w_2 = 0$, $w_1, w_2 \in [0, x]$ și $d'_1(x - w_1) = d'_1(u_1 + u_1 \wedge u_2) \leq 2 d'_1(u_1) < \varepsilon$. Analog $d'_2(x - w_2) < \varepsilon$. Fie $d_k = x_k \wedge w_k$, $k = 1, 2$. Atunci $d_1 \wedge d_2 = 0$, $d_k \in [0, x_k]$ și $x_k - d_k = (x_k - w_k)^+ \leq x - w_k$, astfel că $d'_k(x_k - d_k) < \varepsilon$ pentru $k = 1, 2$. ■

LEMA. (Cartwright și Lotz [4]). Fie L o latice Banach, $\{x_k\}_k \subset E_+$ și $\{d'_k\}_k \subset L'$ un șir de elemente disjuncte astfel că $\sum d'_k(x_k) = \infty$.

Atunci există un șir $\{d_k\}_k \subset L_+$ de elemente disjuncte

astfel că $0 \leq d_k \leq x_k$ pentru orice k și $\sum d'_k (d_k) = \infty$.

Demonstrație. Fie $u = \sum \frac{x_k}{2^k(1+\|x_k\|)}$. Conforma teoremei

lui Kakutani de reprezentare a spațiilor de tip \mathbb{M} putem identifica idealul L_u (înzestrat cu norma $\|\cdot\|_u$) cu un spațiu $C(S)$ cu S compact. Fiecare x_k se interpretează ca o funcție $f_k \in C(S)$ și fiecare d'_k se interpretează ca o măsură $\mu_k \in C(S)'$. Măsurile $\nu_k = f_k \mu_k$ sînt mutual disjuncte și $\sum \|\nu_k\| = \infty$. Fie $\{A_j\}_j$ un o descompunere a lui \mathbb{N} în părți finite și disjuncte astfel că $\|\lambda_j\| \geq 1$ pentru orice j , unde $\lambda_j = \sum_{k \in A_j} \nu_k$. Înmulțind cu constante pozitive convenabile, putem chiar presupune că $\|\lambda_j\| = 1$. Șirul $\{\lambda_j\}_j$ fiind echivalent cu baza naturală a lui ℓ_1 , un cunoscut criteriu de slab compacitate a lui Grothendieck ne asigură existența unui $\delta > 0$, a unui subșir $\{\lambda_{n_j}\}_j$ și a unui șir de elemente disjuncte, $g_j \in C(S)$, astfel că

$$0 \leq g_j \leq 1_S$$

și

$$\lambda_{n_j}(g_j) > \delta$$

pentru orice j . Fie $B_j = A_{n_j}$. Intrucit $\sum_{k \in B_j} \nu_k(g_j) = \lambda_{n_j}(g_j) > \delta$

Lema 1.1 ne asigură existența pentru fiecare j a unui familii disjuncte de funcții $h_k \in [0, g_j]$ ($k \in B_j$) astfel că

$$\sum_{k \in B_j} \nu_k(h_k) > \delta \quad \text{. Să punem } h_k = 0 \text{ pentru } k \notin \cup B_j \text{ .}$$

Atunci $\sum \nu_k(h_k) = \infty$ deci $\sum \mu_k(f_k h_k) = \infty$ și putem lua $d_k = f_k h_k$, $k \in \mathbb{N}$. ■

1.3 LEMMA. (Cartwright și Lotz [4]). Fie I un ideal închis în laticea Banach L și fie $\varphi: L \rightarrow L/I$ surjectia canonică. Fie $\{x_k\}_k$ un șir de elemente din L_+ și $\{v_k\}_k$ un șir de elemente disjuncte din L/I astfel că $0 \leq v_k \leq \varphi(x_k)$ pentru orice k . Atunci există un șir de elemente disjuncte $\{d_k\}_k$ în L încît

$$\varphi(d_k) = v_k$$

și

$$0 \leq d_k \leq x_k$$

pentru orice k .

Demonstrație. Înmulțind cu constante pozitive convenabile putem presupune că $\sum \|x_k\| < \infty$. Pentru fiecare k alegem un $z_k \in [0, x_k]$ încît $\varphi(z_k) = v_k$ și punem $d_k = z_k - z_k \wedge (\sum_{j \neq k} z_j)$. Avem

$$0 \leq d_k \wedge d_j \leq (z_k - z_k \wedge z_j) \wedge (z_j - z_k \wedge z_j) = 0$$

și deci elementele d_j sînt disjuncte. Este clar că $d_k \in [0, x_k]$

Și,

$$\varphi(d_k) = \varphi(z_k) - \varphi(z_k) \wedge \varphi(\sum_{j \neq k} z_j) = v_k \quad \blacksquare$$

1.4 LEMMA (Cartwright și Lotz [4]). Fie L o latice Banach și $\{x_k\}_k$ un șir normic mărginit din L care nu este 0-mărginit nici măcar în L'' .

Atunci există un șir de elemente disjuncte d_k în L_+ cu $0 \leq d_k \leq x_k$ care nu este 0-mărginit în L'' .

Demonstrația. Considerăm mai întii cazul cînd L este un spațiu $L_1(X, \mathcal{F}, \mu)$ cu $\mu(X) < \infty$. Fie $x^*(t) = \sup x_k(t)$, $t \in X$. Funcția x^* nu este integrabilă.

Fie $X_0 = \{ t \in X ; x^*(t) < \infty \}$.

Considerăm cazul cînd $\mu(X \setminus X_0) = 0$ și punem $B_k = \{ t \in X_0 ; x_k(t) > x^*(t) - 1 \}$ și $A_k = B_k \setminus \bigcup_{j=1}^{k-1} B_j$ pentru fiecare k . Mulțimile A_k sînt mutual disjuncte și pe $X_0 = \bigcup A_k$ avem $\sup_k x_k(t) \chi_{A_k}(t) > x^*(t) - 1$. Intrucît funcția $\sup_k x_k(t) \chi_{A_k}(t)$ nu este integrabilă, putem lua $d_k = x_k \chi_{A_k} \in L$.

În cazul cînd $\mu(X \setminus X_0) > 0$ vom observa că deoarece șirul $\{x_k\}_k$ este normic mărginit, mulțimea $X \setminus X_0$ nu poate conține nici-un atom. Atunci există o funcție măsurabilă și pozitivă h pe X astfel că $h(t) = 0$ pe X_0 și $\int h d\mu = \infty$. Alegem $d_n = x_n \wedge h$.

Revenim la cazul general al unei latici L . Deoarece șirul $\{x_k\}_k$ nu este o-mărginit în L^* , există un $x' \in L^*$ astfel că

$$\sup x' \left(\bigvee_{k=1}^n x_k \right) = \infty$$

Fie u_k imaginea canonică a lui x_k în AL -spațiul (E'', x') . Alegem un șir $\{v_k\}_k$ în (E'', x') de elemente disjuncte care să nu fie majorat și $0 \leq v_k \leq u_k$ pentru orice k . Deoarece x' este funcțională σ -continuă pe L^* , atunci E''/I este un ideal în (E'', x') . Am notat $I = \{x'' \in E'' ; |x''|(x') = 0\}$. Conform Lemei 1.3 există un șir y''_k în E'' încît $0 \leq y''_k \leq u_k$ și imaginea canonică a lui y''_k în (E'', x') este v_k . Avem

$$\sum_{k=1}^n y''_k(x') = \bigvee_{k=1}^n y''_k(x') = \left\| \bigvee_{k=1}^n v_k \right\|$$

și conform Lemei 1.2 există un șir de elemente mutual disjuncte

$x'_k \in [0, x']$ încît $\sum y_k^n(x'_k) = \infty$ Avem deasemeni

$\sum x'_k(x_k) = \infty$ și o nouă aplicare a Lemei 1.2 ne dă un șir $\{d_k\}_k$ de elemente disjuncte din L_+ cu $0 \leq d_k \leq x_k$ pentru fiecare k și $\sum x'_k(d_k) = \infty$. Deoarece $0 \leq x'_k \leq x'$ rezultă

$$\sup x' \left(\bigvee_{k=1}^n d_k \right) = \sum x'(d_k) = \infty$$

și deci $\{d_k\}_k$ nu este 0 -mărginit în L^n . ■

1.5 TEOREMA (Cartwright și Lotz [4]). Fie L o latică Banach și X un spațiu Banach.

(a) Un operator $T \in \mathcal{L}(L, X)$ este con absolut sumabil dacă și numai dacă $\sum \|T(x_k)\| < \infty$ pentru orice șir sumabil de elemente disjuncte x_k din L_+ .

(b) Un operator $T \in \mathcal{L}(X, L)$ este majorizant dacă și numai dacă pentru orice șir $\{z_k\}_k$ convergent la 0 în X și orice șir $\{x_k\}_k$ de elemente disjuncte din L_+ cu $0 \leq x_k \leq |Tz_k|$ ($k \in \mathbb{N}$), șirul $\{x_k\}_k$ este slab sumabil.

Demonstrație. Partea de necesitate este clară. Suficiența la punctul (b) rezultă din Lema 1.4.

Fie $T \in \mathcal{L}(L, X)$ un operator care transformă orice șir sumabil de elemente disjuncte din L_+ într-un șir absolut sumabil. Vrem să arătăm că T este con absolut sumabil sau, echivalent, că T' este majorizant. Într-adevăr, presupunînd contrariul ar rezulta din afirmația (b) existența unui șir $\{z'_k\}_k$ convergent la 0 în X' , a unui șir $\{x'_k\}_k$ de

elemente disjuncte din L_+ care nu este slab sumabil dar
 $0 \leq x'_k \leq |T'z'_k|$ ($k \in \mathbb{N}$). Alegem $x \in L_+$ incit

$$\sum x'_k(x) = \infty$$

Din Lema 1.2 rezultă un șir de elemente disjuncte $x_k \in [0, x]$
 incit $\sum x'_k(x_k) = \infty$. Rezultă $\sum |T'z'_k| x_k = \infty$.

Dar

$$|T'z'_k| x_k = \sup \{ T'z'_k(y_k); y_k \in [-x_k, x_k] \}$$

și deci pentru fiecare k există elemente $y_k \in [-x_k, x_k]$
 incit $\sum z'_k(Ty_k) = \infty$. Aceasta contrazice ipoteza

căci șirurile $\{ \|z'_k \| y_k^+ \}$ și $\{ \|z'_k \| y_k^- \}$ sînt sumabile
 și disjuncte în L_+ și

$$\begin{aligned} \sum |z'_k(Ty_k)| &\leq \sum \|z'_k\| \cdot \|Ty_k\| \leq \\ &\leq \sum \|z'_k\| \cdot \|Ty_k^+\| + \sum \|z'_k\| \cdot \|Ty_k^-\| \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Din Teorema 1.5 rezultă noi caracterizări ale laticilor
 de tip AM :

O latice Banach L este izomorfă cu o latice de tip AM
 dacă și numai dacă orice șir de elemente disjuncte și pozi-
 tive, normic convergent la $\hat{0}$ în L este α -mărginit în L^* .

O latice Banach L este izomorfă cu o latice de tip AM
 dacă și numai dacă orice șir normalizat de elemente dis-
 juncte din L_+ este echivalent cu baza naturală a lui c_0 .

Tehnicile de disjunctare permit însă demonstrarea și
 a altor rezultate ca de exemplu următoarea precizare la o
 teoremă a lui Bessaga și Pelczynski :

1.6 TEOREMA. Fie L o latice Banach astfel că L' conține o sublatice izomorfă cu c_0 . Atunci L conține o sublatice izomorfă cu

Demonstrație. Conform ipotezei există un șir $\{d'_k\}_k$ de elemente disjuncte din L' , constante $m, M > 0$ astfel că pentru orice familie de scalari $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ avem

$$m \max |\lambda_k| \leq \left\| \sum \lambda_k d'_k \right\| \leq M \max |\lambda_k|.$$

Există $d' = \sup_k d'_k \in L'$ și $\|d'\| \leq M$. Fie $\epsilon > \epsilon > 0$.

Pentru fiecare indice k alegem cîte un element $x_k \in L$ încît $\|x_k\| \leq 1$ și $d'_k(x_k) \geq (1-\epsilon) \|d'\| \geq (1-\epsilon)m$. Conform demonstrației la Lema 1.2, pentru $\delta > 0$ există un subșir $\{d'_{n_k}\}$ a lui $\{d'_k\}_k$, și un subșir de elemente disjuncte $\{d_k\}_k \subset L$ încît $0 \leq d_k \leq x_{n_k}$ și $d'_{n_k}(d_k) \geq \delta d'_{n_k}(x_{n_k}) \geq \delta(1-\epsilon)m$ pentru orice k . Atunci pentru orice familie finită $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ avem

$$\begin{aligned} \sum |\lambda_k| &\geq \left\| \sum \lambda_k d_k \right\| = \left\| \sum |\lambda_k| d_k \right\| \\ &\geq \frac{1}{M} x'(\sum |\lambda_k| d_k) \geq \\ &\geq \frac{1}{M} \sum |\lambda_k| x'(d_k) \geq \\ &\geq \frac{m\delta(1-\epsilon)}{M} \sum |\lambda_k| \end{aligned}$$

ceea ce implică faptul că $\{d_k\}_k$ este echivalent cu baza naturală a lui ℓ_1 . ■

2. OPERATORI COMPACTI DEFINIȚI PE LATICE BANACH

Principalele rezultate obținute în această problemă se datoresc lui Dodds și Fremlin [6] și Aliprantis și Burkinshaw [1]. Ei propun realizarea operatorilor compacți dintr-un produs de trei operatori cu diferite grade de compacitate.

Fie E lattice Banach, F lattice Banach și $T \in \mathcal{L}(E, F)$.

Spunem că T este aproape o-mărginit dacă pentru orice $\varepsilon > 0$ există un element $u \in F_+$ astfel că

$$Tx \in \varepsilon B(F) + [-u, u] \quad \text{pentru orice } x \in E.$$

Am notat cu $B(F)$ bula unitate a lui F .

Spunem că T este ($\sigma, |\sigma|$)-precompact dacă toate compunerile $E \xrightarrow{\iota} E \xrightarrow{T} F \xrightarrow{\pi} (F, \sigma)$ sint precompacte; $|\sigma|$ semnifică topologia dată de seminormele $y'(|\cdot|)$ cu $y' \in F'_+$.

Spunem că T este aproape absolut continuu dacă pentru orice $\varepsilon > 0$ există un $x' \in E'_+$ astfel încât

$$\|Tx\| \leq \varepsilon \|x\| + x'(|x|) \quad \text{pentru orice } x \in E.$$

Orice operator compact este simultan de una din formele specificate mai sus și dacă compunem un operator aproape absolut continuu cu un operator ($\sigma, |\sigma|$)-compact și apoi cu un operator aproape o-mărginit obținem un operator compact.

2.1 TEOREMA. (Aliprentis și Burkinshaw [1]). Fie $T \in \mathcal{L}(E, E)$ un operator compact și pozitiv, și fie $S \in \mathcal{L}(E, E)$ un operator pozitiv astfel că $0 \leq S \leq T$.

Atunci S^3 este un operator compact.

Demonstrația se reduce în esență la motivarea faptului că fiecare din cele 3 clase de operatori semnalate mai sus sînt ideale în sensul ordinii, adică verifică condiția

$$0 \leq S \leq T, T \in \mathcal{L} \text{ implică } S \in \mathcal{L}.$$

Un exemplu care ne arată că puterea 3 nu poate fi redusă se obține astfel. Notăm cu $\{r_n\}_n$ sistemul funcțiilor Rademacher și considerăm operatorii $S_1: l_1 \rightarrow L_2[0,1]$, $S_2: L_2[0,1] \rightarrow l_\infty$, $T_1: l_1 \rightarrow L_2[0,1]$ și $T_2: L_2[0,1] \rightarrow l_\infty$ definiți prin

$$S_1(\{a_n\}_n) = \sum a_n r_n^+,$$

$$S_2(f) = \left(\int_0^1 f r_1^+ dx, \int_0^1 f r_2^+ dx, \dots \right)$$

$$T_1(\{a_n\}_n) = \left(\sum a_n \right) \cdot \chi_{[0,1]}$$

$$T_2(f) = \left(\int_0^1 f dx, \int_0^1 f dx, \dots \right)$$

Considerăm $E = l_1 \oplus L_2[0,1] \oplus l_\infty$ și

$$S = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ S_1 & 0 & 0 \\ 0 & S_2 & 0 \end{pmatrix}; \quad T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ T_1 & 0 & 0 \\ 0 & T_2 & 0 \end{pmatrix}$$

Atunci $0 \leq S \leq T$, T este compact și

$$S^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ S_2 S_1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

nu este compact.

3. OPERATORI CONTINUI IN SENSUL ORDINEI

Fie L o latice Banach și X un spațiu Banach .

Spunem că un operator $T \in \mathcal{L}(L, X)$ este de tip A dacă

$0 \leq x_n \downarrow$ în E implică $\{Tx_n\}_n$ este normic convergent

Spunem că T este de tip B dacă

$0 \leq x_n \uparrow$, $\|x_n\| \leq K$ în L implică $\{Tx_n\}_n$ este normic convergent în X .

Dacă L este o latice Banach σ -completă atunci L_L este de tip A \iff L este o latice cu topologie σ -continuă și L_L este de tip B \iff L este o latice Banach slab secvențial completă. Rezultatele obținute de Lozanovski [9] Meyer-Nieberg [10], [11] și Lotz [8] privind aceste două clase de latici au reprezentat principalele rezultate obținute în teoria laticilor Banach în jurul anilor 70. Este interesant de remarcat că analogul operatorial al acestor rezultate este încă adevărat și contextul lor de valabilitate poate fi extins.

Vom nota că Dodds [5] a fost primul care a dat atenție operatorilor de tip A (numindu-i 0- slab compacți, deoarece se arată imediat că acești operatori sînt precis operatorii care transformă intervalele în mulțimi relativ slab compacte). Rezultatele noastre, expuse în [12] și [13] se conțin pe acelea ale lui Dodds.

Încercînd să prezentăm un rezumat al acestor rezultate vom începe cu o extensie a noțiunii de σ -completitudine a unei latici Banach .

O latice Banach L se numește aproape σ -completă dacă pentru orice șir o-mărginit de elemente pozitive mutual disjuncte $d_n \in L$ există un operator $T \in \mathcal{L}(l_\infty, L)$ astfel că $Te_n = d_n$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$. Am notat cu $\{e_n\}_n$ baza naturală a lui c_0 .

Un șir $\{d_n\}_n$ ca în definiția de mai sus este slab sumabil și deci asociat unui operator $T \in \mathcal{L}(c_0, L)$. Definiția spune că dacă L este aproape σ -complet atunci T se extinde la l_∞ .

Este clar că orice latice Banach σ -completă este și aproape σ -completă.

3.1 LEMA. Fie L o latice Banach aproape σ -completă și I un ideal închis al său . Atunci L/I este de asemenea aproape σ -completă.

În particular latices Banach $c(\beta\mathbb{N} \setminus \mathbb{N}) = l_\infty / c_0$ este aproape σ -completă deși nu este σ -completă.

3.2 LEMA .Admitem axioma contănuului. Atunci orice latice Banach care are proprietatea interpolatorie este aproape σ -completă.

Amintim că o latice Banach L are proprietatea interpolatorie dacă pentru orice șiruri $\{x_n\}_n$ și $\{y_n\}_n$ din L cu $x_m \leq y_n$ pentru orice $m, n \in \mathbb{N}$ există un $x \in L$ încît $x_n \leq x \leq y_n$ pentru orice $n \in \mathbb{N}$.

3.3 LEMA. Orice sublatice complementată a unei latice aproape σ -completă este aproape σ -completă.

Se ştie că proprietatea interpolatorie nu se transmite în mod necesar sublaticilor complementate. Vezi [15]. Rezultă că proprietatea interpolatorie este distinctă de proprietatea de aproape σ -completitudine.

3.4 TEOREMA. Fie L o latice Banach aproape σ -completă, X un spaţiu Banach şi $T \in \mathcal{L}(L, X)$. Atunci următoarele afirmaţii sînt echivalente

- i) T este de tip A ;
- ii) T transformă idealul I_E , generat de E în E , într-o parte a lui F ;
- iii) T are proprietatea lui Pelczynski (u), adică pentru orice şir slab Cauchy $\{x_n\}_n$ în E există un şir slab sumabil $\{y_n\}_n$ în $\overline{T(L)}$ astfel că

$$Tx_n - \sum_{k=1}^n x_k \xrightarrow{w} 0 ;$$

- iv) Nu există nici-un subspaţiu Z a lui L , izomorf cu $C[0,1]$ astfel că $T|_Z$ să fie un izomorfism
- v) Nu există nici-un subspaţiu Z a lui L , izomorf cu l_∞ astfel că $T|_Z$ este un izomorfism .

3.5 TEOREMA. Fie L o latice Banach, X un spaţiu Banach şi $T \in \mathcal{L}(L, X)$. Următoarele afirmaţii sînt echivalente :

- i) T este de tip B ;
- ii) Dacă $\{x_n\}_n$ este un şir slab sumabil de elemente pozitive a lui L atunci $\|Tx_n\| \rightarrow 0$;

Cda. 58/982 Fasc. 4

iii) Nu există nici o subalgebra Z a lui L , izomorfă cu c_0 astfel că $T|_Z$ este un izomorfism.

Cititorul interesat va găsi detaliile de demonstrație în [42] .

Menționăm în încheiere faptul că autorul nu cunoaște dacă operatorii de tip B sînt precis operatorii care transformă șirurile slab Cauchy în șiruri slab convergente.

BIBLIOGRAFIE

1. C.D.Aliprantis and O.Burkinshaw, Positive compact operators on Banach lattices, *Math.Z.* 174 (1980), 289-298
2. A.V.Buhvalov, A.I.Veksler și G.Ia.Lozanovski, Latici Banach. Aspecte izomorfe, *Uspehi Mat.Nauk* 34 (1979), 137-183 (In limba rusă).
3. D.I.Cartwright and H.P.Lotz, Some characterisations of AM - and AL - spaces, *Math.Z.* 142 (1975), 97-103
4. D.I.Cartwright and H.P.Lotz, Disjuncte Folgen in Banachverbanden und Kegel-absolutsummierende operatoren, *Archiv der Math.* XXVIII (1977) , 525-532
5. P.G.Dodds, σ -weakly compact mappings of Riesz spaces, *Trans.A.M.S.* 214 (1975), 389-402
6. P.G.Dodds and D.H.Fremlin , Compact operators in Banach lattices , *Israel J.Math.* 24 (1979), 287-320
7. A.Grothendieck , Sur les applications lineaires faiblement compactes d'espaces du type $C(K)$, *Canad.J.Math.* 5 (1953) 129- 173

8. H.P.Lotz ,Minimal and reflexive Banach lattices, Math. Ann. 209 (1974),117- 126
9. Lozanovski G.Ja., On ordered Banach spaces and bases, Funkt.Analiz i Priloz. 3(1967), 92
- 10.P.Meyer-Nieberg ,Zur schwachen Kompaktheit in Banach - verbanden ,Math.Z. 134(1973),303-315
- 11.P.Meyer-Nieberg.Charakterisierung einiger topologischer und ordnungstheoretischer Eigenschaften von Banachver- banden mit Hilfe disjunkter Folgen, Arch.Math. 24(1973), 640 - 647
- 12.C.Niculescu , On \mathcal{F} -continuous operators ,to appear
- 13.C.Niculescu , Latici Banach aprobe \mathcal{F} -complete,comunicare la Acad.R.S.R., 13 mai 1982
- 14.H.P.Rosenthal, On relatively disjoint families of mea- sures with some applications to Banach space theory, Studia Math. 37(1970),13-36
- 15.G.L.Seever, Measures on F-spaces,Trans.A.M.S. 133(1968), 267-280
16. U.Schlotterbeck, Uber Klassen Majorisierbarer Operatoren auf Banachverbanden ,Revista de la Academia de ciencias exactas, fis.-quimicas y naturales Zaragoza II Ser.26 (1971),585-614

CONURI LATICIALE IN TEORIA

APROXIMARII

de

G. Păltineanu

Prin con laticial se înțelege un con convex de funcții reale și mărginite pe o mulțime X , care conține funcțiile constante și este închis la operațiile laticiale. Pentru un asemenea con se poate stabili o teoremă de tip Kakutani-Stone care permite apoi construirea unei teorii a compactificării ordonate a unui spațiu topologic ordonat.

În lucrarea de față se prezintă în mod unitar și concis această teorie, folosindu-se de regulă demonstrații directe, care diferă de cele întâlnite în literatura de specialitate.

§ 1. Teorema de caracterizare

În cele ce urmează, pentru orice mulțime X vom nota cu $B(X)$ spațiul funcțiilor reale și mărginite pe X . Pe acest spațiu se consideră topologia convergenței uniforme dată de norma $f \rightarrow \|f\| = \sup \{ |f(x)| ; x \in X \}$.

Definiția 1. Un con $\Gamma \subset B(X)$ se numește con laticial (de funcții) pe X dacă

- 1) Conține funcțiile constante,
- 2) Γ este lattice ($f \vee g \in \Gamma$ și $f \wedge g \in \Gamma$ pentru orice $f, g \in \Gamma$).

Definiția 2. Dacă $\Gamma \subset B(X)$ este un con laticial pe X , atunci vom nota cu $\overline{\Gamma}$ mulțimea tuturor funcțiilor $f \in B(X)$ care au proprietatea că pentru orice $s, r \in \mathbb{R}$ în situația $s > r$, există $\xi_{sr} \in \Gamma$ cu proprietățile:

- 1) $0 \leq \xi_{sr} \leq 1$

2) $\varepsilon_{sr}(x) = 1$ dacă $f(x) \geq s$

3) $\varepsilon_{sr}(x) = 0$ dacă $f(x) < r$

Observația 1. Dacă pentru orice $f \in B(X)$ și orice $t \in \mathbb{R}$, notăm cu $\{f \geq t\} = \{x \in X; f(x) \geq t\}$, atunci $f \in \tilde{\Gamma}$ dacă și numai dacă pentru orice $s, r \in \mathbb{R}$, $s > r$, există $\varepsilon_{sr} \in \Gamma$ astfel încît

$$\mathbb{1}_{\{f \geq s\}} \leq \varepsilon_{sr} \leq \mathbb{1}_{\{f \geq r\}} \quad 1)$$

Observația 2. Dacă Γ este con laticial pe X , atunci $\Gamma \subset \tilde{\Gamma}$
Intr-adevăr, dacă $f \in \Gamma$ și $s > r$, atunci fie

$$(1) \varepsilon_{sr} = \frac{\mathbb{1} \wedge [(f-r) \vee 0]}{s-r}$$

Deoarece Γ este con laticial, rezultă imediat că $\varepsilon_{sr} \in \Gamma$
Pe de altă parte se verifică ușor că funcția definită de (1) are proprietatea $\mathbb{1}_{\{f \geq s\}} \leq \varepsilon_{sr} \leq \mathbb{1}_{\{f \geq r\}}$

Lema 1. Dacă Γ este con laticial pe X , atunci $\tilde{\Gamma}$ este con laticial închis pe X .

Demonstrație.

Pentru început vom arăta că dacă $f_1, f_2 \in \tilde{\Gamma}$ atunci $f_1 + f_2 \in \tilde{\Gamma}$. Intr-adevăr, fie $s > r$ și $\varepsilon = \frac{s-r}{3}$

Pentru orice $x \in X$, există $m = m(x) \in \mathbb{Z}$ astfel încît

$$(2) s - (m-1)\varepsilon > f_1(x) \geq s - m\varepsilon$$

Dacă presupunem în plus că $x \in \{f_1 + f_2 \geq s\}$, atunci $f_2(x) \geq s - f_1(x)$ și deci avem

$$(3) f_2(x) \geq (m-1)\varepsilon$$

1) Pentru orice mulțime $A \subset X$ se notează cu $\mathbb{1}_A$ funcția sa caracteristică.

Din (2) și (3) rezultă

$$(4) \{f_1 + f_2 \geq s\} \subset \bigcup_{m \in \mathbb{Z}} [\{f_1 \geq s - m\varepsilon\} \cap \{f_2 \geq (m-1)\varepsilon\}] = E$$

Deoarece f_1 și f_2 sînt mărginite pe X , numai un număr finit de mulțimi din reuniunea din dreapta vor fi nevide. Fie $Z_0 \subset \mathbb{Z}$,

Z_0 finită, astfel încît

$$(5) h = \bigcup_{m \in Z_0} [\{f_1 \geq s - m\varepsilon\} \cap \{f_2 \geq (m-1)\varepsilon\}]$$

Cum $f_1, f_2 \in \tilde{\Gamma}$, pentru orice $m \in \mathbb{Z}$ există $h_m, \varepsilon_m \in \Gamma$ astfel încît:

$$(6) \mathbb{1}_{\{f_1 \geq s - m\varepsilon\}} \leq h_m \leq \mathbb{1}_{\{f_1 \geq s - (m+1)\varepsilon\}}$$

$$(7) \mathbb{1}_{\{f_2 \geq (m-1)\varepsilon\}} \leq \varepsilon_m \leq \mathbb{1}_{\{f_2 \geq (m-2)\varepsilon\}}$$

In continuare avem

$$\begin{aligned} \mathbb{1}_{\{f_1 + f_2 \geq s\}} &\leq \mathbb{1}_E = \bigvee_{m \in \mathbb{Z}_0} \mathbb{1}_{\{f_1 \geq s - m\varepsilon\} \cap \{f_2 \geq (m-1)\varepsilon\}} \\ &\leq \bigvee_{m \in \mathbb{Z}_0} (h_m \wedge \varepsilon_m) \leq \bigvee_{m \in \mathbb{Z}_0} \mathbb{1}_{\{f_1 \geq s - (m+1)\varepsilon\} \cap \{f_2 \geq (m-2)\varepsilon\}} \\ &\leq \mathbb{1}_{\{f_1 + f_2 \geq s - 3\varepsilon\}} = \mathbb{1}_{\{f_1 + f_2 \geq r\}} \end{aligned}$$

Așadar, rezultă

$$(8) \mathbb{1}_{\{f_1 + f_2 \geq s\}} \leq \bigvee_{m \in \mathbb{Z}_0} (h_m \wedge \varepsilon_m) \leq \mathbb{1}_{\{f_1 + f_2 \geq r\}}$$

Deoarece Z_0 este finită și Γ este lattice, rezultă că

$$\bigvee_{m \in \mathbb{Z}_0} (h_m \wedge \varepsilon_m) \in \Gamma \quad \text{și deci că } f_1 + f_2 \in \tilde{\Gamma}$$

Fie $f \in \tilde{\Gamma}$, $\alpha > 0$ și $s > r$. Atunci există $g \in \Gamma$ astfel încît

$$\mathbb{1}_{\{f \geq \frac{s}{\alpha}\}} \leq \mathbb{1} \leq \mathbb{1}_{\{f \geq \frac{r}{\alpha}\}}, \text{ de unde rezultă}$$

$$(9) \mathbb{1}_{\{\alpha f \geq s\}} \leq \mathbb{1} \leq \mathbb{1}_{\{\alpha f \geq r\}} \text{ și deci că } \alpha f \in \tilde{\Gamma}$$

Am arătat deci că $\tilde{\Gamma}$ este con convex. Faptul că $\tilde{\Gamma}$ conține funcțiile constante este evident. Este de asemenea imediat că $\tilde{\Gamma}$ este lattice. Rămîne să arătăm că $\tilde{\Gamma}$ este închis în topologia convergenței uniforme pe X .

Pentru aceasta, fie $\{f_n\} \subset \tilde{\Gamma}$, $f_n \rightarrow f$ și $s > r$.

Pentru $\varepsilon = \frac{s-r}{3}$, există $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ așa ca

$$(10) \|f_{n_\varepsilon} - f\| < \varepsilon \text{ și deci}$$

$$(11) f - \varepsilon \leq f_{n_\varepsilon} \leq f + \varepsilon$$

Deoarece $f_{n_\varepsilon} \in \tilde{\Gamma}$, din Observația 2 rezultă că există $h \in \tilde{\Gamma}$ astfel încît

$$(12) \mathbb{1}_{\{f_{n_\varepsilon} \geq s - \varepsilon\}} \leq h \leq \mathbb{1}_{\{f_{n_\varepsilon} \geq s - 2\varepsilon\}}$$

În continuare, din (11) și (12) rezultă

$$\mathbb{1}_{\{f \geq s\}} \leq \mathbb{1}_{\{f_{n_\varepsilon} \geq s - \varepsilon\}} \leq h \leq \mathbb{1}_{\{f_{n_\varepsilon} \geq s - 2\varepsilon\}} \leq \mathbb{1}_{\{f \geq s - 3\varepsilon\}} \leq \mathbb{1}_{\{f \geq r\}}$$

Așadar, $f \in \tilde{\Gamma}$ și cu aceasta demonstrația lemei este terminată.

Teorema 1 (de caracterizare).

Dacă Γ este un con laticial pe X , atunci $\bar{\Gamma} = \tilde{\Gamma}$

Demonstrație.

Faptul că $\bar{\Gamma} \subset \tilde{\Gamma}$, rezultă din Observația 1 și Lema 1.

Rămîne să verificăm incluziunea inversă. Pentru aceasta, fie $f \in \tilde{\Gamma}$. Deoarece $\tilde{\Gamma} \subset B(X)$, este con convex și conține funcțiile constante, putem presupune că $f \geq 0$.

Fie $\varepsilon > 0$ arbitrar și fie $n_0 \in \mathbb{N}$ astfel încît

$$(13) f \leq n_0 \varepsilon$$

Cum $f \in \tilde{\Gamma}$, rezultă că pentru orice $n \in \mathbb{N}$ există $g_n \in \Gamma$ cu proprietatea

$$(14) \quad \mathbb{1}_{\{f \geq n\varepsilon\}} \leq g_n \leq \mathbb{1}_{\{f \geq (n-1)\varepsilon\}}$$

În continuare, avem

$$n\varepsilon \leq \int g_n \leq \int \mathbb{1}_{\{f \geq (n-1)\varepsilon\}} \leq \int f + \varepsilon \quad \text{pentru orice } n \in \mathbb{N}, \text{ de}$$

unde rezultă acum

$$(15) \quad f + \varepsilon \geq g = \bigvee_{n=1}^{n_0+1} g_n \in \Gamma$$

Pe de altă parte, pentru orice $x \in X$, există $m = m(x) \in \mathbb{N}$ astfel încît

$$(16) \quad m\varepsilon \leq f(x) \leq (m+1)\varepsilon$$

Evident, $m+1 \leq n_0$ și deci avem

$$(17) \quad g(x) \geq m\varepsilon \leq g_m(x)$$

În continuare, din (16) rezultă că $x \in \{f \geq m\varepsilon\}$ și din (14)

$$(18) \quad g_m(x) = 1. \text{ Acum din (16), (17) și (18) vom avea}$$

$$(19) \quad g(x) \geq m\varepsilon \geq f(x) - \varepsilon. \text{ Din (15) și (19) rezultă că}$$

$$\mathbb{1}_{\{f-g\}} < \varepsilon \quad \text{și deci că } f \in \tilde{\Gamma}$$

§ 2. Teorema Kakutani-Stone pentru conuri laticiale

În acest paragraf cu X se notează un spațiu Hausdorff compact și cu $C(X)$ mulțimea funcțiilor continue pe X cu valori reale.

Dacă $\Gamma \subset C(X)$ este un con laticial, vom introduce următoarea relație de preordine pe X :

$$(1) \quad x \leq y \text{ dacă și numai dacă } g(x) \leq g(y), (\forall) g \in \Gamma$$

Este clar că dacă presupunem în plus că Γ separă punctele lui X , rezultă că relația definită de (1) este chiar o relație de ordine.

Teorema 2 (Kakutani-Stone).

Dacă X este un spațiu Hausdorff compact și $\Gamma \subset C(X)$ este un con laticial, atunci închiderea sa $\bar{\Gamma}$ coincide cu mulțimea tuturor funcțiilor $f \in C(X)$ care sînt crescătoare față de relația de preordine \leq_{Γ} definită de (1).

Demonstrație.

Fie \mathcal{F} mulțimea tuturor funcțiilor $f \in C(X)$ care au proprietatea că $f(x) \leq f(y)$ dacă $x \leq_{\Gamma} y$.

Deoarece incluziunea $\bar{\Gamma} \subset \mathcal{F}$ este evidentă, rămîne să verificăm incluziunea inversă. Din Teorema 1 rezultă că este suficient să arătăm că $\mathcal{F} \subset \bar{\Gamma}$. Fie deci $f \in \mathcal{F}$ și $s, r \in \mathbb{R}$, în situația $s > r$. Presupunem prin absurd că $f \notin \bar{\Gamma}$. Atunci există $x_0 \in \{f \geq s\}$ și $y_0 \in \overline{\{f < r\}}$ astfel încît $x_0 \leq_{\Gamma} y_0$. Într-adevăr, dacă nu ar fi așa, pentru orice $x \in \{f \geq s\}$ și orice $y \in \overline{\{f < r\}}$, ar exista $\varepsilon_{xy} \in \Gamma$ astfel încît $\varepsilon_{xy}(x) > \varepsilon_{xy}(y)$. Fără a restrînge generalitatea (Γ fiind con laticial), putem presupune că $0 \leq \varepsilon_{xy} \leq 1$, $\varepsilon_{xy}(x) = 1$ și $\varepsilon_{xy}(y) = 0$.

Fixăm $x \in \{f \geq s\}$. Din cele de mai sus rezultă că pentru orice $y \in \overline{\{f < r\}}$, există $\varepsilon_y \in \Gamma$, cu proprietățile $0 \leq \varepsilon_y \leq 1$, $\varepsilon_y(x) = 1$ și $\varepsilon_y(y) = 0$.

Fie $U_y = \{ \varepsilon_y < \frac{1}{4} \}$. Evident, U_y este deschisă și $y \in U_y$. Deoarece $\overline{\{f < r\}}$ este compactă, rezultă că există un număr finit $y_1, \dots, y_n \in \overline{\{f < r\}}$ astfel încît $\overline{\{f < r\}} \subset \bigcup_{i=1}^n U_{y_i}$

Dacă notăm cu $\varepsilon_x = \bigvee_{i=1}^n \varepsilon_{y_i}$, atunci $\varepsilon_x \in \Gamma$, $\varepsilon_x(x) = 1$ și

$\varepsilon_x(y) < \frac{1}{4}$ pentru orice $y \in \overline{\{f < r\}}$.

Fie acum $V_x = \{ \varepsilon_x > \frac{3}{4} \}$. Evident, $\{V_x\}_{x \in \{f \geq s\}}$ este

o acoperire deschisă a mulțimii compacte $\{f \geq s\}$ și deci există $x_1, \dots, x_m \in \{f \geq s\}$ astfel încît

$$\{f \geq s\} \subset \bigcup_{i=1}^m V_{x_i}$$

Dacă notăm acum cu $g = \bigwedge_{i=1}^m \epsilon_{x_i}$, atunci $g \in \Gamma$, $0 \leq g \leq 1$,

$g > \frac{3}{4}$ pe mulțimea $\{f \geq s\}$ și $g < \frac{1}{4}$ pe mulțimea $\overline{\{f < r\}}$.

În continuare avem:

$$(2) \quad \mathbb{1}_{\{f \geq s\}} \leq \mathbb{1}_{\{g \geq \frac{3}{4}\}} \leq 2 \left[\left(g - \frac{1}{4} \right) \vee 0 \right] \leq \mathbb{1}_{\{g \geq \frac{1}{4}\}} \leq \mathbb{1}_{\{f \geq r\}}$$

Deoarece Γ este un laticial, rezultă că $2 \left[\left(g - \frac{1}{4} \right) \vee 0 \right] \in \Gamma$

Cum și s și r au fost luați arbitrari cu condiția $s > r$, înseamnă că din (2) rezultă că $f \in \tilde{\Gamma}$, contrar ipotezei de absurd.

Așadar, dacă presupunem prin absurd că $f \notin \tilde{\Gamma}$, atunci există $x_0 \in \{f \geq s\}$ și $y_0 \in \overline{\{f < r\}}$, astfel încît $x_0 \leq_{\Gamma} y_0$. Deoarece $f \in \tilde{\mathcal{F}}$, rezultă $f(x_0) \leq f(y_0)$.

Dacă notăm cu $E = \{f \geq s\}$ și cu $F = \overline{\{f < r\}}$ în continuare vom avea:

$$s \leq \inf f(E) \leq f(x_0) \leq f(y_0) \leq \sup f(F) = \sup f(F) \leq r$$

Am ajuns astfel la o contradicție, deoarece s-a presupus că $s > r$.

Observația 3. Dacă în enunțul Teoremei 2 presupunem în plus că Γ este subspațiu liniar, reobținem o binecunoscută generalizare a teoremei Stone-Weierstrass pentru latici.

Intr-adevăr, dacă Γ este lattice vectorială, atunci $x \leq_{\Gamma} y$ dacă și numai dacă $g(x) = g(y)$ pentru orice $g \in \Gamma$. Pe de altă parte, a spune că f este crescătoare față de \leq_{Γ} revine la a spune că $f(x) = f(y)$ ori de câte ori $g(x) = g(y)$ pentru orice $g \in \Gamma$.

Dacă pentru orice $x \in X$, notăm cu

$$A(x) = \{y \in X; g(y) = g(x), (\forall) g \in \Gamma\},$$

atunci din Teorema 2 și precizările de mai sus rezultă:

$$\overline{\Gamma} = \{f \in C(X); f|A(x) = \text{constant}, \text{ pentru orice } x \in X\}$$

Evident, dacă se presupune în plus că Γ separă punctele lui X va rezulta că

$$\bar{\Gamma} = C(X)$$

§ 3. Conuri laticiale compatibile pe spații ordonate topologice

Fie X o mulțime oarecare și $\Gamma \subset B(X)$ un con laticial. Vom nota cu τ_Γ cea mai slabă topologie pe X pentru care funcțiile din Γ rămân continue.

Propoziția 1. O bază pentru topologia τ_Γ este formată din mulțimile de forma $\{f > 0 > g\}$ când f și g parcurg mulțimea Γ .

Demonstrație.

Fie $\mathcal{B} = \{f > 0 > g\}_{f, g \in \Gamma}$. Deoarece Γ este lattice și conține funcțiile constante, rezultă imediat că $X \in \mathcal{B}$ și că $B_1 \cap B_2 \in \mathcal{B}$ dacă $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$.

Pentru orice $a \in X$, fie $\mathcal{V}(a)$ mulțimea tuturor submulțimilor $V \subset X$ care au proprietatea că există $f, g \in \Gamma$ astfel încât $V \supset \{f > 0 > g\} \ni a$.

Fie $\tilde{\tau}$ topologia pe X în care $\mathcal{V}(a)$ este familia de vecinătăți ale punctului a . Este evident că \mathcal{B} este baza topologiei $\tilde{\tau}$.

Deoarece pentru orice $f, g \in \Gamma$ mulțimea $\{f > 0 > g\}$ este τ_Γ -deschisă, rezultă că $\tilde{\tau}$ este mai puțin fină ca τ_Γ .

Fie acum $h \in \Gamma$, $a \in X$ și $\varepsilon > 0$. Dacă notăm cu $f = h - h(a) + \varepsilon$ și $g = h - h(a) - \varepsilon$, atunci $f, g \in \Gamma$ și

$$V = \{x; |h(x) - h(a)| < \varepsilon\} = \{x; f(x) > 0 > g(x)\} \in \mathcal{B}.$$

Prin urmare h este $\tilde{\tau}$ -continuă pe X pentru orice $h \in \Gamma$. Cum τ_Γ este cea mai slabă topologie cu această proprietate, rezultă că τ_Γ este mai puțin fină decât $\tilde{\tau}$.

Așadar, $\tilde{\tau} = \tau_\Gamma$ și cu aceasta, propoziția este demonstrată.

Definiția 3. Se numește spațiu topologic ordonat o mulțime X înzestrată cu o structură topologică τ și o structură de ordine \leq , cu proprietatea că $G = \{(x, y); x \leq y\}$ este o submulțime închisă a lui $X \times X$ față de topologia produs.

Propoziția 2. Orice spațiu topologic ordonat este Hausdorff.

Demonstrație.

Să observăm că dacă $x \neq y$, atunci $(x, y) \notin \bar{\Delta}$, unde cu Δ am notat diagonala lui X .

Intr-adevăr, dacă $(x, y) \in \bar{\Delta}$, atunci există un șir generalizat $(x_1, x_1) \in \Delta$ astfel încât $(x_1, x_1) \rightarrow (x, y)$.

Din definiția spațiului topologic ordonat rezultă că avem $x \leq y$ și $y \leq x$ și deci $x = y$.

Așadar, dacă $x \neq y$, atunci $(x, y) \notin \bar{\Delta}$ și deci există o vecinătate U a lui x și o vecinătate V a lui y , astfel încât $(U \times V) \cap \Delta = \emptyset$. Rezultă că $U \cap V = \emptyset$ și deci că X este Hausdorff.

Definiția 4. Fie (X, τ, \leq) un spațiu topologic ordonat. Un con laticial închis $\Gamma \subset B(X)$ se numește compatibil dacă

- τ este cea mai slabă topologie pe X pentru care toate funcțiile din Γ sînt continue;
- \leq este cea mai mare ordine pe X pentru care toate funcțiile din Γ sînt crescătoare.

În continuare, vom nota cu $C_b(X, \leq)$ mulțimea tuturor funcțiilor $f \in C(X)$ mărginite și crescătoare.

Propoziția 3. Un con laticial închis $\Gamma \subset B(X)$ este compatibil dacă și numai dacă

- $\Gamma \subset C_b(X, \leq)$
- Pentru orice $x \in X$ și orice vecinătate U a sa, există $f \in \Gamma$ și $g \in -\Gamma$ astfel încât

$$\uparrow_{\{x\}} \leq f \wedge g \leq \uparrow_U$$

3) $x \leq y$ dacă și numai dacă $x \leq_{\Gamma} y$ [dacă $h(x) \leq h(y)$ pentru orice $h \in \Gamma$]

Demonstrație.

Necesitatea. Dacă Γ este compatibil, atunci $\tau = \tau_{\Gamma}$ și funcțiile din Γ sînt crescătoare. Rezultă deci că $\Gamma \subset C_b(X, \leq)$. Mai mult, observăm că Γ separă punctele lui X . Într-adevăr, din propozițiile 1 și 2 rezultă că dacă $x_1 \neq x_2$, atunci există $f_1, g_1 \in \Gamma$ ($i=1,2$) astfel încît $x_1 \in U_1 = \{f_1 > 0 > g_1\}$ și $U_1 \cap U_2 = \emptyset$

Să observăm acum că sau $f_1(x_1) \neq f_1(x_2)$ sau $g_1(x_1) \neq g_1(x_2)$ deoarece în caz contrar, rezultă că $f_1(x_2) > 0 > g_1(x_2)$ și deci că $x_2 \in U_1$, ceea ce este absurd.

Așadar, Γ separă punctele lui X și deci \leq_{Γ} este o relație de ordine pe X .

Deoarece Γ este compatibil și funcțiile din Γ sînt evident crescătoare față de \leq_{Γ} , rezultă că $x \leq_{\Gamma} y \Rightarrow x \leq y$.

Pe de altă parte este evident că $x \leq y \Rightarrow x \leq_{\Gamma} y$. Prin urmare avem demonstrația lui 3).

Fie acum U o τ -vecinătate a lui x . Cum $\tau = \tau_{\Gamma}$, putem presupune că există $f, g \in \Gamma$ astfel încît

$x \in U = \{f > 0 > g\} = \{(f \wedge -g) > 0\}$. Dacă introducem notațiile $\tilde{f} = f \vee 0 \in \Gamma$, $\tilde{g} = (-g \vee 0) \in -\Gamma$ și

$$h = 1 \wedge \left[\frac{1}{\tilde{f}(x)} \tilde{f} \right], \quad \ell = 1 \wedge \left[\frac{1}{\tilde{g}(x)} \tilde{g} \right] \in -\Gamma, \text{ atunci}$$

observăm că avem $1 \{x\} \leq h \wedge \ell \leq 1_U$.

Intr-adevăr, dacă $z \notin U$ atunci $f(z) \leq 0$ sau $g(z) \geq 0$ și deci $\tilde{f}(z) = 0$ sau $\tilde{g}(z) = 0$. Rezultă că $(h \wedge \ell)(z) = 0$. Restul afirmației este evident.

Suficiența.

Dacă $\Gamma \subset C_b(X, \leq)$, atunci orice funcție din Γ este τ -continuă și deci τ este mai fină ca τ_{Γ} .

Fie U o τ -vecinătate a lui X . Din (2) rezultă că există $f \in \Gamma$ și $g \in -\Gamma$ astfel încât

$$f \{x\} \leq f \wedge g \leq f \cup$$

Rezultă atunci că $\{x \mid f(x) > 0 > -g(x)\} \ni x$ și deci că U este τ_{Γ} -vecinătate. Așadar $\tau = \tau_{\Gamma}$.

Fie \leq_1 o altă ordine pe X cu proprietatea că orice funcție din Γ este crescătoare față de această ordine.

Dacă $x \leq_1 y$, atunci $h(x) \leq h(y)$ pentru orice $h \in \Gamma$ și deci $x \leq_{\Gamma} y$. Din 3) rezultă acum că $x \leq y$ și cu aceasta propoziția este demonstrată.

Definiția 5. Un spațiu topologic ordonat se numește complet regulat dacă conul $C_{\Gamma}(X, \leq)$ este compatibil.

Observația 4. Pe un spațiu topologic ordonat compact, există cel mult un con laticial închis compatibil.

Intr-adevăr, dacă Γ este un con laticial închis compatibil, atunci $\tau = \tau_{\Gamma}$ și " \leq " = " \leq_{Γ} ". Din Teorema 2 rezultă $\Gamma = C(X, \leq)$.

Următorul rezultat este suficient de cunoscut și de aceea nu-l mai demonstrăm. Pentru demonstrație indicăm [4], pag. 116.

Teorema 3. (Nachbin). Fie X un spațiu topologic ordonat compact. Dacă φ este o funcție reală pe X , superior semicontinuuă și crescătoare și ψ este o funcție reală pe X , inferior semicontinuuă și crescătoare în situația $\varphi \leq \psi$, atunci există o funcție $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ continuă și crescătoare astfel încât $\varphi \leq f \leq \psi$.

Propoziția 4. Orice spațiu topologic ordonat compact este complet regulat.

Demonstrație.

Trebuie să arătăm că $\Gamma = C(X, \leq)$ este con laticial închis compatibil.

Pentru început să arătăm că " \leq " = " \leq_{Γ} ".

Faptul că $x \leq y \implies x \leq_{\Gamma} y$ este evident. Fie acum $x \leq_{\Gamma} y$

și să presupunem prin absurd că $x \not\leq y$.

Dacă notăm cu

$A = I(x) = \{z; x \leq z\}$ și $B = d(y) = \{z; z \leq y\}$, atunci I_A este superior semicontinuu și crescătoare, $d_{X \setminus B}$ este inferior semicontinuu și crescătoare și

$$I_A \leq d_{X \setminus B}$$

Din Teorema 3 rezultă că există $f \in C(X, \leq)$ astfel încât

$$I_A \leq f \leq d_{X \setminus B}$$

În particular, vom avea $f(x) = 1$ și $f(y) = 0$ ceea ce contrazice ipoteza $x \leq y$. Așadar, " \leq " = " \leq_r ".

Faptul că τ_r este mai puțin fină ca τ este evident.

Să observăm însă că $\Gamma = C(X, \leq)$ separă punctele lui X .

Intr-adevăr, dacă $x \neq y$, atunci sau $x < y$ sau $x \not\leq y$. În prima situație există $f \in \Gamma$ astfel încât $f(x) < f(y)$, pentru că în caz contrar am avea $h(x) = h(y)$ pentru orice $h \in \Gamma$ și deci $x = y$, contrar ipotezei. În a doua situație, există $f \in \Gamma$ astfel încât $f(x) = 1 > f(y) = 0$, așa cum am arătat în prima parte a demonstrației. Rezultă că topologia τ_r este Hausdorff.

Observăm că aplicația identică

$$i: (X, \tau) \rightarrow (X, \tau_r)$$

este o bijecție continuă de la un compact pe un spațiu Hausdorff.

Conform unui binecunoscut rezultat de topologie "1" este un homeomorfism și deci $\tau = \tau_r$.

§ 4. Compactificarea spațiilor topologice ordonate

Definiția 6. Fie X un spațiu topologic ordonat. Se numește compactificare ordonată a lui X o pereche (Y, κ) unde Y este

un spațiu topologic ordonat compact iar $\kappa: X \rightarrow Y$ are proprietățile:

a) κ este homeomorfism topologic de la X pe $\kappa(X)$,

b) $x \leq y$ dacă și numai dacă $\kappa(x) \leq \kappa(y)$

c) $\kappa(X)$ este densă în Y .

Teorema 4. Un spațiu topologic ordonat X pe care există un con laticial închis compatibil, admite o compactificare ordonată.

Demonstrație.

Fie Γ un con laticial închis compatibil pe X . Vom nota cu Y mulțimea tuturor funcționalelor $\mu: \Gamma \rightarrow \mathbb{R}$ cu proprietățile:

- a) $\mu(f+g) = \mu(f) + \mu(g)$
- b) $\mu(\lambda f) = \lambda \mu(f)$ pentru $\lambda \geq 0$
- c) $\mu(f \vee g) = \mu(f) \vee \mu(g)$ și $\mu(f \wedge g) = \mu(f) \wedge \mu(g)$
- d) $\mu(\lambda \mathbb{1}) = \lambda$, $(\forall) \lambda \in \mathbb{R}$.

Dacă înzestrăm mulțimea Y cu topologia convergenței punctuale și ordinea punctuală, rezultă că Y este un spațiu topologic ordonat. Definim $\kappa: X \rightarrow Y$ astfel

$$[\kappa(x)](f) = f(x), \quad (\forall) f \in \Gamma.$$

De asemenea, pentru orice $f \in \Gamma$ vom defini $\hat{f}: Y \rightarrow \mathbb{R}$ astfel

$$\hat{f}(\mu) = \mu(f), \quad (\forall) \mu \in Y. \text{ Este evident că avem } \hat{f} \circ \kappa = f. \text{ În continuare rezultă:}$$

$$\|\hat{f} - \hat{g}\| = \sup \{ |(\hat{f} - \hat{g})(\mu)|; \mu \in Y \} \leq \sup \{ |(\hat{f} - \hat{g})[\kappa(x)]|; x \in X \} =$$

$$= \|f - g\|. \text{ Pe de altă parte, dacă notăm cu } \alpha = \|f - g\|, \text{ atunci}$$

$$\text{avem } f - \alpha \leq g \leq f + \alpha \text{ și deci } \hat{f} - \alpha \leq \hat{g} \leq \hat{f} + \alpha \Rightarrow \|\hat{f} - \hat{g}\| \leq \alpha.$$

Așadar, are loc egalitatea $\|f - g\| = \|\hat{f} - \hat{g}\|$ și deci conul $\hat{\Gamma} = \{\hat{f}; f \in \Gamma\}$ este de asemenea închis în $B(Y)$.

În continuare, vom arăta că Y este compact în raport cu topologia convergenței punctuale determinată de $\hat{\Gamma}$. Dacă $f \in \Gamma$, atunci $-\|f\| \leq f \leq \|f\|$ și pentru orice $\mu \in Y$ avem $-\|f\| \leq \mu(f) \leq \|f\|$. Rezultă că $|\mu(f)| \leq \|f\|$, $(\forall) \mu \in Y$. Dacă notăm cu $I(f) = [-\|f\|, \|f\|] \subset \mathbb{R}$ și cu $I = \prod_{f \in \Gamma} I(f)$, atunci I este compact în topologia produs a lui \mathbb{R}^{Γ} .

Definim $\varphi: Y \rightarrow I$ astfel

$$\varphi(\mu) = \prod_{f \in \Gamma} \mu(f)$$

Se verifică ușor că φ este un homeomorfism de la Y înzestrat cu Γ -topologia, la $\varphi(Y)$ înzestrat cu topologia indusă de topologia produs din \mathbb{R}^{Γ} . Rezultă că dacă arătăm că $\varphi(Y)$ este închis în topologia produs, va rezulta că Y este compact în topologia slabă. Faptul că $\varphi(Y)$ este închis rezultă din egalitatea

$$\varphi(Y) = \bigcap_{f, g \in \Gamma} \{z \in I; \text{pr}_f z = \text{pr}_f z + \text{pr}_g z\} \cap$$

$$\bigcap \{z \in I; \alpha \text{pr}_f z = \text{pr}_{\alpha f} z\} \cap$$

$$z \in \Gamma, \alpha \in \mathbb{R}_+$$

$$\bigcap_{f, g \in \Gamma} \{z \in I; \text{pr}_{f \vee g} z = \text{pr}_f z \vee \text{pr}_g z \text{ și } \text{pr}_{f \wedge g} z = \text{pr}_f z \wedge \text{pr}_g z\} \cap$$

$$\bigcap_{\lambda \in \mathbb{R}} \{z \in I; \text{pr}_{\lambda 1} z = \lambda\}$$

Așadar, Y este compact în raport cu Γ -topologia.

Din Propoziția 4 rezultă că $C(Y, \leq)$ este compatibil.

Pe de altă parte, deoarece $\hat{\Gamma}$ este închis, din Teorema 2 rezultă că $\hat{\Gamma} = C(Y, \leq)$ și deci $\hat{\Gamma}$ este conlaticial închis compatibil.

Dacă $\kappa(x) = \kappa(y)$, atunci $f(x) = f(y)$ pentru orice $f \in \Gamma$ și deci $x = y$, deoarece Γ este compatibil și deci separă punctele lui X . Așadar, κ este o bijecție de la X la $\kappa(X)$.

Dacă $\{x_i\} \subset X$ este un șir generalizat și $x_i \rightarrow x$, atunci $[\kappa(x_i)](f) = f(x_i) \rightarrow f(x) = [\kappa(x)](f)$ pentru orice $f \in \Gamma$, ceea ce ne arată că șirul $\kappa(x_i) \rightarrow \kappa(x)$ în Γ -topologia lui Y , adică

Cda. 58/982 Fasc. 5

κ este continuă.

Reciproc, dacă $\kappa(x_1) \rightarrow \kappa(x)$ în Y , atunci pentru orice $f \in \Gamma$ avem $f(x_1) \rightarrow f(x)$. Rezultă că $\{x_1\}$ converge la x în τ_Γ pe X . Deoarece Γ este compatibil, $\tau = \tau_\Gamma$ și deci $x_1 \rightarrow x$ în raport cu τ . Așadar și κ^{-1} este continuă. În continuare avem

$$x \leq y \iff x \underset{\Gamma}{\leq} y \iff [\kappa(x)](h) \leq [\kappa(y)](h), (\forall) h \in \Gamma \iff \kappa(x) \leq \kappa(y)$$

Rămâne să verificăm că imaginea $\kappa(X)$ este densă în Y .

Presupunem prin absurd, că, există $\mu \in Y \setminus \kappa(X)$. Atunci există o vecinătate U a lui μ astfel încât

$U \cap \kappa(X) = \emptyset$. Cum $\hat{\Gamma}$ este compatibil pe Y , rezultă că există $\hat{f}, \hat{g} \in \hat{\Gamma}$ astfel încât $U \supset \{y; \hat{f}(y) > 0 > \hat{g}(y)\} \ni \mu$. Cum $U \cap \kappa(X) = \emptyset$, vom avea sau $\hat{f}[\kappa(x)] \leq 0$ sau $\hat{g}[\kappa(x)] \geq 0$ pentru orice $x \in X$. Rezultă că $(-f) \vee g \geq 0$ pe X .

În continuare, avem

$$f + (-f) \vee g = 0 \vee (f+g) \geq f \text{ și deci } \hat{f} \leq 0 \vee (\hat{f} + \hat{g}),$$

de unde rezultă contradicția $U = \emptyset$. Într-adevăr, dacă ar exista $\nu \in U$, atunci am avea $\hat{f}(\nu) > 0 > \hat{g}(\nu)$.

Pe de altă parte avem

$0 < \hat{f}(\nu) \leq 0 \vee [\hat{f}(\nu) + \hat{g}(\nu)] \implies \hat{g}(\nu) \geq 0$, ceea ce este absurd. Prin urmare, $\kappa(X)$ este dens în Y și cu aceasta teorema este demonstrată.

Definiția 7. Dacă (Y, κ) este o compactificare ordonată a spațiului ordonat topologic X , atunci se numește conul laticial închis asociat acestei compactificări următorul con: $\Gamma_{\kappa} = \{f \circ \kappa; f \in C(Y, \leq)\}$.

Propoziția 5. Conul laticial închis asociat unei compactificări ordonate (Y, κ) este compatibil.

Demonstrație.

Faptul că Γ_a este con laticial rezultă imediat din faptul că $C(Y, \leq)$ este con laticial. Deoarece $\kappa(X)$ este dens în Y avem $\|f \circ \kappa\| = \|f\|$ și deci Γ_a este închis în $B(X)$. Este de asemenea imediat că $\Gamma_a \subset C_b(X, \leq)$.

Cum $C(Y, \leq)$ este compatibil, rezultă că $x \leq y \Leftrightarrow \kappa(x) \leq \kappa(y)$

$$\Leftrightarrow (f \circ \kappa)(x) \leq (f \circ \kappa)(y), (\forall) f \in C(Y, \leq) \Leftrightarrow h(x) \leq h(y),$$

$$(\forall) h \in \Gamma_a \Leftrightarrow x \leq_{\Gamma_a} y.$$

Dacă U este o submulțime τ -deschisă a lui X , atunci $\kappa(U)$ este deschisă în Y și deci există $f, g \in C(Y, \leq)$ astfel încît $\kappa(U) \supset \{f > 0 > g\}$. În particular, avem $\kappa(U) \supset \{k(x); f[k(x)] > 0 > g[k(x)]\}$ și deoarece κ este injectivă avem

$$U \supset \{x; (f \circ \kappa)(x) > 0 > (g \circ \kappa)(x)\}$$

Cum $f \circ \kappa \in \Gamma_a$ și $g \circ \kappa \in \Gamma_a$, rezultă că U este τ_{Γ_a} -deschisă. Așadar, avem și $\tau = \tau_{\Gamma_a}$, adică Γ_a este compatibil.

Observația 5. Fie X un spațiu topologic ordonat și Γ un con laticial închis compatibil pe X . Așa cum am văzut în Teorema 4, în acest caz X admite o compactificare ordonată (Y, κ) . Din demonstrația Teoremei 4 rezultă că $C(Y, \leq) = \hat{\Gamma} = \{\hat{f}; f \in \Gamma\}$

Prin urmare canalul laticial asociat va fi

$$\Gamma_a = \{\hat{f} \circ \kappa; \hat{f} \in \hat{\Gamma}\} = \{f; f \in \Gamma\} = \Gamma$$

Observația 6. Un spațiu topologic ordonat admite o compactificare ordonată dacă și numai dacă este complet regulat.

Intr-adevăr, dacă X este complet regulat, atunci

$C_b(X, \leq)$ este compatibil și în virtutea Teoremei 4 va admite o compactificare ordonată. Reciproc, dacă (Y, κ) este o compactificare ordonată a lui X , atunci Γ_a este compatibil și deci cu atât mai mult $C_b(X, \leq)$ va fi compatibil, adică X este complet regulat.

Pe mulțimea compactificărilor ordonate ale unui spațiu topologic ordonat X se introduce următoarea relație de preordine

$(Y_1, \kappa_1) \leq (Y_2, \kappa_2)$ dacă există $\varphi: Y_2 \rightarrow Y_1$ cu proprietățile:

a) φ este continuă,

b) $\varphi \circ \kappa_2 = \kappa_1$,

Observația 7. Dacă (Y_i, κ_i) sînt compactificări ordonate ale spațiului topologic ordonat X , unde $i=1,2$ și Γ_{1a} sînt conurile laticiale asociate, atunci $(Y_1, \kappa_1) \leq (Y_2, \kappa_2)$ dacă și numai dacă $\Gamma_{1a} \leq \Gamma_{2a}$.

Definiția 8. O compactificare ordonată (Y, κ) a lui X se numește compactificare Nachbin, dacă ordinea sa este cea mai mică ordine pe Y pentru care $\kappa: X \rightarrow Y$ este izomorfism în ordine.

Teorema 5. Fie (Y, κ) o compactificare ordonată a spațiului topologic ordonat X și fie Γ_a conul laticial asociat. Dacă notăm cu $\Delta = \{f \in C(Y); f \circ \kappa \in C_b(X, \leq)\}$, atunci:

1) " \leq_{Δ} " este cea mai mică ordine pe Y în raport cu care κ este izomorfism în ordine,

2) $\{f \circ \kappa; f \in C(Y)\} = \overline{\Gamma_a} - \Gamma_a$

3) (Y, κ) este compactificare Nachbin dacă și numai dacă

$$\Gamma_a = \overline{\Gamma_a} - \Gamma_a \cap C_b(X, \leq)$$

Demonstrație.

1) Evident " \leq_{Δ} " este o preordine pe Y . Deoarece $C(Y, \leq) \subset \Delta$, rezultă că Δ separă punctele lui Y și deci " \leq_{Δ} " este chiar ordine pe Y . Este de asemenea imediat faptul că $x \leq y$ dacă și numai dacă $\kappa(x) \leq_{\Delta} \kappa(y)$.

Fie " \leq_1 " o altă ordine pe Y astfel încît $\kappa: (X, \leq) \rightarrow (Y, \leq_1)$ este izomorfism în ordine și fie $f \in C(Y, \leq_1)$. Dacă $x, y \in X$ și $x \leq y$,

atunci $\kappa(x) \leq_1 \kappa(y) \implies (f \circ \kappa)(x) \leq (f \circ \kappa)(y) \implies f \circ \kappa \in C_b(X, \leq) \implies f \in \Delta$

Prin urmare avem $C(Y, \leq_1) \subset \Delta$, de unde rezultă acum că
dacă $u \leq v \implies u \leq_1 v$.

2) Să observăm că dacă $M = \Gamma_a - \Gamma_a$, atunci M este o latică vectorială în $C_b(X)$.

Intr-adevăr, dacă $f = f_1 - f_2$ și $g = g_1 - g_2$, atunci

$$f \vee g = (f_1 + g_2) \vee (g_1 + f_2) - (f_2 + g_2) \in \Gamma_a - \Gamma_a \in M \text{ și}$$

$$f \wedge g = - [(f_1 + g_2) \wedge (g_1 + f_2)] \in \Gamma_a - \Gamma_a = M.$$

Dacă notăm cu $L = \{ f \in C(Y); f \circ \kappa \in \overline{M} \}$, atunci L este o sublatică vectorială a lui $C(Y)$, care conține funcțiile constante și separă punctele lui Y , deoarece $C(Y, \leq) \subset L$.

Mai mult, deoarece $\kappa(X)$ este dens în Y , pentru orice $f, g \in L$ avem

$$\|f - g\| = \sup \{ |(f - g)(y)|; y \in Y \} = \sup \{ |(f - g) \circ \kappa(x)|; x \in X \}$$

$= \|f \circ \kappa - g \circ \kappa\|$, ceea ce ne arată că L este și închisă.

Din teorema Stone-Weierstrass rezultă că $L = C(Y)$ sau
 $\{f \circ \kappa; f \in C(Y)\} = \{f \circ \kappa; f \in L\} = \overline{M} = \overline{\Gamma_a - \Gamma_a}$

3) Dacă (Y, κ) este o compactificare Nachbin a lui X , atunci ordinea de pe Y coincide cu ordinea \leq_Δ , așa cum rezultă din afirmația 1) din această teoremă.

Dacă $f \in C(Y, \leq)$ și $u \leq_\Delta v$, atunci $u \leq v$ și deci $f(u) \leq f(v)$.

Din teorema 2 rezultă atunci că $f \in \Delta$. Prin urmare $\{f \in C(Y), f \circ \kappa \in C_b(X, \leq)\} = C(Y, \leq)$ și deci

$$\Gamma_a = \{f \circ \kappa; f \in C(Y, \leq)\} = \{f \circ \kappa; f \in C(Y)\} \cap C_b(X, \leq) = \overline{\Gamma_a - \Gamma_a} \cap C_b(X, \leq)$$

Reciproc, să presupunem că $\Gamma_a = \overline{\Gamma_a - \Gamma_a} \cap C_b(X, \leq)$. Atunci dacă $f \in C(Y)$ este astfel încît $f \circ \kappa \in C_b(X, \leq)$, există $g \in C(Y, \leq)$ astfel încît $f \circ \kappa = g \circ \kappa$. Cum $\kappa(X)$ este dens în Y , rezultă că $f = g$.

Rezultă că $\Delta \subset C(Y, \leq)$. Cum incluziunea inversă este întotdeauna adevărată, înseamnă că $\Delta = C(Y, \leq)$ și deci " \leq " coincide cu ordinea lui Y .

Observația 8. Un spațiu topologic ordonat admite o compactificare Nachbin dacă și numai dacă este complet regulat.

Afirmația rezultă din Observația 6 și din Teorema 5, punctul 1).

Propoziția 6. Dacă X este spațiu topologic ordonat complet regulat și (Y, κ) este o compactificare ordonată a sa, atunci (Y, κ) este compactificare Nachbin dacă și numai dacă oricare ar fi $f \in C_b(X, \leq)$, există $\hat{f} \in C(Y, \leq)$ astfel încît $\hat{f} \upharpoonright X = f$.

Demonstrație.

Necesitatea. Fie $f \in C_b(X, \leq)$ și $g: \kappa(X) \rightarrow \mathbb{R}$ definită prin $g[\kappa(x)] = f(x)$, (\forall) $x \in X$. Cum $\kappa(X)$ este dens în Y , g se prelungește în mod unic la o funcție continuă $\hat{f} \in C(Y)$. Conform Teoremei 5, dacă (Y, κ) este compactificare Nachbin, atunci $\Gamma_a = \overline{\Gamma_a} - \Gamma_a \cap C_b(X, \leq)$ și deci $\hat{f} \circ \kappa \in \Gamma_a$, de unde rezultă că $\hat{f} \in C(Y, \leq)$.

Suficiența. Dacă $g \in \overline{\Gamma_a} - \Gamma_a \cap C_b(X, \leq)$, atunci există $\hat{f} \in C(Y, \leq)$ astfel încît $g = \hat{f} \circ \kappa$. Rezultă că $g \in \Gamma_a$ și deci că (Y, κ) este compactificare Nachbin a lui X , conform Teoremei 5.

Definiția 9. Două compactificări Nachbin ale lui X se numesc echivalente dacă:

$$(Y_1, \kappa_1) \leq (Y_2, \kappa_2) \text{ și } (Y_2, \kappa_2) \leq (Y_1, \kappa_1)$$

Teorema 6. Dacă X este un spațiu topologic ordonat complet regulat, atunci există o cea mai mare compactificare Nachbin a sa, unică în afara unei echivalențe. Această compactificare se notează cu $(\beta_c X, \kappa_p)$.

Demonstrație.

Deoarece X este complet regulat, rezultă că $C_b(X, \leq)$ este compatibil. Notăm cu $(\beta_c X, \kappa_p)$ compactificarea ordonată corespunzătoare conului $C_b(X, \leq)$. Conul laticial închis asociat va fi

chiar $C_b(X, \leq)$. Cum orice alt con laticial închis compatibil pe X este inclus în $C_b(X, \leq)$, din Observația 7 rezultă că $(Y, \kappa) \leq (\beta_c X, \kappa_\beta)$ pentru orice compactificare ordonată (Y, κ) a lui X .

Dacă $\Delta = \{f \in C(\beta_c X); f \circ \kappa_\beta \in C_b(X, \leq)\}$ și înzestram spațiul $\beta_c X$ cu ordinea " \leq_Δ ", atunci $(\beta_c X, \kappa_\beta)$ va fi o compactificare Nachbin maximală.

Observația 9. Din propoziția 6 rezultă că pentru orice $f \in C_b(X, \leq)$ există $\hat{f} \in C(\beta_c X, \leq)$ astfel încît $\hat{f}|_X = f$.

Observația 10. Fie X un spațiu topologic complet regulat. Dacă considerăm pe X ordinea dată de egalitate, atunci $C_b(X, \leq) = C_b(X)$. Fie (Y, κ) o compactificare Nachbin a lui X . Deoarece pentru orice $x, y \in X$, $x=y$ dacă și numai dacă $\kappa(x) = \kappa(y)$, rezultă că ordinea pe Y este tot egalitatea. Așadar, orice compactificare Nachbin a lui X este de fapt o compactificare topologică a lui X . În particular $\beta_c X$ va coincide în acest caz cu compactificarea Stone-Čech a lui X .

BIBLIOGRAFIE

- [1] J. Blatter, G. L. Seever, Interposition and lattice cones a functions. Trans. Amer. Math. Soc. 222, 1976, 65-96.
- [2] J. Blatter, Order compactifications of totally ordered topological spaces. Memorias de Matematica U.F.R.J., Nr. 39, 1974.
- [3] J. Blatter, Hewitt's Stone-Weierstrass theorems for ordered topological spaces. Memorias de Matematica U.F.R.J., Nr. 45, 1974.
- [4] L. Nachbin, Topology and order. Van Nostrand Mathematical Studies Nb. 4, D. Van Nostrand, Princeton, 1965.

SPATII SIMETRICE p-NORMATE CU $0 < p \leq 1$

Nicolas POPA

În această lucrare se introduce conceptul de spațiu simetric p-normat, unde $0 < p \leq 1$, care generalizează noțiunea de spațiu simetric normat. (A se vedea de exemplu [4].)

Pentru spațiile simetrice p-normate, cu $0 < p \leq 1$, se extind apoi (fără a se da demonstrații) unele rezultate ale lui I.C. Gehberg și M. G. Krein [4], J. Arazy [1], [2], arătându-se printre altele că dacă indicii Boyd p_E și q_E ai unui spațiu simetric p-normat de șiruri E nu sînt triviali atunci proiecția triunghiulară T definită prin $(Tx)(i, j) = \begin{cases} x(i, j) & \text{dacă } i \leq j \\ 0 & \text{altfel} \end{cases}$ este continuă pe spațiul simetric p-normat corespunzător C_E și reciproc. Dacă T este continuă pe C_E atunci indicii Boyd nu sînt triviali. În particular $C_{q,p}$ cu $q > 1$, $0 < p < 1$, este un spațiu simetric p-normat pentru care T este continuă, pe cînd T nu este continuă pe C_p , cu $0 < p < 1$.

Un alt rezultat este că spațiile C_p , $0 < p < 1$, sînt primare.

1 - Teoria generală a spațiilor simetrice p-normate,
 $0 < p \leq 1$.

Vom folosi în continuare terminologia din [4] și din [1].

Pentru a introduce noțiunea de spațiu simetric p-normat cu $0 < p \leq 1$, avem nevoie de o altă noțiune și anume de cea de p-norma simetrică.

Definiția 1.1 O funcție pozitivă $|X|_p$ definită pe un ideal bilateral $C \subset B(\mathcal{L}_2)$ ($B(\mathcal{L}_2)$ este spațiul tuturor operatorilor

linieri și continui pe ℓ_2) se numește p-normă simetrică dacă are următoarele proprietăți:

- 1) $|X|_p = 0$ dacă și numai dacă $X = 0$.
- 2) $|\lambda X|_p = |\lambda| \cdot |X|_p$ pentru $X \in C$, $\lambda \in C$.

3) (Proprietatea de p-convexitate) Pentru orice două șiruri $(z_{1j})_{j=1}^{\infty}$, $(z_{2j})_{j=1}^{\infty}$ de numere reale și pentru orice sistem ortonormat de vectori din ℓ_2 $(\varphi_j)_{j=1}^{\infty}$ are loc inegalitatea

$$\left| \sum_{j=1}^{\infty} (z_{1j}^p + z_{2j}^p)^{1/p} (\cdot, \varphi_j) \varphi_j \right|_A \leq \left(\left| \sum_{j=1}^{\infty} z_{1j} (\cdot, \varphi_j) \varphi_j \right|_A^p + \left| \sum_{j=1}^{\infty} z_{2j} (\cdot, \varphi_j) \varphi_j \right|_A^p \right)^{1/p}$$

(Aici $z_{1j}^p = |z_{1j}|^p \operatorname{sign} z_{1j}$)

- 4) $|AXB|_p \leq \|A\| \cdot |X|_p \cdot \|B\|$, pentru $A, B \in B(\ell_2)$, $X \in C$.
- 5) Pentru un X unidimensional avem

$$|X|_p = \|X\| \equiv s_1(X).$$

Dacă vom înlocui pe 4) prin relația

4') $|UX|_p = |XU|_p = |X|_p$ pentru orice $X \in C$ și orice operator unitar U , atunci $|X|_p$ se numește o p-normă unitară.

Remarca 1.2 Se va arăta mai departe că denumirea de p-normă dată funcției $|X|_p$ este justificată în sensul că vom arăta că ea îndeplinește inegalitatea generalizată a triunghiului

$$|X+Y|_p^p \leq |X|_p^p + |Y|_p^p \quad \text{pentru orice } X, Y \in C.$$

Vom arăta de asemenea mai târziu că pe spațiile simetrice p-normate separabile (care vor fi numite spații p-unitare de matrici) noțiunile de p-normă unitară și de p-normă simetrică coincid.

Decomdată putem remarcă următorul rezultat evident. (A se vedea [4] p. 68 .)

Lema 1.3 Orice p-normă simetrică este o p-normă invariantă.

De asemenea se demonstrează standard următoarea propoziție.

(A se vedea [4] p. 65-69 .)

Propoziția 1.4 e) Fie $|X|_p$ o p-normă simetrică pe C .

Atunci

$$|X|_s = |X^*|_s = |(XX^*)^{1/2}|_s = |(X^*X)^{1/2}|_s \text{ pentru orice } X \in C.$$

b) Dacă avem inegalitățile

$$s_j(Y) \leq c \cdot s_j(X) \quad , \quad j=1,2,3,\dots$$

unde $X \in C$, Y este un operator compact, iar $c > 0$ este o constantă, atunci $Y \in C$ și, în plus,

$$|Y|_s \leq c|X|_s.$$

Din propoziția 1.4 rezultă că o p -normă simetrică $|X|_s$ depinde numai de numerele singulare ale unui operator X , $s_j(X)$, adică din $s_j(X_1) = s_j(X_2)$, $j=1,2,3,\dots$ rezultă că $|X_1|_s = |X_2|_s$.

Dacă $C = \mathcal{F}$, idealul tuturor operatorilor de rang finit, atunci punem

$$|X|_s = \Phi(s_1(X), s_2(X), \dots)$$

obținem o funcție Φ definită pe mulțimea șirurilor descrescătoare de numere pozitive care au cel mult un număr finit de termeni nenuli.

Studiul acestei funcții este util pentru a arăta că $|X|_s$ verifică inegalitatea generalizată a triunghiului.

Fie c_0 spațiul șirurilor de numere reale care converg la 0 și \hat{c} subspațiul lui c_0 format din șirurile care au numai un număr finit de termeni nenuli.

Definiția 1.5 O funcție reală $\Phi(\zeta) = \Phi(\zeta_1, \zeta_2, \dots)$ definită pe \hat{c} se numește funcție p -normată dacă are proprietățile următoare:

- I $\Phi(\zeta) > 0$ dacă $\zeta \neq 0$, $\zeta \in \hat{c}$
- II $\Phi(\alpha \zeta) = |\alpha| \Phi(\zeta)$ pentru $\alpha \in \mathbb{R}$ și $\zeta \in \hat{c}$
- III $\Phi((\zeta^p + \eta^p)^{1/p}) \leq (\Phi(\zeta)^p + \Phi(\eta)^p)^{1/p}$ pentru $\zeta, \eta \in \hat{c}$.

Această proprietate poartă numele de p -convexitatea funcției Φ . (Aici ζ^p , pentru ζ real, înseamnă numărul $|\zeta|^p \text{ sign } \zeta$.)

- IV $\Phi(1, 0, 0, \dots) = 1$.

O funcție p -normată $\Phi(\zeta)$ se numește funcție simetrică p -normată, prescurtat funcție s.p.n., dacă

$\forall \Phi(z_1, z_2, \dots, z_n, 0, 0, \dots) = \Phi(|z_{\pi(1)}|, |z_{\pi(2)}|, \dots, |z_{\pi(n)}|, 0, 0, \dots)$.
unde $z = (z_i)_{i=1}^{\infty} \in \hat{c}$, iar π este o permutare a mulțimii $\{1, 2, \dots, n\}$.

Vom nota $\Psi(z_1, z_2, \dots) = \Phi(z_1^{1/p}, z_2^{1/p}, \dots)^p$ pentru $z = (z_i)_{i=1}^{\infty} \in \hat{c}$.

Atunci Ψ verifică proprietățile I - V în care înlocuim proprietatea III prin inegalitatea

$$\Psi(z+h) \leq \Psi(z) + \Psi(h) \quad \text{pentru } z, h \in \hat{c}.$$

Prin urmare Ψ este o funcție simetrică normantă în sensul lui [4] și deci următoarea propoziție este o consecință imediată a considerațiilor făcute în [4] p.71-74.

Propoziția 1.6 a) Dacă $|z_j| \leq |h_j| \quad j=1, 2, \dots$ are loc pentru vectorii $z = (z_j)_{j=1}^{\infty}, h = (h_j)_{j=1}^{\infty} \in \hat{c}$, atunci

$$\Phi(z) \leq \Phi(h)$$

b) (Generalizează o leamnă a lui Ky Fan.) Presupunem că $z = (z_j)_{j=1}^{\infty}$

$$h = (h_j)_{j=1}^{\infty} \in \hat{c}. \text{ Dacă } z_1 \geq z_2 \geq \dots \geq 0, \quad h_1 \geq h_2 \geq \dots \geq 0 \text{ și}$$

$$\sum_{j=1}^k z_j^p \leq \sum_{j=1}^k h_j^p \quad k=1, 2, \dots$$

atunci pentru orice funcția simetrică p-normantă $\Phi(z)$ avem:

$$\Phi(z) \leq \Phi(h).$$

Citeodată se dovedește util să definim o funcție simetrică p-normantă numai pe conul \hat{k} format din șirurile descrescătoare și pozitive din \hat{c} .

Pentru $z \in \hat{c}$ vom nota cu z^* șirul z rearanjat descrescător.

Evident $z^* = (|z_{\pi(j)}|)_{j=1}^{\infty}$, unde π este o permutare a numerelor naturale.

Atunci din V rezultă că $\Phi(z) = \Phi(z^*)$ și deci Φ poate fi dedusă cunoscându-i numai valorile pe \hat{k} .

Lema următoare, care se obține din lema 3.2 -p.75 [4] prin același procedeu ca propoziția 1.6, ne arată că Φ poate fi determinată de o funcție definită numai pe \hat{k} cu proprietăți în care intră numai elementele lui \hat{k} .

Lema 1.7 Fie $\Phi(z)$ o funcție definită pe \hat{k} . Pentru ca egalitatea

$$\Phi(z) = \Phi(z)^* \quad , \quad z \in \hat{c}$$

să definim o funcție simetrică p-normantă este necesar și suficient ca să fie îndeplinite condițiile:

- I' $\Phi(z) > 0$ pentru $z \in \hat{k}, z \neq 0$.
- II' $\Phi(\alpha z) = \alpha \Phi(z)$ pentru $\alpha \geq 0$ și $z \in \hat{k}$
- III' $\Phi((z^p + h^p)^{1/p}) \leq (\Phi(z)^p + \Phi(h)^p)^{1/p}$ $z, h \in \hat{k}$
- IV' $\Phi(1, 0, 0, \dots) = 1$
- V' Dacă $z = (z_j^p)_j, h = (h_j^p)_j \in \hat{k}$ și

$$\sum_{j=1}^n z_j^p \leq \sum_{j=1}^n h_j^p \quad n=1, 2, \dots$$

atunci

$$\Phi(z) \leq \Phi(h).$$

Exemple de funcții simetrice p-normante sînt

$$\Phi_\infty(z) = \max_{n \in \mathbb{N}} |z_n| \quad \text{și} \quad \Phi_p(z) = \left(\sum_{j=1}^{\infty} |z_j|^p \right)^{1/p} \quad \text{pentru } z \in \hat{e}, \text{ iar din}$$

propoziția 1.6 a) este ușor de remarcat că pentru orice funcție simetrică p-normantă Φ avem

$$\Phi_\infty(z) \leq \Phi(z) \leq \Phi_p(z) \quad \text{cu } z \in \hat{e}.$$

Deci Φ_∞ este minimală și Φ_p este maximală printre funcțiile simetrice p-normante.

În plus să remarcăm că din proprietatea III și din propoziția 1.6 a) rezultă că

$$\Phi(z+h)^p \leq \Phi(z)^p + \Phi(h)^p \quad \text{pentru } z, h \in \hat{e}.$$

Prin urmare avem inegalitatea

$$|\Phi(z)^p - \Phi(h)^p| \leq \Phi(z-h)^p \leq \sum_{j=1}^{\infty} |z_j - h_j|^p \quad z, h \in \hat{e},$$

ceea ce implică în particular că orice funcție s.p.n. $\Phi(z)$ este continuuă.

Doi funcții s.p.n. $\Phi(z)$ și $\Psi(z)$ sînt echivalente dacă

$$\sup_{z \in \hat{e}} \frac{\Phi(z)}{\Psi(z)} < \infty \quad \text{și} \quad \sup_{z \in \hat{e}} \frac{\Psi(z)}{\Phi(z)} < \infty.$$

Este ușor de remarcat că: O funcție s.p.n. $\Phi(z)$ este echivalentă cu funcția minimală dacă și numai dacă

$$\sup_n \Phi(\underbrace{1, 1, \dots, 1}_n, 0, 0, \dots) < \infty$$

și $\Phi(\hat{t})$ este echivalentă cu funcția maximală dacă și numai dacă

$$\sup_n \frac{n^{1/p}}{\Phi(1, 1, \dots, 1, 0, 0, \dots)} < \infty.$$

Teorema următoare ne va arăta corespondența ce există între funcțiile s.p.n. pe \hat{k} și p -normele invariante pe \mathcal{F} .

Teorema 1.8 Fie $|\Lambda|_p$ o p -normă invariantă pe \mathcal{F} . Atunci egalitatea

$$\Phi(s(\Lambda)) = |\Lambda|_p \text{ unde } \Lambda \in \mathcal{F} \text{ și } s(\Lambda) = (s_j(\Lambda))_{j=1}^{\infty}$$

definește o funcție s.p.n. $\Phi(\hat{z})$. Invers dacă $\Phi(\hat{z})$ este o funcție s.p.n., atunci egalitatea

$$|\Lambda|_{\Phi} = \Phi(s(\Lambda)) \text{ pentru } \Lambda \in \mathcal{F}$$

definește o p -normă invariantă pe \mathcal{F} .

Demonstrație Dacă $|\Lambda|_p$ este o p -normă invariantă, atunci egalitatea $s_j(\Lambda) = s_j(B)$, $j=1, 2, \dots$ implică egalitatea $|\Lambda|_p = |B|_p$, ceea ce rezultă observând că $\Lambda = W^{-1}EZ$, W și Z fiind operatori unitari definiți de relațiile $WU\varphi_j = V\psi_j$, $Z\varphi_j = \psi_j$, $j=1, 2, \dots$.

(Aici U și V sînt operatorii parțial izometriei dați de descompunerea polară a lui A și B , iar φ_j și ψ_j sînt sisteme ortonormale de vectori proprii ai lui A și B .)

Atunci putem scrie $\Phi(\hat{z}) = |\sum_{j=1}^{\infty} z_j^* \psi_j \varphi_j|_p$ unde $(\varphi_j)_j$ este un sistem ortonormat fixat și $(z_j)_{j=1}^{\infty}$ un șir din \hat{e} .

Să verificăm proprietățile I - V pentru Φ . Sigură dintre ele care este mai dificil de verificat este proprietatea III.

Fie $z, h \in \hat{e}$. Atunci

$$\begin{aligned} \Phi(\hat{z})^p + \Phi(\hat{h})^p &= |\sum_{j=1}^{\infty} z_j^* \psi_j \varphi_j|_p^p + |\sum_{j=1}^{\infty} h_j^* \psi_j \varphi_j|_p^p = \\ &= (\text{din cauza că } |\Lambda|_p \text{ este invariantă}) = |\sum_{j=1}^{\infty} (z_j + h_j) \psi_j \varphi_j|_p^p + \\ &+ |\sum_{j=1}^{\infty} h_j^* \psi_j \varphi_j|_p^p \geq (\text{din proprietatea 3}) \geq \\ &\geq |\sum_{j=1}^{\infty} (z_j^p + h_j^p)^{1/p} \psi_j \varphi_j|_p^p = \Phi(\hat{z}^p + \hat{h}^p)^{1/p}. \end{aligned}$$

Deci Φ este o funcție s.p.n. definită pe \hat{e} .

Reciproc fie Φ o funcție s.p.n. definită pe \hat{e} și să punem

$$|A|_{\mathbb{F}} = \bar{\Phi}(s(A))$$

pentru $A \in \mathbb{F}$.

Să arătăm că $|A|_{\mathbb{F}}$ este o p -normă invariantă. Proprietățile 1) și 2) sînt imediate. Să verificăm 3). Fie $(z_{1j}^p)_j, (z_{2j}^p)_j$ două siruri de numere reale și (φ_j) un sistem ortonormat.

Atunci

$$\begin{aligned} & \left| \sum_j (z_{1j}^p + z_{2j}^p)^{1/p} (\cdot, \varphi_j) \varphi_j \right|_{\mathbb{F}}^p = \bar{\Phi}((z_{1j}^p + z_{2j}^p)^{1/p})^p \leq \quad (\text{din proprietatea III}) \\ & \leq \bar{\Phi}(z_{1j}^p) + \bar{\Phi}(z_{2j}^p) = \left| \sum_j z_{1j} (\cdot, \varphi_j) \varphi_j \right|_{\mathbb{F}}^p + \left| \sum_j z_{2j} (\cdot, \varphi_j) \varphi_j \right|_{\mathbb{F}}^p. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Deci } U \text{ este un operator izometric, atunci } |UA|_{\mathbb{F}} = \bar{\Phi}(s(UA)) = \\ & = \bar{\Phi}(s(A)) = |A|_{\mathbb{F}} \text{ și analog } |AU|_{\mathbb{F}} = |A|_{\mathbb{F}}. \end{aligned}$$

Deci proprietatea 4) este îndeplinită.

În sfîrșit, pentru un operator unidimensional A , avem $s_1(A) = |A|$ și $s_j(A) = 0$ pentru $j = 2, 3, \dots$. Deci $|A|_{\mathbb{F}} = \bar{\Phi}(s(A)) = \bar{\Phi}(|A|, 0, 0, \dots) =$
 $=$ (din IV și II) $= |A| \equiv s_1(A)$.

Prin urmare teorema este demonstrată. ■

Corolarul 1.9 Orice p -normă invariantă pe idealul \mathbb{F} este o p -normă simetrică.

Demonstrație Fie $|A|_{\mathbb{F}}$ o p -normă invariantă pe \mathbb{F} și $B, C \in B(\ell_2)$. Deoarece $s_j(BAC) \leq |B| \cdot |C| \cdot s_j(A)$ $j = 1, 2, 3, \dots$, rezultă din poziția 1.6 a) că

$$|BAC|_{\mathbb{F}} = \bar{\Phi}(s(BAC)) \leq \bar{\Phi}(|B| \cdot |C| \cdot s(A)) = |B| \cdot |C| \cdot \bar{\Phi}(s(A)) = |B| \cdot |C| \cdot |A|_{\mathbb{F}}.$$

Puten acum justifica denumirea de p -normă dată anterior.

Corolarul 1.10 Orice p -normă $|A|_{\mathbb{F}}$ pe \mathbb{F} verifică inegalitatea generalizată a triunghiului

$$|A+B|_{\mathbb{F}}^p \leq |A|_{\mathbb{F}}^p + |B|_{\mathbb{F}}^p, \quad A, B \in \mathbb{F}$$

și este, prin urmare, o adevărată p -normă.

Demonstrație Conform teoremei 2.2 - [3] rezultă că

$$\sum_j s_j^p(A+B) \leq \sum_j s_j^p(A) + \sum_j s_j^p(B), \text{ pentru } A, B \in \mathbb{F}.$$

Prin urmare din proprietatea V' - lema 1.7 rezultă că

$$|A+B|_{\mathbb{F}}^p = \bar{\Phi}(s(A+B))^p \leq \bar{\Phi}((s^p(A) + s^p(B))^{1/p})^p \leq (\text{conform III}) -$$

- lema 1.7) $\leq \Phi(s(A))^p + \Phi(s(B))^p = |A|_{\Phi}^p + |B|_{\Phi}^p$.

Să remarcăm acum că orice p -normă simetrică definită pe \mathcal{F} se află mereu situată între două p -norme speciale. Mai precis are loc următoarea propoziție.

Propoziția 1.11 Pentru orice p -normă simetrică definită pe un ideal C , avem

$$s_1(X) \leq |X|_s,$$

iar dacă $\dim X < \infty$ atunci

$$|X|_s \leq \left(\sum_j s_j^p(X) \right)^{1/p}.$$

Demonstratie Fie $Y = s_1(X)(\cdot, \varphi)\varphi$, unde φ este un element fixat în ℓ_2 cu $\|\varphi\| = 1$. Din propoziția 1.4 -b) și din proprietatea 5 - definiția 1.1 rezultă că

$$s_1(X) = \|Y\| = |Y|_s \leq |X|_s.$$

Pe de altă parte, fie $X = \sum_j s_j(X)(\cdot, \varphi_j)\varphi_j$ o dezvoltare Schmidt a operatorului X . Din corolarul 1.10 și folosind ^{proprietatea} 5) a unei p -norme simetrice rezultă că

$$|X|_s^p = \left| \sum_j s_j(X)(\cdot, \varphi_j)\varphi_j \right|_s^p \leq \sum_j s_j^p(X) \left| (\cdot, \varphi_j)\varphi_j \right|_s^p = \sum_j s_j^p(X).$$

Definiția 1.12 Un ideal bilateral C în spațiul $B(\ell_2)$ pe care există o p -normă simetrică care-l transformă pe C într-un spațiu p -Banach se numește ideal simetric p -normat sau, prescurtat, ideal s.p.n.

Este ușor de arătat că două ideale s.p.n. care coincid ca mulțimi au norme topologic echivalente.

Exemple de ideale simetrice p -normate sînt C_p , unde $C_p = \{X \in B(\ell_2) ; |X|_p = \left(\sum_{j=1}^{\infty} s_j^p(X) \right)^{1/p} < \infty\}$ dacă p este finit, iar $C_{\infty} = \{X \in B(\ell_2) ; X \text{ un operator compact și } |X|_{\infty} = \|X\|\}$.

Dacă $p \geq 1$ C_p este un spațiu Banach, iar dacă $0 < p < 1$, C_p este un spațiu p -Banach.

Vom prezenta în continuare o metodă de a genera ideale simetrice

p -normate.

Fie $\{z\}$ un șir arbitrar de numere reale care converge la 0, adică $\{z\} \in c_0$. Notăm cu $\{z^{(n)}\} = (\{z_1, \dots, z_n, 0, 0, \dots\})$. Dacă Φ este o funcție s.p.n. atunci $(\Phi(\{z^{(n)}\}))_n$ este un șir crescător de numere pozitive.

Fie $c_\Phi = \{z \in c_0; \sup_n \Phi(\{z^{(n)}\}) < \infty\}$ și vom extinde pe Φ la c_Φ punind

$$\Phi(z) = \lim_n \Phi(\{z^{(n)}\}) \quad \text{pentru } z \in c_\Phi$$

c_Φ are următoarele proprietăți:

a) $\{z\}, \{h\} \in c_\Phi$ implică $\{z+h\} \in c_\Phi$.

Intr-adevăr

$$\Phi(\{(z+h)^{(n)}\})^p \leq \Phi(\{|z|^{(n)} + |h|^{(n)}\})^p \leq \Phi(\{z\})^p + \Phi(\{h\})^p < \infty, \quad n \in \mathbb{N},$$

b) Dacă $\alpha \in \mathbb{R}$ și $\{z\} \in c_\Phi$, atunci $\alpha\{z\} \in c_\Phi$.

c) Dacă $\{z\} = (\{z_j\})_j \in c_\Phi$ și $\{h\} = (\{h_j\})_j \in c_0$ verifică condiția

$$\sum_{j=1}^n h_j^{*p} \leq \sum_{j=1}^n z_j^{*p} \quad n=1, 2, \dots$$

atunci $\{h\}$ aparține de asemenea lui c_Φ .

Din c) rezultă și o altă proprietate

d) $\{z\} = (\{z_j\})_j \in c_\Phi$ implică că $\{z^*\} = (\{z_j^*\})_j \in c_\Phi$.

Este clar acum că Φ extinsă la c_Φ posedă proprietățile

I - V. Atunci c_Φ se va numi domeniul natural al funcției s.p.n. $\Phi(\{z\})$.

Definiția 1.13 Pentru o funcție s.p.n. Φ vom construi mulțimea C_Φ a operatorilor $X \in C_\infty$ pentru care $s(X) = (s_j(X))_j \in c_\Phi$

Pentru orice $X \in C_\Phi$ punem

$$\|X\|_\Phi = \Phi(s(X)).$$

Este clar că $X \in C_\Phi$ dacă și numai dacă $\sup_n |X_n|_\Phi < \infty$, unde X_n este suma primilor n termeni din dezvoltarea Schmidt a lui X , iar $\|X\|_\Phi = \lim_n |X_n|_\Phi = \Phi(s(X))$.

Următoarea teoremă, analogă teoremei 4.1 - p. 30 - [4], ne dă posibilitatea de a construi diferite ideale s.p.n.

Teorema 1.14 Fie $\Phi(\cdot)$ o funcție s.p.n. Atunci mulțimea C_Φ este un ideal s.p.n. cu p-norma simetrică

$$|A|_\Phi = |A|_{C_\Phi} = \Phi(s(A)) \quad \text{pentru } A \in C_\Phi.$$

Demonstrație Fie $A_1, A_2 \in C_\Phi$, atunci $s(A_1) + s(A_2) \in C_\Phi$ și din teorema 2.8 - [3] rezultă că

$$\sum_{j=1}^n s_j^p(A_1 + A_2) \leq \sum_{j=1}^n s_j^p(A_1) + \sum_{j=1}^n s_j^p(A_2) \quad \text{pentru } n=1,2,\dots$$

Atunci

$$\begin{aligned} \Phi(s(A_1 + A_2)^{(n)})^p &\leq (\text{din VI}') \leq \Phi((s(A_1)^p + s(A_2)^p)^{1/p})^p \leq \\ &\leq (\text{din III}') \leq \Phi(s(A_1)^{(n)})^p + \Phi(s(A_2)^{(n)})^p \leq |A_1|_\Phi^p + |A_2|_\Phi^p, \end{aligned}$$

de unde rezultă că $A_1 + A_2 \in C_\Phi$ și $|A_1 + A_2|_\Phi^p \leq |A_1|_\Phi^p + |A_2|_\Phi^p$.

Este clar că pentru $A \in C_\Phi$ și $\alpha \in \mathbb{C}$, avem $\alpha A \in C_\Phi$ și

$$|\lambda A|_\Phi = |\lambda| |A|_\Phi$$

Evident C_Φ este și un ideal bilateral. Să arătăm acum că $|A|_\Phi$ este o p-normă simetrică. Singura proprietate 3) necesită puțină atenție. Fie $\xi_1 = (\xi_{1j})_{j=1}^\infty$, $\xi_2 = (\xi_{2j})_{j=1}^\infty$ două șiruri de numere reale și $(\varphi_j)_{j=1}^\infty$ un sistem ortonormat fixat în ℓ_2 .

Atunci

$$\begin{aligned} \|\sum_j (\xi_{1j}^p + \xi_{2j}^p)^{1/p}(\cdot, \varphi_j) \varphi_j\|_\Phi^p &= \Phi((\xi_1^p + \xi_2^p)^{1/p})^p \leq (\text{din III}) \leq \Phi(\xi_1)^p + \Phi(\xi_2)^p = \\ &= \|\sum_j \xi_{1j}(\cdot, \varphi_j) \varphi_j\|_\Phi^p + \|\sum_j \xi_{2j}(\cdot, \varphi_j) \varphi_j\|_\Phi^p. \end{aligned}$$

În sfârșit vom arăta că C_Φ este complet topologic. Fie $(A_n)_n$ un șir Cauchy în C_Φ . Conform propoziției 1.11 avem

$$\|A_n - A_m\| = s_1(A_n - A_m) \leq \|A_n - A_m\|_\Phi \xrightarrow{m,n} 0$$

Deci $A_n \rightarrow A$ în spațiul $B(\ell_2)$ și $A \in C_\infty$. În plus, din corolarul 2.3 - p.30 - [4], rezultă că

$$\lim_n s_j(A_n) = s_j(A) \quad j=1,2,\dots$$

Pe de altă parte, cum Φ este continuă pe \hat{c} , avem

$$\begin{aligned} \Phi(A_1(A), A_2(A), \dots, A_n(A), 0, 0, \dots) &= \lim_k \Phi(A_1(A_k), \dots, A_n(A_k), 0, \dots) \leq \\ &\leq \Delta_{n,k} p |A_k|_\Phi, \quad \text{pentru } n=1,2,\dots \end{aligned}$$

Cda. 68/382 fasc. 6

Prin urmare $|A|_{\Phi} \leq \sup_k |A_k|_{\Phi} < \infty$ și deci $A \in C_{\Phi}$.

Să arătăm că $A_k \xrightarrow[k]{\Phi} A$ în C_{Φ} . Fie $\varepsilon > 0$ și N un număr natural astfel că pentru $m, q > N$ avem

$$|A_m - A_q|_{\Phi} < \varepsilon$$

Atunci $\Phi(s_1(A_m - A_q), \dots, s_n(A_m - A_q), 0, \dots) < \varepsilon$, $n=1, 2, \dots$,
 $m, q > N$. Deoarece $s_j(A_m - A_q) \xrightarrow[\mathbb{R}]{\Phi} s_j(A_m - A)$, pentru $j=1, 2, \dots$,
 atunci $\Phi(s_1(A_m - A), \dots, s_n(A_m - A), 0, \dots) \leq \varepsilon$ pentru $n=1, 2, \dots$
 și $m > N$. Deci $|A_m - A|_{\Phi} \leq \varepsilon$ pentru $m > N$.

Să notăm că $|A|_{\Phi}$ verifică o proprietate importantă.

Proprietatea de dominanță Dacă $A \in C_{\Phi}$ și $B \in C_{\infty}$ are proprietatea că

$$\sum_{j=1}^n s_j^p(B) \leq \sum_{j=1}^n s_j^p(A) \quad n=1, 2, \dots$$

atunci $B \in C_{\Phi}$ și $|B|_{\Phi} \leq |A|_{\Phi}$.

Este clar de asemenea că idealele s.p.n. C_{Φ_1} și C_{Φ_2} coincid ca mulțimi dacă și numai dacă funcțiile s.p.n. Φ_1 și Φ_2 sînt echivalente.

Vom mai da o aplicație utilă a proprietății de dominanță.

Teorema 1.15 Fie A un operator din C_{Φ} și $(P_j)_{j=1}^{\omega}$ ($\omega \leq \infty$) un sistem de proiectori ortogonali. Atunci operatorul

$$\hat{A} = \sum_{j=1}^{\omega} P_j A P_j$$

apartine de asemenea lui C_{Φ} și

$$|\hat{A}|_{\Phi} \leq |A|_{\Phi}.$$

Demonstrație Fie $A_j = P_j A^* P_j A P_j$. Atunci $\hat{A}^* \hat{A} = \sum_{j=1}^{\omega} P_j A^* P_j A P_j$.

Pe de altă parte, pentru φ din imaginea lui P_j avem

$$(A_j \varphi, \varphi) = (A^* P_j A \varphi, \varphi) = (P_j A \varphi, P_j A \varphi) \leq (A^* A \varphi, \varphi) = (P_j A^* A P_j \varphi, \varphi), \quad j = 1, \dots, \omega.$$

Deci $0 \leq A_j \leq P_j A^* A P_j$ și atunci, conform lemei 1.1 - p.26 - [4], avem $s_k(A_j) \leq s_k(P_j A^* A P_j)$ $k=1, 2, \dots, j=1, 2, \dots, \omega$ (*)

Atunci

$$\sum_{k=1}^{\infty} s_k^p(\hat{A}) = \sum_{k=1}^{\infty} s_k^p/2(\hat{A}^* \hat{A}) \leq (\text{conform teoremei 2.3 - [3]}) \leq$$

$$\begin{aligned} &\leq \sum_{j=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^{\infty} s_k^{p/2}(A_j) \right) \leq (\text{conform } (*)) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} s_k^{p/2}(P_j A^* A P_j) = \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} s_k^{p/2}(P_j A^* A P_j) \leq (\text{deoarece } \bigcup_{j=1}^{\infty} \{s_k(P_j A^* A P_j) ; k \in \mathbb{N}\} \subset \\ &C\{s_k(A^* A) ; k \in \mathbb{N}\}) \leq \sum_{k=1}^{\infty} s_k^{p/2}(A^* A) = \sum_{k=1}^{\infty} s_k^p(A). \end{aligned}$$

Din proprietatea de dominanță rezultă acum că $A \in C_{\Phi}$ și că

$$|\hat{A}|_{\Phi} \leq |A|_{\Phi}.$$

Corolarul 1.16 Dacă $A \in C_{\Phi}$ atunci valorile proprii $\lambda_j(A)$, $j=1, 2, \dots$ satisfac relația

$$\Phi(|\lambda_1(A)|, |\lambda_2(A)|, \dots) \leq |A|_{\Phi} \quad \text{pentru } A \in C_{\Phi}.$$

Demonstrația este aceeași cu cea a teoremei 4.3 - p. 93 - [4] și o omitem.

Vom prezenta acum o extensie a teoremei 5.1 - p. 95 - [4] care ne va fi de folos în găsirea dualului unui ideal s.p.n.

Mai întâi vom demonstra o leamnă ce constituie analogul lemei 5.1 - p. 93 - [4].

Lema 1.17 Fie un operator linear și continuu A care este limita slabă a șirului de operatori $(A_n)_{n=1}^{\infty}$ din C_{∞} .

Dacă

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \sup_m s_j(A_m) = 0 \quad (\text{respectiv } \lim_{j \rightarrow \infty} \overline{\lim}_m s_j(A_m) = 0)$$

atunci operatorul A este compact și

$$\sum_{j=1}^n s_j^p(A) \leq \sum_{j=1}^n \sup_m s_j^p(A_m) \quad (\text{resp. } \sum_{j=1}^n s_j^p(A) \leq \sum_{j=1}^n \overline{\lim}_m s_j^p(A_m)).$$

Demonstrație Procedind la fel ca în lema 5.1 - p. 93-94 - [4]

se arată că A este un operator compact și că, în plus

$$s_j(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} s_j(A_{n_r}) \quad j=1, 2, \dots$$

$$\text{Deci } \sum_{j=1}^n s_j^p(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n s_j^p(A_{n_r}) \leq \sum_{j=1}^n \overline{\lim}_m s_j^p(A_m), \quad n=1, 2, \dots$$

Teorema 1.18 Fie $\Phi(\gamma)$ o funcție s.p.n. neechivalentă cu funcția minimă (adică $C_{\Phi} \neq C_{\infty}$). Dacă un operator $A \in B(\ell_2)$ este limita slabă a unui șir de operatori $(A_n)_n$ din C_{Φ} și dacă

$$\sup_n |A_n|_{\Phi} < \infty$$

atunci operatorul A aparține de asemenea lui C_{Φ} și

$$\|A\|_{\Phi} \leq \sup_n \|A_n\|_{\Phi}$$

Demonstrația care folosește lema 1.17, urmează linia demonstrației teoremei 5.1 - p.35 - [4] și o omitem.

Corolarul 1.19 Fie $C_{\Phi} \neq C_{\infty}$; Dacă $(P_n)_{n=1}^{\infty}$ este un șir monoton crescător de proiectori ortogonali finit dimensionali care tinde tare la identitate, adică pentru care $\lim_n \|P_n \varphi - \varphi\| = 0$ pentru $\varphi \in \ell_2$, atunci $A \in C_{\Phi}$ dacă și numai dacă

$$M = \sup_n \|P_n A P_n\|_{\Phi} < \infty.$$

Vom studia acum o clasă interesantă și importantă de ideale s.p.n. și anume idealele s.p.n. separabile, sau folosind terminologia lui J. Arzay [1] - p-spaziile unitare de matrici.

Vom considera o funcție s.p.n. Φ și idealul C_{Φ} . Vom nota cu C_{Φ}^0 închiderea spațiului \mathcal{F} în C_{Φ} . Din lema 6.1 - p.37 - [4], care rămâne valabilă și în acest caz, rezultă că C_{Φ}^0 este format din toți operatorii $A \in C_{\Phi}$ pentru care

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Phi(s_{n+1}(A), s_{n+2}(A), \dots) = 0$$

sau

$$\lim_{n/p \rightarrow \infty} \Phi(s_{n+1}(A), s_{n+2}(A), \dots, s_{n+p}(A), 0, 0, \dots) = 0.$$

Vom spune că o funcție s.p.n. este mononormalizată dacă este îndeplinită condiția

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Phi(\xi_{n+1}, \xi_{n+2}, \dots) = 0 \quad \text{pentru } \xi \in C_{\Phi}$$

sau, echivalent, dacă

$$\lim_{n/p \rightarrow \infty} \Phi(\xi_{n+1}, \xi_{n+2}, \dots, \xi_{n+p}, 0, 0, \dots) = 0 \quad \text{pentru } \xi \in C_{\Phi}$$

Dacă $C_{\Phi} = C_{\Phi}^0$ dacă și numai dacă Φ este mononormalizată.

Dacă Φ este mononormalizată și dacă $A \in C_{\Phi}$ seria Schmidt a operatorului A converge la A în norma $\|\cdot\|_{\Phi}$.

Orice funcție s.p.n. care nu este mononormalizată se va numi binormalizată.

Exemple de funcții mononormalizate sînt funcțiile minimă și maximă.

Un exemplu de funcție binormalizată este următorul:

$$\Phi(\xi) = \inf_n \frac{\left(\sum_{i=1}^n \xi_i^{**} \right)^{1/p}}{\sum_{i=1}^n w_i}, \text{ unde } 1 = w_1 + w_2 + \dots \geq 0 \text{ cu } \lim_{i \rightarrow \infty} w_i = 0 \text{ și } \sum_{i=1}^{\infty} w_i = \infty$$

Este clar că subspațiul C_{Φ}^0 este ideal s.p.n. separabil (vezi teorema 6.1 - p. 83 - [4]). Repetînd demonstrația teoremei 6.2 - p. 89 - [4] obținem

Teorema 1.20 Orice ideal s.p.n. separabil coincide cu un anumit ideal C_{Φ}^0 .

După cum am văzut în corolarul 1.10 o p -normă invariantă pe \mathcal{F} verifică inegalitatea generalizată a triunghiului. Un rol important în demonstrarea acestui fapt îl joacă proprietatea de p -convexitate a p -normei.

Din corolarul 1.10 rezultă că pentru $p=1$, pe idealul \mathcal{F} ansamblul proprietăților 1) - 5) este echivalent cu 1) - 5) în care proprietatea 3) este înlocuită cu inegalitatea obișnuită a triunghiului.

Se poate pune întrebarea dacă această echivalență se păstrează și pentru $0 < p < 1$. Răspunsul negativ la această întrebare a fost dat de matematicianul sovietic Retfeld [8]. El a arătat că $C_{p, \infty} = \{ T \in B(\ell_2) ; \|T\|_{p, \infty} = \sup_k k^{1/p} \cdot s_k(T) < \infty \}$ este un contra-exemplu la întrebarea de mai sus.

La fel ca în teorema III- 12.1. - [4] se arată că dușul lui C_p $0 < p < 1$, este $B(\ell_2)$ și că corespondența dintre o funcțională liniară și continuă F pe C_p și un element $A \in B(\ell_2)$ este dată de formula $F(X) = \text{tr}(AX)$, $X \in C_p$, iar $\|F\| = \sup_{X \in C_p} \frac{|\text{tr}(AX)|}{\|X\|_p} = \|A\|$.

Dacă notăm cu $\Phi_{(p)}(\xi)$ funcția $\Phi(\xi^{1/p})^p$ (pentru $\xi \in \mathbb{R}$), Φ fiind o funcție s.p.n., și dacă punem $\Phi_{(p)}^*(\eta) = \max_{\xi \in \mathbb{R}} \frac{\eta}{\Phi(\xi^{1/p})^p} \sum_{i=1}^n \eta_i \xi_i$, atunci $\Phi_{(p)}^*$ este o funcție s.n. și avem analogul teoremei 12.2 - [4].

Teorema 1.21 Fie $\Phi(\beta)$ o funcție s.p.n. neechivalentă cu funcția maximală. Atunci forma generală a unei funcționale liniare și continue $F(X)$ pe spațiul C_{Φ}^0 este dată de formula

$$F(X) = \text{tr}(AX)$$

unde A este un operator din $C_{\Phi(p)}^*$ și

$$|F| = \sup_{X \in C_{\Phi(p)}^0} \frac{|\text{tr} AX|}{\|X\|_{\Phi(p)}} = \|A\|_{\Phi(p)}^*$$

Demonstrație Fie $A \in C_{\Phi(p)}^*$ și X un operator din \mathcal{F} . Atunci

$AX \in \mathcal{F}$ și deci

$$\begin{aligned} |F(X)| &= |\text{tr} AX| = \left| \sum_j \lambda_j(AX) \right| \leq (\text{conform cor. 3.1 - [4]}) \leq \sum_j s_j(AX) \leq \\ &\leq (\text{cor. II 4.1 - [4]}) \leq \sum_j s_j(A) \cdot s_j(X) \leq (\text{din definiția lui } \Phi_{(p)}^*) \leq \\ &\leq \Phi_{(p)}(s(X)) \cdot \Phi_{(p)}^*(s(A)) = \|X\|_{\Phi(p)} \cdot \|A\|_{\Phi(p)}^* < \infty. \end{aligned}$$

Dar presupunând că $\|X\|_{\Phi} \leq 1$, atunci $s_j(X) \leq 1$, $j=1,2,\dots$, de unde $s_j^{1/p}(X) \leq s_j(X)$, $j=1,2,\dots$ și atunci, din propoziția 1.6 - a) rezultă că $\Phi(s_j^{1/p}(X)) \leq \Phi(s_j(X)) = \|X\|_{\Phi} \leq 1$.

Deci $\|X\|_{\Phi(p)}^p \leq 1$, și prin urmare $|F(X)| \leq \|X\|_{\Phi} \cdot \|A\|_{\Phi(p)}^*$, pentru $X \in \mathcal{F}$. Dacă $X \in C_{\Phi}^0$ și $X_n \rightarrow X$ în C_{Φ}^0 , atunci $X_n \rightarrow X$ în $C_{\Phi(p)}^0$ și deci $F(X_n) \xrightarrow{n} F(X)$ și atunci $|F(X)| \leq \|X\|_{\Phi} \cdot \|A\|_{\Phi(p)}^*$, prin urmare $F(X) = \text{tr}(AX)$ este o funcțională liniară și continuă pe C_{Φ}^0 și

$$(\#) \quad \|F\| \leq \|A\|_{\Phi(p)}^*$$

Vom arăta egalitatea în (#). Pentru aceasta se procedează ca în [4] - p. 131 înlocuind pe $\sum_j^{(n)}$ prin $\sum_j^{(n)p}$.

Mai departe demonstrația continuă ca în [4] p. 131-132.

Remarca 1.22 Dacă Φ este o funcție s.p.n., atunci conform teoremei de mai sus în C_{Φ}^0 este separat de dualul său și deci putem considera completatul Mackey al său (vezi [5]) $\widetilde{C_{\Phi}^0}$. De asemenea se poate verifica că C_{Φ} este un p -spațiu invariant la rearanjări de șiruri (vezi [7]) și prin urmare putem considera completatul său Mackey $\widetilde{C_{\Phi}}$, care este un spațiu invariant la rearanjări separabil de șiruri.

Se poate pune întrebarea dacă nu cumva $\widetilde{C}_\Phi^0 = C_\Phi^0$, unde prin C_Φ^0 am notat spațiul operatorilor compacți X cu proprietatea că $s_j(X) \in K$. De remarcat că C_Φ^0 este un ideal s.p.n. separabil.

Întrebarea de mai sus este justificată deoarece $\widetilde{C}_p = C_1$ pentru $0 < p < 1$.

Răspunsul este negativ. Într-adevăr fie $\Phi(f) = (\sum_{n=1}^{\infty} w_n z_n^{*p})^{1/p}$ unde $f \in \hat{K}$ și $(w_n)_{n=1}^{\infty}$ este un șir pozitiv descrescător cu $\sum_{n=1}^{\infty} w_n = \infty$ și $\lim_{n \rightarrow \infty} w_n = 0$. Atunci, pentru $p = 1/k$, $k \in \mathbb{N}$, $k > 1$ și pentru $v = (v_n)_{n=1}^{\infty}$ un șir cu aceeași proprietăți ca și $(w_n)_n$ și pentru care $\sum_{i=1}^n v_i \sim (\sum_{i=1}^n w_i)^k$ ($\forall n \in \mathbb{N}$), $\widetilde{C}_\Phi = C_\Psi$, unde $\Psi(f) = \sum_{n=1}^{\infty} v_n z_n^*$. (A se vedea [6].) Deci $C_{\widetilde{C}_\Phi} = C_\Psi$ cu notațiile din [4] cap. III - §15, și prin urmare $(C_\Psi)^* = C_\Psi$ (cu aceeași notații). Dar dacă $\widetilde{C}_\Phi^0 = C_{\widetilde{C}_\Phi}^0 = C_\Psi$, atunci $C_\Psi = (\widetilde{C}_\Phi^0)^* = (C_{\widetilde{C}_\Phi}^0)^* =$ (teorema 1.21) $= C_{\widetilde{C}_\Phi^0}^* = C_W$ (cu notațiile lui [4]).

Dar este evident că $C_W \neq C_\Psi$, deoarece $\sum_{j=1}^n v_j \not\sim \sum_{j=1}^n w_j$.

§2 - Teorema de interpolare și aplicații în ideale s.p.n.

În acest paragraf vom indica posibilitatea extinderii unor rezultate ale lui J. Arazy [1], [2] privind, în special, teoreme de interpolare în ideale s.p.n.

Rezultatele sînt numai enunțate, fără a se da demonstrații.

De asemenea unele noțiuni nu vor mai fi explicate ci se va indica doar locul în care pot fi găsite explicații mai detaliate.

Fie E un p -spațiu separabil de șiruri invariant la rearanjări (pe scurt un spațiu simetric p -normat). Atunci

$C_E = \{T \in C_\infty ; s(T) \in E \text{ dotat cu } p\text{-norma } \|T\| = \|s(T)\|_E\}$ este un ideal s.p.n. separabil.

Definim proiecția triunghiulară $\mathcal{T}: C_E \longrightarrow C_E$, ea fiind dată în felul următor: dacă $(e_n)_{n=1}^{\infty}$, $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ sînt două baze

ortonormate în ℓ_2 , iar $A \in C_E$ atunci A se identifică cu matricea $(a(n,m))_{n,m=1}^{\infty}$ relativă la cele două baze, unde $a(n,m) = (Ae_n, f_m)$ și

$$T(A)(i,j) = \begin{cases} a(i,j) & i \leq j \\ 0 & \text{altfel.} \end{cases}$$

O primă întrebare care se poate pune este cea privind continuitatea lui T . Răspunsul este dat de

Teorema 2.1 Fie E un spațiu simetric p -normat. Proiecția triunghiulară T este continuă pe C_E dacă și numai dacă indicii Boyd ai lui E verifică inegalitățile

$$1 < p_E \leq q_E < \infty.$$

(Pentru definiția indicilor Boyd a se vedea de exemplu [7].)

Dacă X este un p -spațiu Banach, o descompunere finit dimensională (prescurtat d.f.d.) a lui X în spații $(X_n)_{n=1}^{\infty}$ este un șir $(X_n)_{n=1}^{\infty}$ de subspații finit dimensionale ale lui X cu proprietatea că orice $x \in X$ se scrie unic sub formă $x = \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ cu $x_n \in X_n$. Când scrierea $x = \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ converge necondționat, atunci $(X_n)_{n=1}^{\infty}$ se numește d.f.d. necondționată a lui X .

Vom defini acum proiecțiile $P_n : C_E \rightarrow C_E$ date de

$$P_n(A)(i,j) = \begin{cases} a(i,j) & \max(i,j) \leq n \\ 0 & \text{altfel.} \end{cases}$$

Fie $Z_n = \text{Sp}(e_{i,j} ; \max(i,j) = n)$, unde $(e_{i,j})(k,l) = \delta_{ik} \cdot \delta_{jl}$. La fel ca în [1] se demonstrează că:

Teorema 2.2 Fie C_E un p -spațiu unitar de matrici. Următoarele afirmații sînt echivalente:

- 1) T este mărginit pe C_E .
- 2) C_E este izomorf cu un subspațiu al unui spațiu p -Banach cu o d.f.d. necondționată.
- 3) C_E are o descompunere f.d. necondționată.
- 4) $(Z_n)_{n=1}^{\infty}$ este o descompunere f.d. necondționată a lui C_E .
- 5) $1 < p_E$ și $q_E < \infty$.

Exemple de spații C_p astfel încât $1 < p_p \leq q_p < \infty$ și care sînt ne-local-convexe sînt spațiile $C_{p,q} = C_{\ell_{p,q}}$, unde $p > 1 > q > 0$

$$\text{Aici } \ell_{p,q} = \left\{ x \in c_0 : \|x\|_{p,q} = \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n(n)^q \cdot n^{(q/p)-1} \right)^{1/q} \right.$$

unde $(x^n(n))_n$ este sirul $(x(n))_n$ rearranjat descrescător.

Reamintim că un spațiu vectorial topologic X se numește primar dacă din faptul că $X = Y \oplus Z$ atunci sau $Y \approx X$, sau $Z \approx X$.

Cu aceeași demonstrație ca în [2] se poate demonstra teorema.

Teorema 2.3 Spațiile C_p , unde $0 < p < 1$, sînt primare.

BIBLIOGRAFIE

- [1] Arzay, J. - Some remarks on interpolation theorems and the boundedness of the triangular projection in unitary matrix spaces. Int. Eq. and Operator Th. vol 1, 453-495 (1978).
- [2] Arzay, J. - A remark on complemented subspaces of unitary matrix spaces. Proc. Amer. Math. Soc. 79, 601-608 (1980).
- [3] Mc Carthy, Ch.A. - C_p . Israel J. Math. 5, 249-271 (1967).
- [4] Gohberg, I.T., Krein, M.G. - Introduction to the theory of linear non-self-adjoint operators. AmS, Math. Soc. Translations, vol. 18.
- [5] Kalton, N.J. - Orlicz sequence spaces without local-convexity. Proc. Cambridge Philos. Soc. 81, 253-277 (1977).
- [6] Popa, N. - Basic sequences and subspaces in Lorentz sequence spaces without local convexity. Trans. Amer. Math. Soc. 263, 431-456 (1981).
- [7] Popa, N. - p -Spații de funcții invariante la rearranjări, $0 < p < 1$, va apare în Editura Academiei.

- [8] Retfeld, S. Yu. - The singular numbers of the sum of completely continuous operators. Topics in Math. Phys. 3, 73-81 (1969).

Socia de Matematica INCREST

Bucuresti, Bd. Pitei 220

OPERATORI LINIARI CARLEMAN

MIRCEA CÎRNU

INSTITUTUL POLITEHNIC BUCUREȘTI

Se dă noțiunea-extinsă de autor la generalitatea prezentată în comunicare- de operator liniar Carleman și câteva din cazurile sale particulare, care dovedesc sfera largă de cuprindere a acestei noțiuni.

Fie S o mulțime, E și G spații vectoriale topologice pe corpul K al numerelor reale sau complexe, F un spațiu vectorial pe K format din funcții definite pe S cu valori în G . Un operator liniar U cu domeniul de definiție $D(U)$ inclus în E și cu valori în F se numește Carleman dacă există o funcție φ numită funcție generatoare sau nucleu definită pe S cu valori în spațiul vectorial $L(E, G)$ pe K al tuturor operatorilor liniari și continui de la E la G , astfel încît

- (1) $D(U) \subseteq \{e \in E : \varphi(\cdot)e \in F\}$
- (2) $Ue(s) = \varphi(s)e, \quad e \in D(U), \quad s \in S.$

Cazuri particulare de operatori liniari Carleman:

Operatorii liniari și continui. Dacă F este spațiu vectorial topologic cu topologia mai fină decît topologia convergenței punctuale și U este un operator liniar și continuu peste tot definit, atunci U este Carleman.

Exemplu: Operatorii liniari între spații finit dimensionale. Dacă U este un operator liniar de la R^n la R^m cu matricea asociată $A = \|a_{ij}\|$, el este Carleman avînd ca nucleu matricea A . Mai precis avem $S = \{1, 2, \dots, m\}$, $G = K, E = R^n$, $F = R^m$, $\varphi(i) = \|a_{i1} \dots a_{in}\| \in R^n \cong (R^n)' = E'$, $i \in S$.

Operatorii generați de matrici infinite, care acționează între spații de siruri .

Notiunea inițială de operator Carleman și extinderile sale.

Dacă $S=(a,b) \subseteq \mathbb{R}$ înzestrat cu măsura Lebesgue, $G=K$, $E=F=L^2(a,b)$, se obține notiunea dată de Carleman în 1923. În această situație nucleul este o funcție de două variabile $\varphi(s)=K(s,.) \in L^2(a,b)$, iar operatorul are forma $Ue(s) = \int_a^b K(s,t)e(t)dt$, pentru e în $D(U)$ și s a.p.t. în (a,b) .

În cazul $S = \mathbb{R}^n$, E spațiu Banach, F spațiu Banach compus din clase de funcții măsurabile, notiunea de operator Carleman a fost dată de Jdanov, 1974, iar în cazul când S e un spațiu cu măsură σ -finită, $G=K$, $F=L^2(S)$, notiunea de operator Carleman a fost dată de J. Weidmann, 1975.

Exemplu. Operatorii Hilbert Schmidt de la un spațiu Hilbert E la $F=L^2(s)$ sînt operatori Carleman cu nucleul $\varphi(s) = \sum_n Ue_n(s) e_n$, dacă $\sum_n \|Ue_n\| < \infty$ și 0 în rest, unde $\{e_n\}$ este un sistem ortonormat din $N(U)^\perp$.

Operatorii liniari și continui între spații de distribuții, $U: \mathcal{D}' \rightarrow \mathcal{D}'$, sînt adjuncți de operatori Carleman cu nucleele familiei compozabile de distribuții în sensul definiției date de R. Cristescu, 1964.

Operatorii de convoluție. Dacă S este un semigrup, F un spațiu vectorial topologic, D un spațiu vectorial, E este compus din funcții de la S la D , invariant la translațiile la dreapta τ^s , $s \in S$, definite prin $\tau^s e(t) = e(t \cdot s)$, $t \in S$ și are translațiile continue. Un operator $u \in L(E,F)$, se numește convolutor $(E;F)$ dacă $(u * e)(.) \stackrel{def.}{=} u(\tau^s e) \in F$, Operatorul de convoluție U definit de un convolutor u prin $U(e) = u * e$ este Carleman cu nucleul $\varphi(s) = \tau^s u$, unde $(\tau^s u)e = u(\tau^s e)$.

Exemplu. Operatorul de derivare de la \mathcal{D} la \mathcal{D} este Carleman cu nucleul $\varphi(s) = \tau^s \delta'$, unde δ' este derivata distribuției Dirac.

Operatori liniari pe spații de funcții vectoriale

de

Romulus Cristescu

Rezumat

Fie X un spațiu reticulat local convex și \mathcal{P} mulțimea tuturor seminormelor solide și (τ) -continue definite pe X . Fie Y un spațiu liniar complet reticulat. Pentru orice $p \in \mathcal{P}$ vom nota cu Z_p mulțimea tuturor operatorilor liniari $U: X \rightarrow Y$ pentru care mulțimea $\{U(x); p(x) \leq 1\}$ este (o) -mărginită. Dacă $U \in Z_p$, vom pune $\|U\|_p = \sup\{|U(x)|; p(x) \leq 1\}$. Vom nota $Z = \bigcup_{p \in \mathcal{P}} Z_p$

Fie T un spațiu local compact și \mathcal{K} mulțimea tuturor părților compacte ale lui T . Pentru orice $E \in \mathcal{K}$ vom nota cu \mathcal{B}_E mulțimea tuturor părților boreliene ale lui E și $\mathcal{B} = \bigcup_{E \in \mathcal{K}} \mathcal{B}_E$. Vom nota cu $M(T, X)$ mulțimea tuturor funcțiilor $f: T \rightarrow X$ cu proprietatea: există $E \in \mathcal{K}$ și un șir generalizat $\{f_\delta\}_{\delta \in \Delta}$ de funcții \mathcal{B} -simple (care aplică T în X) așa ca $\text{spt } f_\delta \subset E$ și care să fie uniform convergent către f . Spunem că $\{f_\delta\}_{\delta \in \Delta}$ este un șir aproximativ pentru f . Mulțimea $M(T, X)$ este un spațiu reticulat local convex în raport cu ordinea punctuală și topologia dată de mulțimea seminormelor $\{p | p \in \mathcal{P}\}$ unde $\tilde{p}(f) = \sup\{p(f(t)); t \in T\}$. Pentru orice $E \in \mathcal{K}$ notăm

$$M_E(T, X) = \{f \in M(T, X); \text{spt } f \subset E\}$$

Fie acum $m: \mathcal{B} \rightarrow Z$ aditivă, cu proprietatea: $\forall E \in \mathcal{K}, \exists p \in \mathcal{P}$ astfel ca $m(\mathcal{B}_E) \subset Z_p$ iar mulțimea

$$\left\{ \sum_{i=1}^k \|m(A_i)\|_p; (A_1, \dots, A_k) \mathcal{B}\text{-partiție a lui } E \right\}$$

este (o) -mărginită. Vom nota cu $v_m(E, p)$ marginea superioară a acestei mulțimi și vom spune că m este de tip (vm) . Dacă $f \in M(T, X)$ este \mathcal{B} -simplă, definim integrala $I(f; m)$ în mod obișnuit. Dacă $f \in M(T, X)$ este oarecare iar $\{f_\delta\}_{\delta \in \Delta}$ este un șir aproximativ oarecare, punem

$I(f; m) = (\rho) - \lim_{\delta \in \Delta} I(f_\delta; m)$ (limita cu regulator existind și nedependind de șirul aproximant).

Integrala $I(\cdot; m)$ este un operator liniar pe $M(T, X)$ cu proprietatea că pentru orice $E \in \mathcal{K}$, restricția sa la $M_E(T, X)$ este un operator (po)-mărginit.

Reciproc, dacă $U: M(T, X) \rightarrow Y$ este un operator liniar pentru care restricția U_E la $M_E(T, X)$ este un operator (po)-mărginit ($\forall E \in \mathcal{K}$), atunci există o funcție aditivă $m: \mathcal{B} \rightarrow Z$, de tip (vm) astfel ca $U = I(\cdot, m)$ și $\|U_E\|_p^{\sim} = v_m(E, p)$ ori de câte ori membrul stâng (al ultimei egalități) are sens.

În particular, se poate ține seama că spațiul $C_0(T, X)$ al funcțiilor (c) continue cu suport compact (care aplică T în X) este un subspațiu liniar reticulat al spațiului $M(T, X)$. De exemplu, un operator liniar (po)-mărginit pe $C_0(T, X)$ cu valori în Y se poate prelungi pînă la un operator liniar (po)-mărginit pe $M(T, X)$.

□

Bibliografie

Romulus Cristescu, *Ordered vector spaces and linear operators*. Abacus Press, 1976.

Siruri Vitali convergente

Gh. Grigore

În [4] și [2] s-a degajat ca instrument de lucru, o teoremă de tip Lebesgue-Vitali de derivare a unor măsuri, teoremă în care am înlocuit sistemele Vitali cu șiruri generalizate Vitali.

Fie T o mulțime, \mathcal{T} o σ -algebră de părți ale lui T , m o măsură pozitivă definită pe \mathcal{T} . Vom numi partiție a lui T un sistem finit $\Delta = \{E_1, \dots, E_n\}$ de mulțimi din \mathcal{T} astfel încât $E_i \cap E_j = \emptyset$ ($i \neq j$), $\bigcup_{i=1}^n E_i = T$, $m(E_i) > 0$. Vom nota cu \mathcal{D} familia tuturor partițiilor lui T și o vom ordona după finețe. Fie $\{\Delta_\alpha\}_{\alpha \in A}$ un șir generalizat crescător de partiții și fie $\mathcal{B} = \{E \mid E \in \Delta_\alpha, \alpha \in A\}$. Vom nota cu \mathcal{B}_σ familia reuniunilor numărabile de mulțimi din \mathcal{B} .

Definiția 1 Spunem că șirul de partiții $\{\Delta_\alpha\}_{\alpha \in A}$ este total dacă

(1) $\forall E \in \mathcal{T}$ și $\varepsilon > 0$ există $\alpha \in A$ și E_α o reuniune de mulțimi din Δ_α așa ca $m(E \Delta E_\alpha) < \varepsilon$.

(2) $\forall Z \in \mathcal{T}$ cu $m(Z) = 0$ și $\varepsilon > 0$ $(\exists) B \in \mathcal{B}_\sigma$ așa ca $B \supset Z$ și $m(B) < \varepsilon$

Dacă $\Delta \in \mathcal{D}$ vom nota $\|\Delta\| = \max_{E \in \Delta} m(E)$

Definiția 2 Vom spune că șirul de partiții $\{\Delta_\alpha\}$ este un șir Vitali dacă este total, crescător și $\lim_{\alpha} \|\Delta_\alpha\| = 0$

Teorema care urmează generalizează un rezultat din [5]

Teorema 1 Dacă $\{\Delta_\alpha\}$ este un șir generalizat de partiții, crescător și cu proprietatea (1) iar măsura m nu are atomi atunci $\lim_{\alpha} \|\Delta_\alpha\| = 0$

Fie X un spațiu Banach și $L(\mathcal{T}, X)$ spațiul funcțiilor m -integrabile Bochner cu valori în X . Pentru $f \in L(\mathcal{T}, X)$ fie

$$f_\alpha = \sum_{E \in \Delta_\alpha} \frac{1}{m(E)} \left(\int_E f(t) d m \right) \chi_E \quad \text{și} \quad f_\alpha^* (E) = \int_E f d m \quad (E \in \mathcal{T})$$

Teorema 2 Dacă $f \in L(\mathcal{T}, X)$ și $\{\Delta_\alpha\}$ este un șir Vitali atunci $\lim_{\alpha} f_\alpha(t) = f(t)$ m -a.p.t. și $\lim_{\alpha} \text{var} (f_\alpha^* - f_\alpha^*) = 0$

Teorema 2 Fie μ o măsură reală pe \mathcal{T} și pentru fiecare $x_0 \in T$ fie $E_{x_0}^n \in \Delta_n, x_0 \in E_{x_0}^n$. Atunci $\lim_n \frac{\mu(E_{x_0}^n)}{m(E_{x_0}^n)}$ există a.p.t. și este egală cu densitatea părții m -absolut continuă a lui μ .

Bibliografie

- [1] Ismat Beg-Gh. Grigore Representarea unor operatori liniari (sub tipar)
- [2] Gh. Grigore Representarea unor operatori liniari (no)-mărginiți Analele Univ. din Craiova 2-1974 103-107
- [3] P. Halmos Measure Theory New York 1951
- [4] П.Е. Умаров, В. Гурьев Унитарная мера и разложение Уфф. Hayka Mochba 1964.

Universitatea din București
Facultatea de matematică

MASURI VECTORIALE PE LATICI

Stelian Găină

Institutul de Arhitectură ^București

In tot acest rezumat \mathcal{X} va însemna un grup topologic separat, complet și comutativ, în care operația va fi notată aditiv și elementul unitate cu 0, X o mulțime nevidă arbitrară, $\mathcal{P}(X)$ mulțimea tuturor părților lui X , $\mathcal{L} \subset \mathcal{P}(X)$ o latice de mulțimi, adică o mulțime de părți cu proprietățile 1) $\emptyset \in \mathcal{L}$; 2) $A, B \in \mathcal{L} \Rightarrow A \cup B, A \cap B \in \mathcal{L}$. și $\lambda: \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{X}$ o funcție modulară, adică o funcție cu proprietățile 1) $\lambda(\emptyset) = 0$; 2) $\lambda(A \cup B) + \lambda(A \cap B) = \lambda(A) + \lambda(B)$, $\forall A, B \in \mathcal{L}$.

Prin σ -măsură vom înțelege o funcție numărabil aditivă de mulțime și cu valori în \mathcal{X} . Pentru orice funcție $\varphi: \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{X}$ vom nota

$$\mathcal{N}_\varphi = \{ A \subseteq X \mid \varphi(B) = \varphi(B \cap A) + \varphi(B \setminus A), \forall B \subseteq X \}$$

In lucrarea [2], noi am generalizat noțiunile de măsură interioară și exterioară, la cazul funcțiilor cu valori în \mathcal{X} , în maniera de mai jos.

Definiția 1.1 Funcția $\varphi: \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{X}$ se numește semi-măsură interioară dacă 1) $\varphi(\emptyset) = 0$; 2) $((A_n)_n \subset \mathcal{P}(X), A_n \downarrow \emptyset) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi(A_n) = \varphi(\emptyset)$

Dacă, în această definiție, condiția 2) se înlociește cu condiția mai tare următoare:

$$2') ((A_n)_n \subset \mathcal{P}(X), A_n \downarrow A) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi(A_n) = \varphi(A).$$

atunci vom spune că φ este o măsură interioară

Definiția 1.2. Funcția $\psi: \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{X}$ se numește semi-măsură exterioară dacă 1) $\psi(\emptyset) = 0$; 2) $((A_n)_n \subset \mathcal{P}(X), A_n \uparrow X) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \psi(A_n) = \psi(X)$.

Dacă, în această definiție, condiția 2) se înlociește cu condiția mai tare următoare:

$$2') ((A_n)_n \subset \mathcal{P}(X), A_n \uparrow A) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \psi(A_n) = \psi(A).$$

atunci vom spune că ψ este o măsură exterioară.

Cda. 58/982 Fasc. 7

De asemenea , în lucrarea [2], noi am demonstrat teoremele următoare, care generalizează binecunoscuta teoremă a lui Carathéodory.

Teorema 1.3. Fie $\varphi: \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{E}$ o semi-măsură interioară, $\mathcal{A} = \mathcal{A}_{\varphi}$ și

$$\mathcal{A}_{\sigma} = \{ A \subset X \mid (\exists) (A_n)_n \subset \mathcal{A}, \text{ astfel încât } A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \}$$

Atunci avem 1) \mathcal{A} este o algebră de mulțimi și $\varphi|_{\mathcal{A}}$ este o σ -măsură. 2) $((A_n)_n \subset \mathcal{A}_{\sigma}, A_n \uparrow A) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi(A_n) = \varphi(A)$.

3) $((A_n)_n \subset \mathcal{A}_{\sigma}, A_n \downarrow) \Rightarrow (\varphi(A_n))_n$ este convergent .

4) \mathcal{A}_{σ} este o latice de mulțimi, $\mathcal{A} \subset \mathcal{A}_{\sigma}$ și $\varphi|_{\mathcal{A}_{\sigma}}$ este o funcție modulară .

5) Dacă φ este o măsură interioară, atunci \mathcal{A} este σ -algebră și $\mathcal{A}_{\sigma} = \mathcal{A}$

Observație Funcția $\varphi|_{\mathcal{A}}$ va fi numită în continuare σ -măsura generată de φ .

Teorema 1.4. Fie $\psi: \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{E}$ o semi-măsură exterioară, $\mathcal{B} = \mathcal{B}_{\psi}$ și

$$\mathcal{B}_{\sigma} = \{ B \subset X \mid (\exists) (B_n)_n \subset \mathcal{B}, \text{ astfel încât } B = \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n \}$$

Atunci avem 1) \mathcal{B} este o algebră de mulțimi și $\psi|_{\mathcal{B}}$ este o σ -măsură. 2) $((B_n)_n \subset \mathcal{B}_{\sigma}, B_n \downarrow B) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \psi(B_n) = \psi(B)$.

3) $((B_n)_n \subset \mathcal{B}_{\sigma}, B_n \uparrow) \Rightarrow ((\psi(B_n))_n$ este convergent.

4) \mathcal{B}_{σ} este o latice de mulțimi, $\mathcal{B} \subset \mathcal{B}_{\sigma}$ și $\psi|_{\mathcal{B}_{\sigma}}$ este o funcție modulară .

5) Dacă ψ este o măsură exterioară, atunci \mathcal{B} este σ -algebră și $\mathcal{B}_{\sigma} = \mathcal{B}$.

Observație Funcția $\psi|_{\mathcal{B}}$ va fi numită în continuare σ -măsură generată de ψ .

După cum se arată în [1] și [4] , orice σ -măsură $\mu: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$ unde \mathcal{C} este un clan care posedă proprietatea că pentru orice șir monoton $(E_n) \subset \mathcal{C}$, șirul $(\mu(E_n))$ este convergent, se poate prelungi la o σ -măsură pe o σ -algebră . Astfel, de aici și din proprietățile 2) și 3) din teoremele de mai sus, rezultă că deși funcțiile φ și ψ sînt numai semi-măsuri, interioară și respectiv exterioară , acest fapt nu reprezintă un impediment pentru generarea, cu ajutorul lor , a unei σ -măsuri pe o σ -algebră.

Scopul lucrării pe care o rezumăm aici și care va apare în Revue Roum. de Math. pures et appl. , este de a arăta în ce mod se pot construi, plecând de la funcția modulară λ , semi-măsuri și măsuri interioare și exterioare în sensul definițiilor 1.1. și 1.2. și de a da condiții necesare și suficiente în care σ -măsurile generate de ele prelungesc pe λ .

2^o Pentru realizarea acestui deziderat vom presupune în plus că funcția λ posedă în plus proprietățile următoare :

$$I) \left\{ \begin{array}{l} ((E_n)_n \subset \mathcal{L}, E_n \uparrow) \Rightarrow (\lambda(E_n)) \text{ sînt convergent} \\ ((E_n)_n \subset \mathcal{L}, E_n \downarrow \emptyset) \Rightarrow \lim \lambda(E_n) = 0 \end{array} \right.$$

și vom folosi următoarea leză care este binecunoscută (v. [4])

Lema 2-1. Fie $(\mathcal{X}_i)_{i \in I}$ un șir generalizat în \mathcal{X} . Dacă pentru orice șir crescător $(I_n) \subset I$, șirul (\mathcal{X}_{I_n}) este un șir Cauchy , atunci $(\mathcal{X}_i)_{i \in I}$ este un șir Cauchy generalizat.

Pentru orice mulțime $A \subset X$, vom nota $\mathcal{L}^{-A} = \{E \in \mathcal{L} \mid E \subset A\}$ și vom ordona această mulțime cu relația de incluziune. Atunci \mathcal{L}^{-A} este o mulțime dirijată și din proprietatea (I) și lema 2.1. , rezultă că $(\lambda(E))_{E \in \mathcal{L}^{-A}}$ este un șir Cauchy generalizat în \mathcal{R} și deci convergent. Notînd limita sa prin $\nu(A)$, obținem astfel o funcție $\nu: \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{R}$ cu proprietatea evidentă $\nu|_{\mathcal{L}} = \lambda$.

Teorema 2.2. Avem 1) ν este o semi-măsură interioară.

$$2) ((A_n)_n \subset \mathcal{P}(X), A_n \uparrow) \Rightarrow ((\nu(A_n)) \text{ convergent}) .$$

$$3) \text{ Dacă } A \subset X \text{ atunci } A \in \mathcal{N}_\nu \Leftrightarrow \lambda(E) = \nu(E \cap A) + \nu(E \setminus A), \forall E \in \mathcal{L} .$$

$$4) \mathcal{L} \subset \mathcal{N}_\nu \Leftrightarrow A, B \in \mathcal{L}, A \subset B \Rightarrow \nu(B-A) = \nu(B) - \nu(A) .$$

Observație Dacă $\mathcal{L} \subset \mathcal{N}_\nu$, atunci pentru orice șir monoton $(E_n)_n \subset \mathcal{L}$ cu limita $E \in \mathcal{L}$, avem $\lambda(E_n) \rightarrow \lambda(E)$ deoarece în baza teoremelor 1-3-2.2. , $\nu|_{\mathcal{N}_\nu}$ este o σ -măsură și $\nu|_{\mathcal{L}} = \lambda$. În particular rezultă că λ este numărabil aditivă pe \mathcal{L} . Afirmația inversă nu este însă adevărată, după cum arată exemplul următor

Fie R mulțimea numerelor reale, $X = (0, 1] \subset \mathbb{R}$, $\mathcal{L} = \{(a, \alpha] \mid \alpha \in (a, 1]\}$

și $\lambda : \mathcal{L} \rightarrow [0, 1]$, $\lambda((a, \alpha]) = \alpha - a$. Atunci $\phi = (0, \alpha) \in \mathcal{L}$, $\lambda(\phi) = \alpha$ și \mathcal{L} este o latică sta-

bilă în raport cu operația de intersecție numărabilă. De asemenea, este evident că λ este o funcție modulară și că pentru orice șir $(E_n)_n \subset \mathcal{L}$, $E_n \downarrow E$ avem $\lambda(E_n) \rightarrow \lambda(E)$ iar pentru orice șir $(F_n)_n \subset \mathcal{L}$, $F_n \uparrow F$ șirul $\lambda(F_n)$ este convergent; dacă $F \in \mathcal{L}$, atunci avem chiar $\lambda(F_n) \rightarrow \lambda(F)$.

Totuși, dacă $A = (a, \alpha]$, $B = (a, \beta]$ unde $0 < \alpha < \beta \leq 1$, atunci $\lambda(B) - \lambda(A) = \beta - \alpha > 0$ iar $\gamma(B \setminus A) = \lambda(\phi) = \alpha$ deci nu avem $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{N}_\gamma$.

Teorema 2.3. Dacă \mathcal{L} este stabilă în raport cu operația de intersecție numărabilă și dacă λ posedă în plus proprietatea

$$(*) \left((E_n)_n \subset \mathcal{L}, E_n \downarrow E \right) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda(E_n) = \lambda(E).$$

atunci γ este o măsură interioară.

Observație. Exemplele tipice de latici ce satisfac condiția din teorema 2.3. sînt laticăa \mathcal{K} a părților compacte ale unui spațiu topologic separat și laticăa \mathcal{F} a părților închise ale aceluiași spațiu. De asemenea remarcăm că dacă în teoremele 2.2. și 2.3., mulțimea X este un spațiu topologic separat și $\mathcal{L} = \mathcal{K} \subseteq \mathcal{N}_\gamma$, atunci $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{N}_\gamma$ după cum rezultă imediat din afirmația 3) a teoremei 2.2. Mai mult, dacă \mathcal{B}_σ este σ -algebra mulțimilor boreliene ale lui X și γ este măsură interioară, atunci $\mathcal{B}_\sigma \subseteq \mathcal{N}_\gamma$, căci \mathcal{N}_γ este σ -algebră (v. teorema 1-3).

În propoziția următoare vom da o condiție suficientă pentru ca $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{N}_\gamma$. Pentru aceasta vom introduce o noțiune nouă și vom generaliza noțiunea de volum regulat (v. [3], cap. I, § 54).

Definiția 2.4. Funcția $\alpha : \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{P}(X)$ se numește operator de regulizare pentru laticăa \mathcal{L} dacă :

- 1) $\alpha(A) \subseteq A, \forall A \in \mathcal{L}$.
- 2) $(A, B, E \in \mathcal{L}, A \subseteq \alpha(B \setminus E)) \Rightarrow \exists F \in \mathcal{L}, \text{ astfel încât } A \subseteq \alpha(F) \subseteq F \subseteq \alpha(B) \setminus E$.
- 3) $A, B \in \mathcal{L} \Rightarrow A \setminus \alpha(B) \in \mathcal{L}$.

Observație Cu notațiile din observația făcută la teorema 2.3., este evident că dacă X este un spațiu local compact și separat, iar

$\mathcal{L} = \mathcal{X}$, atunci restricția operatorului interior la \mathcal{X} este un operator de regularizare pentru \mathcal{X} . De asemenea, dacă \mathcal{X} este un spațiu normal și $\mathcal{L} = \mathcal{F}$, atunci restricția operatorului interior la \mathcal{F} este un operator de regularizare pentru \mathcal{F} .

Definiția 2.5. Funcția modulară $\lambda: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{E}$ se numește volum regulat dacă există un operator de regularizare α pentru laticea \mathcal{X} astfel încât pentru orice $A \in \mathcal{X}$ și orice vecinătate V a lui 0 în \mathcal{E} există $B \in \mathcal{X}$, așa încât $A \subseteq \alpha(B)$ și $\lambda(A) - \lambda(E) \in V$ pentru orice $E \in \mathcal{X}$, astfel încât $A \subseteq E \subseteq B$.

Propoziția 2.6. Dacă $\lambda: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{E}$ este un volum regulat cu proprietatea 1), atunci $\mathcal{X} \subseteq \mathcal{U}_\lambda$.

3) În continuare vom arăta în ce mod se pot construi, plecând de la funcția modulară λ , semi-măsuri și măsuri exterioare. Pentru aceasta vom presupune că $\mathcal{X} \in \mathcal{X}$ și că λ posedă proprietatea următoare

$$II) \begin{cases} ((E_n)_n \subset \mathcal{X}, E_n \downarrow) \Rightarrow (\lambda(E_n))_n \text{ este convergent} \\ ((E_n)_n \subset \mathcal{X}, E_n \uparrow \mathcal{X}) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda(E_n) = \lambda(\mathcal{X}). \end{cases}$$

Pentru orice $A \subseteq \mathcal{X}$ vom ordona mulțimea $\mathcal{X}^+(A) = \{E \in \mathcal{X} \mid A \subseteq E\}$ cu relația duală incluziunii. Atunci $\mathcal{X}^+(A)$ este o mulțime filtrantă și din lema 2.1. și ipoteza II rezultă că $(\lambda(E))_{E \in \mathcal{X}^+(A)}$ este un sir Cauchy generalizat în \mathcal{E} , deci convergent. Notînd limita sa prin $\mu(A)$ obținem astfel o funcție $\mu: \mathcal{P}(\mathcal{X}) \rightarrow \mathcal{E}$ cu proprietatea $\mu|_{\mathcal{X}} = \lambda$.

Teorema 3.1. Avem: 1) μ este o semi-măsură exterioară.

2) $((A_n)_n \subset \mathcal{P}(\mathcal{X}), A_n \downarrow) \Rightarrow (\mu(A_n))_n \text{ este convergent}$

3) Dacă $A \subseteq \mathcal{X}$, atunci $A \in \mathcal{U}_\mu \Leftrightarrow \lambda(\mathcal{X}) + \lambda(E) = \mu(E \cup A) + \mu(E \cup A^c) \quad \forall E \in \mathcal{X}$

4) Dacă \mathcal{X} este stabilă la reuniuni numărabile și λ posedă în plus proprietatea:

$$(*) \quad ((E_n)_n \subset \mathcal{X}, E_n \uparrow E) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda(E_n) = \lambda(E).$$

atunci μ este măsură exterioară.

Observație O latice importantă care satisface condiția din afirmația 4) a teoremei 3.1. este laticea mulțimilor deschise ale unui spațiu topologic.

In continuarea lucrării se dau condiții necesare și suficiente pentru ca funcția \hat{A} să fie prelungibilă la o funcție modulară care să îndeplinească condițiile din teorema 2.3. și din afirmația 4) a teoremei 3.1.

Bibliografie

1. Găină, S. , Prolongement des mesures à valeurs dans un groupe topologique , Bull. Math. Soc.Sci. Math.R.S.R. , 14(62), no2 (1970), pp.171-179
2. Găină, S., Dualité dans la theorie de la mesure , Rev. Roum. de Math. Pures et Appl. (va apare) .
3. Halmos, P.R. , Measure Theory, New York , 1950 .
4. Sion , M. , Outer measures with values in a topological group, Proc. London Math. Soc. , 19,3, 89-106 (1969)

O TEOREMA DE REPREZENTARE CU APLICATII IN
TERMODINAMICA

de Eufrosina Mânzatu

- R e z u m a t -

Lucrarea pornește de la ideea ca al doilea postulat al termodinamicii exprimat prin ecuația calorică de stare, care precizează dependența energiei interne a unui sistem în stare de echilibru la un moment notat t de parametrii externi și de temperatura θ a sistemului este o dependență funcțională :

$U = F[g]$, cu $g = g(\tau) = (a_i(\tau), \theta(\tau))$, $\tau \in (-\infty, t]$, $i = 1, \dots, n$ cu F funcțională continuă pe spațiul local conex notat $D(-\infty, t]$ al funcțiilor vectoriale indefinit derivabile $g: (-\infty, t] \rightarrow R^{n+1}$ înzestrat cu familia de seminorme:

$$|g|_{\lambda} = \sup_{\tau \in [t-\lambda, t]} \sqrt{\sum_1 a_i^2(\tau) + \theta^2(\tau)}, \quad \lambda > 0 \text{ real.}$$

În ipoteza că F este diferențiabilă Fréchet într-un punct fixat $g_1 \in D(-\infty, t]$, notînd cu δF diferențiala Fréchet corespunzătoare, se demonstrează :

Teorema : Există un $\lambda > 0$ și o funcție vectorială $f(\tau) = (b_i(\tau), q(\tau))$, b_i și q funcții de pătrat integrabil pe $[t-\lambda, t]$, așa încît $\delta F[g_1; h]$ admite în punctul $h = g_2 - g_1 \in D(-\infty, t]$ pentru care $g_j = (a_{j1}, \theta_j)$, $j = 1, 2$, $g_2(\tau) = g_1(\tau)$ pentru $\tau \in (-\infty, t-\lambda]$, o reprezentare integrală de forma :

$$\delta F(g_1; g_2 - g_1) = \int_{t-\lambda}^t \left\{ \sum_{i=1}^n [a_{2i}(\tau) - a_{1i}(\tau)] b_i(\tau) + [\theta_2(\tau) - \theta_1(\tau)] q'(\tau) \right\} d\tau$$

Formula lui Taylor dă, în notația $U_2 = F(g_2)$, $U_1 = F(g_1)$ și cu ipotezele suplimentare că funcțiile b_i și q' au derivată a.p.t. continuă pe $[t-\lambda, t]$ și că $a_{2i}(t) = a_{1i}(t)$, $\theta_2(t) = \theta_1(t)$:

$$U_2 - U_1 = \int_{t-\lambda}^t \left\{ \sum_{i=1}^n [a_{2i}(\tau) - a_{1i}(\tau)] [-b_i'(\tau)] + [\theta_2(\tau) - \theta_1(\tau)] [-q'(\tau)] \right\} d\tau + R_1[g_1; g_2 - g_1]$$

cu

$$\lim_{g_2 \rightarrow g_1} \frac{R_1[g_1; g_2 - g_1]}{|g_2 - g_1|_\lambda} = 0$$

Renunșând la termenul complementar R_1 , această formulă reprezintă egalitatea lui Gouy (echivalentă cu principiul II al termodinamicii pentru procese complet reversibile) deoarece variațiile $a_{2i} - a_{1i}$ ale parametrilor externi (deformările) în produs cu forțele ($-b_i'$) integrat pe perioada de timp cît au avut loc deformările se poate interpreta cu lucrul mecanic efectuat de sistem prin trecerea de la o stare la alta; valoarea diferențială $-q'(\tau) d\tau$ reprezintă entropia $ds = \frac{dq}{\theta}$ a sistemului, $\theta_2 - \theta_1$ diferența temperaturilor în cele două stări.

BIBLIOGRAFIE

1. Bruhat G., Cours de physique générale-Thermodynamique, Paris, 1938.
2. Marinescu G., Espace, vectoriels pseudotopologiques et théorie des distributions, Berlin, 1963.
3. Mânzatu E., Contribuții la studiul topologiilor admisibile..... Studii și cercetări matematice, 29/6, 1977.

O TEOREMA DE PRELUNGIRE A UNOR OPERATORI AFINI

Octav Olteanu

Institutul Politehnic București

Se dă o teoremă de prelungire a unui operator afin, cu păstrarea proprietății acestuia de a fi majorat de un operator concav și minorat de un operator convex .

Notăție Fie X un spațiu liniar real și $A_1 \subseteq X$ o submulțime convexă. Vom nota :

$$\text{lin } A_1 = \{ \alpha a_1 + \beta a_2 \mid a_1, a_2 \in A_1, \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \alpha + \beta = 1 \}$$

Teoremă Fie X un spațiu liniar , Y un spațiu liniar preordonat , $A \subseteq X$ convexă , $q: A \rightarrow Y$ un operator concav , $p: A \rightarrow Y$ un operator convex , astfel încît $p \leq q$. Fie $B \subseteq A$ o submulțime convexă și $h: B \rightarrow Y$ un operator afin astfel încît

$$p|_B \leq h \leq q|_B$$

Atunci există o submulțime convexă $A_1 \subseteq A$ astfel încît $B \subseteq A_1 \subseteq A \subseteq \text{lin } A_1$ și un operator afin $h_1: A_1 \rightarrow Y$ astfel încît

1) $h_1|_B = h$

2) $p|_{A_1} \leq h_1 \leq q|_{A_1}$

Bibliografie

- 1) Peressini, A.L. Ordered Topological Vector Spaces, New-York , 1967 .
- 2) Schaefer, H. Topological vector spaces, Mac Millan, New-York , 1966 .

ULTRAPRODUSE DE SPAȚII RETICULATE CVASINORMATE

Mireea Popovici și Ovidiu Sandru

Considerăm familia $\{E_i\}_{i \in I}$ de spații liniare, cvasinormate cu cvasinormele q_i subomogene ($q_i(\alpha x) \leq q_i(x)$ dacă $|\alpha| < 1$).

Notăm $l_\infty(I, E_i) = \{x = (x_i)_{i \in I} \mid x_i \in E_i, \sup_i q_i(x_i) < \infty\}$ și $q(x) = \sup_i q_i(x_i)$

Definiția 1 Dacă \mathcal{U} este un ultrafiltru peste I , nămim ultraproductul spațiilor $\{E_i\}_{i \in I}$ spațiul cft $l_\infty(I, E_i)/N_{\mathcal{U}}$, unde $N_{\mathcal{U}}$ este subspațiul lui $l_\infty(I, E_i)$ format din acei $x = (x_i)$ pentru care $\lim_{\mathcal{U}} q_i(x_i) = 0$. Notăm ultraproductul cu $(E_i)_{\mathcal{U}}$.

Propoziția 1 Ultraproductul $(E_i)_{i \in I}$ este spațiu liniar cvasinormat cu cvasinorma subomogenă.

Definiția 2 Spunem că un spațiu reticulat E este spațiu reticulat cvasinormat dacă cvasinorma este solidă.

Propoziția 2 Ultraproductul de spații reticulate cvasinormate este spațiu reticulat cvasinormat.

Propoziția 3 Fie $\{E_i\}_{i \in I}$ o familie de spații σ -reticulate cvasinormate și $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset (E_i)_{\mathcal{U}}$. Dacă $x_n \xrightarrow{\sigma} x$ în $(E_i)_{\mathcal{U}}$, atunci pentru fiecare $i \in I$, există șirul $(x_n^i)_{n \in \mathbb{N}} \subset E_i$ și $x_n^i \in E_i$ astfel încît $x_n^i \xrightarrow{\sigma} x^i$ în E_i și $(x_n^i)_n = x_n$, $(x^i)_n = x$.

Propoziția care urmează conduce la generalizarea următoarei teoreme a lui Krivine :

Fie L o latice Banach K -izomorfă laticial cu l_p ($p \geq 1$). Atunci l_p este finit reprezentabil laticial în L .

Propoziția 4 Fie L o latice Banach K -izomorfă laticial cu $L_p [0,1]$ ($p \geq 1$). Atunci $L_p [0,1]$ este finit reprezentabil laticial în L .

APLICATII ALE NUMERELOR DE ENTROPIE

ALE UNUI OPERATOR

Nicolae Tița și Horiana Tudor

Universitatea din Brașov

În lucrare se studiază măsura necompacității unui operator liniar cu ajutorul numerelor de entropie și a numerelor lui Ghelfand și Kolmogorov [1], [2], [3].

Fie $L(E)$ mulțimea operatorilor liniari și mărginiți $T : E \rightarrow E$, unde E este un spațiu normat.

Numerele de entropie se definesc astfel :

$$e_n(T) = \inf \{ \epsilon > 0 \mid \exists y_1, y_2, \dots, y_q \in E \text{ a.f.}$$

$$TU \subset \bigcup_1^q \{ y_i + \epsilon U \} \}, n=1, 2, \dots, U = \{ x \in E, \|x\| \leq 1 \}, q < n.$$

În [1] se arată că măsura de necompacitate $\beta(T)$ a operatorului T (în sensul lui G. Darbo) este egală cu $E(T) = \lim_{n \rightarrow \infty} e_n(T)$, în cazul cînd E este spațiu Hilbert și $T = T^*$. În lucrare, cu $E(T)$ se notează măsura de necompacitate a unui operator pe un spațiu normat. ~~caz~~ În continuare, cu $d_n(T)$ și $\delta_n(T)$ se notează numerele lui Ghelfand și respectiv Kolmogorov, iar cu $d(T) = \lim_{n \rightarrow \infty} d_n(T)$.

Ținînd cont de proprietățile numerelor $e_n(T)$, $d_n(T)$ și $\delta_n(T)$ ([3], [2]) și de relația

$$C^{-1} E(T) \leq d(T) \leq C E(T), \quad (*)$$

unde C e o constantă independentă de E , rezultă unele relații pentru $E(T)$.

1. $E(T_1 + T_2) \leq E(T_1) + E(T_2)$

$$2. E(T_1 T_2) \leq E(T_1) E(T_2)$$

$$3. E(T+S) = E(T) \Leftrightarrow T \text{ este compact}$$

4. $E(T_1 \otimes T_2) \leq K [E(T_1) \|T_2\| + \|T_1\| E(T_2)]$, unde K este o constantă, iar θ o normă tensorială $\varepsilon \leq \theta \leq \bar{\pi}$.

Relația 4 se obține ținând cont de (*) și de expresia numerelor $d_n(T_1 \otimes T_2)$ ([3]). Celelalte relații se obțin din proprietățile numerelor $e_n(T)$ date de :

Lemă. Numerele de entropie verifică relațiile

$$1. e_{m \ n} (T_1+T_2) \leq e_m (T_1) + e_n (T_2), \quad m, n=1, 2, \dots$$

$$2. e_{m \ n} (T_1 T_2) \leq e_m (T_1) e_n (T_2)$$

Pentru demonstrația relației (2) se procedează astfel.

Fie $\sigma_1 \geq e_m(T_1)$ și $\sigma_2 \geq e_n(T_2)$. Din definiția lui $e_m(T_1)$ rezultă că pentru $x \in U$ există $y_1 \in E$ și $\bar{x} \in U$ astfel ca

$$T_1 x = y_1 + \sigma_1 \bar{x}, \quad 1 \leq i \leq q < m$$

$$\text{Atunci : } T_2 T_1 x = T_2 y_1 + \sigma_1 T_2 \bar{x}$$

Din definiția lui $e_n(T_2)$ rezultă că există $y_j \in E$

$1 \leq j \leq r < n$ și $x^* \in U$ astfel încît

$$T_2 T_1 x = T_2 y_1 + \sigma_1 (y_j + \sigma_2 x^*) = T_2 y_1 + \sigma_1 y_j + \sigma_1 \sigma_2 x^*$$

Deci

$$(T_2 T_1)U \subset \bigcup_{i=1}^q \bigcup_{j=1}^r \{ \bar{y}_i + \bar{y}_j + \sigma_1 \sigma_2 U \}, \quad \bar{y}_i = T_2 y_i$$

$$\text{și } \bar{y}_j = \sigma_1 y_j$$

Cum $q \cdot r < m \cdot n$, ținând cont de definiția numerelor $e_n(T)$ se obține (2). Relația (1) se justifică analog.

Bibliografie.

1. D. EDMUNDS, H. TRIEBEL : Entropy Numbers for Non-Compact Self-Adjoint Operators in Hilbert Spaces, Math.Nachr. 100, 213-219 (1981).
2. B. CARL : Math.Nachr. 103, 39-43, 1981.
3. N. TITA : Consecințe ale aplicării n-diametrelor în studiul operatorilor liniari, Ses.St.Univ.Craiova, 1971.

OPERATORI MARGINITI PE LATICE BANACH

de

George Turcitu

1. Dacă E este o latice Banach (l.B.), este ușor de arătat că pentru $A \subset E$ următoarele afirmații sînt echivalente :

$$i) \forall \varepsilon > 0 \exists u \in E^+ : A \subseteq \varepsilon B_1 + [-u, u] ;$$

$$ii) \forall \varepsilon > 0 \exists u \in E^+ : \| (|x| - u)^+ \| \leq \varepsilon , \forall x \in A ;$$

$$iii) \forall \varepsilon > 0 \exists u \in E^+ : \| |x| - |x| \wedge u \| \leq \varepsilon , \forall x \in A .$$

unde B_1 este bula unitate închisă a lui E .

2. Definiție Fie E l.B. și $A \subset E$. A se numește aproximativ e-mărginită dacă verifică una din condițiile de mai sus .

3. Dacă E este l.B. și $A \subset E$, atunci , mulțimile : A , seA , coA , $co(seA)$, $se(coA)$ sînt a.e.-mărginite de îndată ce oricare dintre ele este a.e.-mărginită .

4. Teoremă ([1] , 83A) Fie E un L -spațiu și $A \subset E$. Următoarele afirmații sînt echivalente :

i) A este a.e.-mărginită ;

ii) A este relativ slab compactă

5. Definiție Fie E spațiu Banach , F l.B. și $T \in L(E, F)$. T se numește operator a.e.-mărginit dacă duce mulțimi normic mărginite în mulțimi a.e.-mărginite .

6. Cu 4. este clar că dacă E s.B. iar F L -spațiu , atunci $T \in L(E, F)$ este a.e.-mărginit dacă și numai dacă este slab compact .

7. Ținînd cont de caracterisările operatorilor slab compacti definiți pe $C(S)$ (vezi [2] 6.) și din 6. obținem :

Teorema Fie E și F latice Banach și $T \in L(E, F)$. Dacă T

este un operator a.e.-mărginit, atunci :

i) T aplică orice șir ϵ -mărginit disjunc într-un șir normic convergent ;

ii) T aplică orice șir monoton ϵ -mărginit într-un șir normic convergent ;

iii) T este un operator de tip B. (vezi [2], 2.)

8. Definiție Fie E, F latici Banach, $T \in L(E, F)$ se numește operator absolut continuu (a.c.) dacă : $\forall \epsilon > 0 \exists x' \in E^{+}$ ca : $\|Tx\| \leq \epsilon \|x\| + x(|x|)$, $\forall x \in B_1$.

9. Teoremă Fie E, F latici Banach și $T \in L(E, F)$, atunci, T este un operator absolut continuu dacă și numai dacă T' este un operator a.e.-mărginit.

10. Dacă T este un operator a.c., atunci, T aplică mulțimi $|x|$ -total mărginite în mulțimi normic compacte.

11. Teoremă Fie E l.B. și $T \in L(E)$ pozitiv compact și fie $S : E \rightarrow E$, $0 \leq S \leq T$. Atunci :

- i) S este un operator a.e.-mărginit ;
- ii) S aplică ϵ -intervalele în mulțimi $|x|$ -total mărginite
- iii) S este un operator absolut continuu ;
- iv) S^3 este un operator compact . (vezi și [3])

BIBLIOGRAFIE

- [1] Fremlin, D.H., "Topological Riesz Spaces and Measure Theory", Cambridge at the U.Press, 1974 .
- [2] Niculescu, C., "Operatori slab compacti ...", Sem. "Spații Lin. Ordinate Top.", Nr.2(1981) Brașov .
- [3] Aliprantis, G.D., Burkinshaw, O., "Positive Compact Operators in Banach Lattices", Math. Zeitsch. Heft 3, 198e .

SEMIGRUPURI POZITIVE PE LATICE LOCAL CONVEXE

MIHAI VOICU

- INSTITUTUL DE CONSTRUCTII BUCURESTI -

Fie X un spațiu local convex și P familia seminormelor continue pe X .

Def.1

Familia $R_\lambda \in L(X), \lambda > 0$ se numește rezolvanță dacă verifică ecuația

$$R_\lambda f - R_{\mu} f = (\mu - \lambda) R_\lambda R_\mu f.$$

Def.2

O rezolvanță $R_\lambda, \lambda > 0$ este de tip L_0 (L_∞) dacă :

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \lambda R_\lambda f = 0, \left(\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \lambda R_\lambda f = f \right), \forall f \in X.$$

Observație

Dacă $R_\lambda, \lambda > 0$ este de tip L_0 , notăm cu $V : D \rightarrow X$ operatorul definit astfel : $Vf = \lim_{\lambda \rightarrow 0} R_\lambda f, f \in D$.
 V se numește cogeneratedorul asociat.

Dacă $R_\lambda, \lambda > 0$ este de tip L_∞ , notăm cu $A : D_1 \rightarrow X$ operatorul definit astfel $Af = \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \lambda (\lambda R_\lambda f - f), f \in D_1$.
 A se numește generatorul asociat.

Def.3

Spunem că familia $P_t \in L(X), t \geq 0$ este un semigrup de clasă C_0 dacă :

1. $P_t P_s = P_{t+s}$
2. $P_0 = I$
3. $\lim_{t \rightarrow t_0} P_t f = P_{t_0} f,$

Notăm cu $V : D \rightarrow X$, generatorul infinitezimal al semigrupului.

$$\forall f \in D \quad Vf = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{P_t f - f}{t}, f \in D.$$

Teorema 1

Fie X o latice local convexă (în sensul din [1]),

$R_\lambda, \lambda > 0$ o familie rezolvantă de tip L_0 și L_∞ și $V: D \rightarrow X$ generatorul asociat. Următoarele afirmații sînt echivalente:

- 1) R_λ este pozitiv, pentru orice $\lambda > 0$
- 2) $f \in D, \lambda > 0$ și $(\lambda I - V) f \wedge (-Vf) \leq 0 \Rightarrow f \leq 0$
- 3) $f \in D, \lambda > 0$ și $(\lambda I - V) f \leq 0 \Rightarrow f \leq 0$

Teorema 2

Fie X o latică local convexă, secvențional completă, $P_t, t \geq 0$ un semigrup de clasă C_0 și $V: D \rightarrow X$ generatorul infinitesimal. Presupunem că sînt îndeplinite condițiile:

1. Pentru orice $p \in P$, există $q \in P$, astfel încît $p(P_t f) \leq q(f), \forall (t \geq 0, f \in X)$.
2. $\overline{\text{Im}V} = X$. Atunci următoarele afirmații sînt echivalente:
 - (1) P_t este pozitiv, pentru orice $t \geq 0$
 - (2) $f \in D, \lambda > 0$ și $(\lambda I - V)f \wedge (-Vf) \leq 0 \Rightarrow f \leq 0$

- Bibliografie -

- /1/. Cristescu R. - Spații liniare topologice. Ed. Acad. RSR, 1974.
- /2/. Sato, Ken-iti. - Positive pseudo-resolvents in Banach lattices. J.-Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sect. I 17 (1970).
- /3/. Voicu M. - Familii rezolvante pe spații local convexe. St. cerc. mat. 29, 2 (1977).
- /4/. Voicu M. - Operatori asociați rezolvanțelor pe spații local convexe. St. cerc. Mat. 29; 5 (1977).
- /5/. Yosida K. - Functional Analysis, Springer, Berlin-Heidelberg-New York, 1965.

SPATII BANACH SEPARABILE CU DUAL NESEPARABIL

Constantin Volintiru

Facultatea de Matematică București

Dacă X este un spațiu Banach real separabil cu dualul X^* neseparabil, se poate demonstra următoarea afirmație :

" Pentru orice $\varepsilon > 0$ există un șir bazic $(x_n) \subset X$ și $x^* \in X^*$ astfel încît $\|x^*\| = 1$ și

$$\|x_n\| = 1, x^*(x_n) > 1 - \varepsilon$$

pentru orice $n \in \mathbb{N}$."

O interpretare a acestui enunț este aceea că dacă X este separabil cu dual neseparabil, atunci conține aproape izometric conul pozitiv din \mathcal{E}_1 .

Rezultatul acesta este o alternativă la contraexemplele obținute în [1] la ipoteza (Banach) că dacă X este un spațiu Banach separabil cu dual neseparabil, atunci $\mathcal{E}_1 \subset X$.

Bibliografie:

1. J.Lindenstrauss, C.Stegall Examples of separable spaces which do not contain \mathcal{E}_1 and whose duals are non-separable. Studia Math. T.LIV (1975) .

M-PRODUSE TENSORIALE PERFECTE DE LATICI BANACH PERFECTE

Dan VUZA

INCREST București

Fie E o latică Banach ; notăm cu E^X spațiul formelor liniare ω -continue pe E și cu $C(E)$ idealul elementelor $x \in E$ pentru care restricția lui E la idealul generat de x este ω -continuă .

O latică Banach perfectă este o latică Banach E pentru care aplicația canonică $E \rightarrow E^{XX}$ este izometrică și surjectivă. $|\sigma|$ -topologia unei latici Banach perfecte E este topologia dată de seminormele $x \rightarrow f(|x|)$ unde $f \in E_+^X$.

Fiind date două latici Banach perfecte E_1, E_2 , M -produsul lor tensorial $E_1 \hat{\otimes}_M E_2$ în sensul lui Levin nu este în general latică Banach perfectă (de exemplu , $E_1 = E_2 = L_\infty([0,1])$) ; apare deci necesară introducerea produsului tensorial perfect $E_1 \hat{\otimes}_M^X E_2$ care să fie latică Banach perfectă.

Fie E_1, E_2 latici Banach perfecte; notăm cu $\mathcal{L}_m^X(E_1, E_2)$ spațiul operatorilor ω -mărginiți și ω -continui $U: E_1 \rightarrow E_2$. Introducând pe acest spațiu norma $\|u\| = \sup\{\|U(x)\| \mid x \in E_1, \|x\| \leq 1\}$, devine latică Banach perfectă; notăm cu $L_m^X(E_1, E_2)$ închiderea subspațiului operatorilor de rang finit din $\mathcal{L}_m^X(E_1, E_2)$ în $|\sigma|$ -topologia lui $\mathcal{L}_m^X(E_1, E_2)$.

Prin definiție , $E_1 \hat{\otimes}_M^X E_2 = L_m^X(E_1, E_2)$; $E_1 \hat{\otimes}_M E_2$ este subspațiu în $E_1 \hat{\otimes}_M E_2$.

Teoria M -produselor tensoriale perfecte este dezvoltată în lucrarea " The perfect M -tensor product of perfect Banach lattices" , Preprint-INCREST Nr.35/1982 și a fost prezentată într-un ciclu de expuneri în cadrul seminarului de Spații liniare ordonate topologice. Ultimul rezultat din această lucrare a făcut obiectul prezentei comunicări.

Fie $E_i (i=1,2)$ latici Banach perfecte și fie F_i un ideal închis

conținut în $C(E_1)$. Atunci subspațiul închis generat de $F_1 \otimes F_2$ în $E_1 \hat{\otimes}_M E_2$ este un ideal în $L_2(E_1^x, E_2)$ conținut în $C(E_1 \hat{\otimes}_M E_2)$.

Demonstrația folosește teoria modulelor tare reticulati și unele procedee ale lui Dodds și Fremlin .

Rezultatul de mai sus permite precizarea unor rezultate ale lui Nicolae Popa referitoare la M-produsele tensoriale .



Referate prezentate la seminarul științific de
Spații liniare ordonate topologic
în anul universitar 1981-1982

1. Romulus Cristescu - Topologii cu proprietatea lui Fatou.
- Mulțimi (o)-precompacte și topologii pre-Lebesgue .
2. Gh. Grigore- Spațiul lui Schwartz cu ordinea punctuală.
3. C. Miculescu- Latici cu topologii (o)-continuă.
- Operatori -continui.
4. O. Olteanu- Operatori -liniari.
5. G. Păltineanu- Teorema lui Hewitt pentru spații topologice ordonate
6. Nicolae Popa - Spații Orlicz.
7. M. Popovici - Ultraproduse de latici Banach.
8. O. Sandru - Teorema lui Dvoretzki.
O generalizare a unei teoreme a lui Krivin.
9. G. Turcitu - Operatori pozitivi compacți pe latici Banach.
10. M. Voicu - Semigrupuri pozitive pe latici Banach .
11. C. Volintiru- Spații Banach separabile cu dual neseparabil.
Proprietatea Radon-Nikodym în spații Banach.
12. Dan Vuza - Caracterizarea laticilor vectoriale folosind seminorme solide extinse.
- M-Produse tensoriale perfecte de latici Banach.
13. Ismat Beg (Pakistan) - Reprezentarea integrală a unor operatori liniari.

VERIFICAT
2017



VERIFICAT
1987

VERIFICAT
2007

Autorii referatelor au prezentat rezultatele într-una sau mai multe ședințe ale seminarului.

Lei 8,40