

# STUDII ȘI CERCETĂRI DE ANTROPOLOGIE

1

TOMUL 11

1974

EDITURA ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

<https://biblioteca-digitala.ro/> / <https://www.antropologia.ro>

P-1458

## COMITETUL DE REDACȚIE

*Redactor responsabil*: prof. univ. dr. doc. OLGA NECRASOV  
membru corespondent al Academiei  
Republicii Socialiste România

*Redactor responsabil adjunct*: dr. V. V. CAMELEA

*Membri*: { acad. ȘT.-M. MILCU  
dr. SUZANA GRINȚESCU-POP  
D. NICOLAESCU-PLOPȘOR  
dr. MARIA CRISTESCU

*Secretar de redacție*: ELENA RADU

În țară, abonamentele se primesc la oficiile poștale, agențiile poștale, factorii poștali și difuzorii de presă din întreprinderi și instituții.

Comenzile de abonamente din străinătate se primesc la Întreprinderea ROMPRESFILATELIA, Căsuța poștală 2001, telex 011631, București, România, sau la reprezentanții săi din străinătate.

La revue „Studii și cercetări de antropologie” parait 2 fois par an.

Toute commande de l'étranger sera adressée à ROMPRES-FILATELIA, Boite postale 2001, telex 011631, Bucarest, Roumanie, ou à ses représentants à l'étranger.

En Roumanie, vous pourrez vous abonner par les bureaux de poste ou chez votre facteur.

APARE DE 2 ORI PE AN

ADRESA REDACTIEI:  
BULEVARDUL DR. PETRU GROZA NR. 8  
BUCUREȘTI 35, C.P. 4219

# STUDII ȘI CERCETĂRI DE ANTROPOLOGIE

Tomul 11, nr. 1

1974

## S U M A R

### Antropologie istorică

- IOANA POPOVICI, M. ȘT. UDRESCU, Date demografice comparative asupra unor populații medievale din Cimpia Română în secolele XIV—XVIII . . . . . 3  
LAURENȚIA GEORGESCU, Date antropologice asupra resturilor scheletice umane descoperite la Limanu . . . . . 7

### Antropologie contemporană și aplicată

- MARIA VLĂDESCU, Variabilitatea constituțională a populației masculine din satul Peștera — Bran . . . . . 11  
ELENA RADU, OANA ROȘTEANU, Considerații asupra variabilității conformativ-somatice și fizionomiei constituționale a unor serii de femei din comunitatea Peștera — culoarul Bran . . . . . 21  
HORST SCHMIDT, Studiul antropologic al unei populații germane din Munții Banatului . . . . . 31  
CORNELIU VULPE, Observații asupra desenelor papilare digitale, palmare și plantare la populația din Peștera (Bran) . . . . . 49

### Studiul antropologic al populației din comuna Săpînța (jud. Maramureș)

- OLGA NECRASOV, Introducere . . . . . 61  
OLGA NECRASOV, D. BOTEZATU, SILVIA GHIGEA, C. FEODOROVICI, Conformația cefalo-facială, pigmentația și tipul antropologic la populația din satul Săpînța . . . . . 63  
CEZARINA-ANA BĂLTEANU, MARIA-ELENA GRAMATOPOL-ROȘCA, Studiul frecvenței grupelor sanguine din sistemul OAB și a factorilor lor ereditari la populația din Săpînța . . . . . 73  
C. NEAMȚU, D. BOTEZATU, Variabilitatea unor caractere fiziometrice la populația din Săpînța . . . . . 77

### Antropologie cultural-lingvistică

- I. OPRESCU, V. SĂHLEANU, Cercetări comparative asupra vitezei de vorbire . . . 91  
LUCIA MĂRCUȘ, Numele de familie din locuirea Peștera (zona Bran) . . . . . 97



## DATE DEMOGRAFICE COMPARATIVE ASUPRA UNOR POPULAȚII MEDIEVALE DIN CÎMPIA ROMÂNĂ ÎN SECOLELE XIV—XVIII

DE

IOANA POPOVICI și M. ȘT. UDRESCU

571.572 :614.1

Demografia evului mediu românesc este încă atît de puțin cunoscută încît orice informație în acest sens poate fi utilă.

Prezentăm în cele ce urmează unele date demografice rezultate din studiul scheletelor a 9 cimitire din secolele XIV—XVIII. Începînd cu secolele XIV—XV se constată documentar și arheologic o înmulțire a așezărilor în sudul Carpaților. Pînă la „legarea de glie”, majoritatea hrisoavelor atestă înființarea satelor prin „voie”, dar mai tîrziu o parte a populației este formată din imigranți de peste Carpați sau din sudul Dunării (4), (5), (13), (14). În felul acesta vor fi luat naștere și așezările ale căror cimitire fac obiectul studiului de față.

În ordine cronologică, aceste cimitire sînt: Verbicioara (3), Drobeta-Turnu Severin (7), Străulești I (10), Străulești II (12), Bragadiru-Zimnicea (8), Bucov (11), Căscioarele<sup>1</sup> și Cernica (2).

Din seriile studiate, cele provenite de la Străulești-București (în special seria din primul cimitir) prezintă un material cu totul deosebit. Condițiile excepționale oferite de aceste două necropole pentru efectuarea unui studiu demografic ne-au determinat să le considerăm ca lot de referință față de celelalte cimitire cercetate. Toate necropolele menționate sînt așezate în Cîmpia Română sau în regiunea subdeluroasă adiacentă; populațiile care le-au folosit aparțineau aceluiași neam, aveau o cultură asemănătoare și s-au dezvoltat în condiții social-politice nu prea diferite. Asemănarea condițiilor de viață poate determina asemănare și în „caracteristicile demografice esențiale”. Diferențele de la o serie la alta sînt datorate în mare măsură modului în care s-a făcut săpătura, mai ales modului în care s-a recoltat materialul antropologic (număr mic de schelete, adeseori ridicate la întîmplare — uneori simple sondaje în cimitire care cuprind mai multe generații), dar și caracteristicilor locale și de timp legate de istoria particulară a fiecărei comunități.

Folosindu-se metode antropologice (1) s-a estimat din an în an vîrsta copiilor pînă la 14 ani și, de asemenea, vîrsta femeilor și a bărbaților de la 15 ani în sus pe grupe de vîrstă de 5 sau 10 ani. Profilul mortalității, durata medie de viață și probabilitatea de supraviețuire

<sup>1</sup> Ioana Popovici, date nepublicate.

la fiecare grupă de vîrstă au fost calculate cu ajutorul tabelelor de mortalitate.

Caracteristic cimitirelor din care s-au ridicat toate sau majoritatea scheletelor descoperite este procentul mare al copiilor sub 14 ani : 45,95 % din morții de la Străulești I, 45,16 % de la Bucov, 36,65 % de la Străulești II, 27,60 % de la Cernica și 25 % de la Zimnicea. De asemenea, se constată numeroase decese printre femeile tinere (peste 15 ani) : 47,36 % din femeile de la Străulești I, 44,12 % de la Străulești II, 46,17 % de la Cernica, 41,39 % de la Drobeta-Turnu Severin, 38,89 % de la Verbioara, femei care au trăit pînă la aproximativ 30 de ani.

Frecvența maximă a mortalității se întilnește în deceniile 3—5 la femei (42,1—55 %) și 4—6 la bărbați (31—57 %). Pentru grupa senilă, diferențierea în ceea ce privește mortalitatea pe sexe se micșorează, așa încît valorile procentuale sînt mai apropiate. Frecvența senililor în general variază, în funcție de serie, între 4,61 % la Cernica și 16,67 % la Verbioara, cu majoritate de aproximativ 9 %.

Frecvența diferită a mortalității în anumite grupe de vîrstă modifică durata medie de viață. În seriile noastre, speranța de viață în grupa infans I este de 23,9 ani la Străulești I, 25,1 ani la Bucov, 29 ani la Străulești II, 32,1 ani la Zimnicea, 32,4 ani la Cernica. Celelalte valori nu sînt concludente deoarece seriile nu au fost reprezentative (tabelul nr.1). Oricît de aproximative, cifrele se încadrează în tabloul demografic al lumii medievale (1). Dacă considerăm numai grupele biologice de vîrstă (copii, tineri, maturi, bătrîni), pentru cei care contestă valabilitatea tabelelor de mortalitate în demografia pe schelete trebuie menționată mortalitatea ridicată printre copii și femeile tinere și procentul redus al celor ce ajung la bătrînețe.

Structura pe grupe de vîrstă reflectă condițiile de viață particulare fiecărei comunități, pentru că „nivelul și evoluția mortalității nu sînt determinate de caracterele biologice ale morții, ci de condițiile economice și culturale ale societății” (6). Condițiile în care au trăit populațiile cercetate nu se deosebesc prea mult : comunități sătești predominant agricole, culturi extensive, hrană rudimentară, ignoranță, lipsă de igienă. În acest sens, ni se par demonstrative asemănările dintre seriile de la Străulești I — București și Bucov — Ploiești la interval de două secole : același procent de mortalitate ridicat la copii (45,95 % la Străulești și 45,16 % la Bucov), o durată medie de viață redusă (23,9 și, respectiv, 25 de ani). Subliniem că ambele cimitire au o durată de folosire de aproximativ o jumătate de secol și aparțin unor așezări de început cu condiții ecologice asemănătoare. În același timp se remarcă deosebiri în evoluția aceleiași comunități atunci cînd intervine o schimbare a condițiilor de viață, așa cum se poate ilustra prin cele două necropole consecutive de la Străulești. În așezarea din secolele XIV—XV se observă o mai mare mortalitate printre copii și tineri. Un secol mai tîrziu, o evidentă ameliorare a condițiilor de viață, atestată arheologic, se reflectă în seria antropologică : scade procentul copiilor sub 10 ani, de la 40,56 la 30,45 %, ca și cel al femeilor sub 25 de ani, de la 36,8 la 23,75 %. Crește speranța de viață de la 23,9 la 29 de ani, ca și numărul subiecților trecuți de 50 de ani, de la 13,50 la 20,20 %.

*Tabelul nr. 1*  
**Demografice comparative**

Așezarea	Nr. total schelete	Copii 0—14 ani		Adulți 20—40 ani		Senili peste 60 ani		Speranța de viață în gru- pa infans I	Speranța de viață în gru- pa 20—30 ani
		nr.	%	nr.	%	nr.	%		
Străulești I	74	34	45,96	16	21,62	4	5,40	23,9	21,6
Străulești II	258	89	34,65	64	24,72	17	6,54	29,0	22,0
Verbicioara	54	4	7,40	21	38,89	9	16,67	39,3	23,9
Drobeta—Turnu Severin	89	—	—	43	48,31	10	11,24	—	20,9
Zimnicea	52	13	25,00	20	38,46	5	9,62	32,1	20,6
Bucov	31	14	45,16	6	19,36	4	12,90	25,1	26,1
Căscioarele	22	4	18,18	6	27,27	2	9,09	37,6	25,0
Cernica	87	24	27,58	24	27,58	4	4,61	32,4	23,4
Strehaia	80	7	8,75	36	45,00	7	8,75	37,3	19,4

Efectivul populației acestor așezări va fi studiat într-un alt context decât cel pe care ni l-am propus în acest articol.

În încheiere, considerăm că seriile de la Străulești I și II, Bucov, Zimnicea și — cu rezerve — Cernica, asemănătoare în caracteristicile demografice esențiale, pot reflecta o realitate istorică.

## DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES COMPARÉES SUR QUELQUES POPULATIONS MÉDIÉVALES DE LA PLAINE ROUMAINE AUX XIV<sup>e</sup>—XVIII<sup>e</sup> SIÈCLES

### RÉSUMÉ

On présente quelques données démographiques comparées de 9 cimetières des XIV<sup>e</sup>—XVIII<sup>e</sup> siècles, au sud des Carpates, totalisant 747 squelettes. Les conditions culturelles et économiques (lato sensu) dans lesquelles se sont développées les populations étudiées sont semblables, fait qui se reflète aussi dans les données démographiques essentielles, notamment dans les séries mieux représentées.

### BIBLIOGRAFIE

1. ACSADY G., NEMESKERI J., *History of human life-span and mortality*, Budapesta, 1970.
2. BOTEZATU D., ȘTEFĂNESCU GH., *Caracterizarea antropologică a scheletelor din cimitirul feudal de la Cernica (sec. XVII—XVIII)*, St. cerc. antropol., 1970, 7, 2, 181—192.
3. MAXIMILIAN C., *Studiul antropologic al populației de la Verbicioara (sec. XIII—XIV)*, Probleme de antropologie, 1959, IV, 79—104.
4. PANAIT I. PANAIT, *Inceputurile orașului București în lumina cercetărilor arheologice*, București, 1967, V, p. 7.
5. PASCU ȘT., *Demografie istorică*, în *Populație și societate*, Dacia, Cluj, 1970, p. 11.
6. PESCARU AL., *Elemente de demografie*, Edit. științifică, București, 1968.
7. POPOVICI IOANA, *Cimitirul feudal de la Turnu-Severin — sec. XIV*, St. cerc. antropol., 1965, 2, 1, 69—77.
8. POPOVICI IOANA, *Necropola feudală de la Bragadiru-Zimnicea. Observații antropologice*, St. cerc. antropol., 1969, 6, 2, 169—174.
9. POPOVICI IOANA, *Caracterizarea antropologică a unor schelete din cimitirul de la Strehăia (sec. XVII—XVIII)*, St. cerc. antropol., 1970, 7, 1, 19—30.
10. POPOVICI IOANA, *Notes bearing on the population mortality of a small Middle-Age rural settlement*, Ann. roum. Anthropol., 1971, 8, 21—26.
11. POPOVICI IOANA, *Notă asupra scheletelor descoperite la Bucov, sec. XVI—XVII*, St. cerc. antropol., 1972, 9, 2, 119—122.
12. POPOVICI IOANA, *Cimitirele de la Străulești, sec. XIV—XVI. Analiză demografică*, St. cerc. antropol., 1973, 10, 1, 15—22.
13. ȘTEFĂNESCU ȘT., *Situația demografică în Țările Române în sec. XIV—XVI*, în *Populație și societate*, Dacia, Cluj, 1970, p. 75.
14. VLAD D. MATEI, *Colorizarea rurală în Țara Românească și Moldova în secolele XV—XVIII*, Edit. Academiei, București, 1973.

Primit în redacție la 9 februarie 1974

Centrul de cercetări antropologice  
București



# DATE ANTROPOLOGICE ASUPRA RESTURILOR SCHELETICE UMANE DESCOPERITE LA LIMANU

DE

LAURENȚIA GEORGESCU

572.781.571.

Cu ocazia lucrărilor de îndiguire care au avut loc în anul 1959 în apropierea lacului Mangalia, pe teritoriul comunei Limanu s-au descoperit o necropolă și o așezare aparținând culturii Hamangia.

„Cimitirul culturii Hamangia era situat pe panta dinspre capătul de vest al barajului. Unul din mormintele descoperite aici conținea un schelet uman așezat în decubit dorsal, cu brațele întinse pe lângă corp, orientat pe direcția sud-nord, capul fiind îndreptat spre sud” (1). Mormântul aparținea unei femei mature și era însoțit de un bogat inventar. Menționăm că acest schelet nu a putut fi recuperat pentru studiu.

Studiul arheologic privind așezarea și necropola de la Limanu subliniază că „oamenii culturii Hamangia se aflau pe malurile lacului, cel puțin din perioada reprezentată de Hamangia II, continuând să locuiască și să-și îngroape morții pînă la încheierea evoluției acestei culturi” (6).

Scheletul uman care face obiectul acestui studiu a fost exhumat în anul 1968 de către Wanda Wolschi din același perimetru ca și scheletul descoperit în 1959 și aparține aceluiași complex cultural.

Craniul, de formă romboidă în norma verticală, are formă de bombă în norma occipitală, cu reliefurile nucale șterse. Mastoidele sînt mici, nereliefate.

Dimensiunea minimă a frunții ( $ft-ft=87$ ) este îngustă în raport cu dimensiunea maximă a craniului ( $eu-eu=124$ ). Bazele frontale proemină slab, cu reliefurile glabelare și supraciliare șterse.

Rădăcina nasului este foarte lată; fiind seamă de distanța  $n-sn$ , putem presupune că oasele nazale au fost probabil scurte.

Dacă comparăm înălțimea neurocraniului ( $po-b=103$ ) cu lungimea totală a lui ( $g-op=164$ ) și cu lățimea maximă a craniului ( $eu-eu=124$ ), constatăm dezvoltarea medie a înălțimii neurocraniului în raport cu dimensiunile orizontale, indicele cefalic caracterizîndu-l ca mezocran (75,6).

Arcada dentară a maxilarului superior are o formă elipsoidă. Dențiția deciduală este reprezentată de  $i^2$ ,  $c$ ,  $m^1$ ,  $m^2$  stînga și de  $i^1$ ,  $m^1$ ,  $m^2$

dreapta. Semnalăm prezența următorilor dinți definitivi incluși:  $M^1$  (cu coroana formată) și  $I^1$  dreapta,  $M^1$  (cu coroana formată) stînga.

Mandibula este reprezentată de corpul și ramura dreaptă, cu men-tonul bituberculat. Dentiția deciduală este reprezentată de  $m_1$  și  $m_2$ , iar cea definitivă prin  $M_1$  inclus (cu coroana formată).

Scheletul postcranian este destul de bine conservat. Toate oasele membrului superior și inferior sînt prezente, cu excepția cubitusului drept, precum și humerusului și a radiusului stîng.

Aprecierea vîrstei s-a făcut în funcție de stadiul de dezvoltare a coroanei la  $M^1$  dreapta,  $M^1$  stînga,  $M_1$  dreapta, ținînd cont și de datele din tabelele lui Logan și Kronfeld (citați după (5)).

Tabelul nr. 1


Datele metrice și indicii cranilor de la Limanu și Gumelnița

Nr. Martin	Metric		Nr. Martin	Metric		Nr. Martin	Indicii	
	Limanu	Gumelnița		Limanu	Gumelnița		Limanu	Gumelnița
1	164	156	45	96	—	8 : 1	75,6	79,5
3a	160	—	43	83	—	17 : 1	71,3	—
8	124	124	43(1)	76	—	20 : 1	62,8	66,0
17	117	—	46	67	—	17 : 8	94,3	—
5	80	—	47	76	68	20 : 8	83,1	83,1
20	103	103	48	44	42	9 : 10	83,4	78,6
9	87	78	50	21	—	9 : 8	70,2	62,9
10	107	98	52	25	28,5	12 : 8	78,2	—
11	95	—	54	20	17	30 : 29	113,7	105,7
12	97	—	62	30	—	29 : 26	80,5	84,2
23	463	441	63	32	—	30 : 27	90,0	85,3
25	345	—	69(1)	17	—	31 : 28	92,5	—
26	118	114	69(3)	10	—	16 : 7	70,5	—
27	120	119	55	32	28,5	45 : 8	77,4	67,7
28	107	—	70	30	—	48 : 45	45,8	50,0
29	95	96	71a	24	—	47 : 45	79,2	80,9
30	108	101,5	—	—	—	48 : 8	35,5	33,9
31	99	—	—	—	—	54 : 55	62,5	59,6
7	34	—	—	—	—	—	—	—
16	24	—	—	—	—	—	—	—

Folosind pentru comparație și craniile actuale de copii din colecția Dr. Petre Fîru, putem afirma că e vorba de un copil în vîrstă de aproximativ 4 ani.

Prezența copiilor în necropolele neolitice a mai fost semnalată la Cernica în proporție de 9,99% (din 130 de schelete) și la Cernavodă în proporție de 6,75% (din 203 schelete) (3).


Pentru o analiză comparativă nu dispunem decît de un singur caz studiat, un mormînt de copil din cultura Gumelnița (4). Craniul de copil de la Limanu, care are un grad de asemănare cu cel de la Gumelnița prin gracilitatea sa, pune problema apartenenței la tipul mediteranoid, dacă ne referim la faptul că acesta este tipul predominant în seriile de adulți gumelnițene cunoscute pînă în prezent.



3




2



1



5



4

PLAȘA I. CRANIUL DE LA  
LITANI

- Fig. 1. Craniul văzut în norma frontală.
- Fig. 2. — Craniul văzut în norma laterală.
- Fig. 3. Craniul văzut în profil 3/4.
- Fig. 4. Craniul văzut în norma occipitală.
- Fig. 5. — Craniul văzut în norma verticală.



Autorul studiului de la Gumelnița (4) nu exclude posibilitatea apartenenței craniului de copil la fondul mediteranoid gracil, subliniind gradul de asemănare al acestuia cu craniile de copii din necropola gumelnițeană de la Boian — Vărăști, unde adulții aparțin formelor mediteranoide gracile.

Prezența unui grup de elemente mediteranoide, atestate în cultura Hamangia (2), nu exclude posibilitatea apartenenței craniului de la Limanu, datorită trăsăturilor sale gracile, unui fond mediteranoid prin complexul de caractere menționate (vedeți tabelul nr. 1 și planșa I).

## DONNÉES ANTHROPOLOGIQUES CONCERNANT LES OSSEMENTS D'UNE SÉPULTURE DÉCOUVERTE À LIMANU

### RÉSUMÉ

Les ossements humains découverts dans la sépulture de Limanu appartiennent à un enfant âgé de 4 ans. Le crâne est du type mésocrâne. La sépulture appartient à la nécropole néolithique de la civilisation Hamangia.

### BIBLIOGRAFIE

1. HARTUCHE N., *Un vas de marmură descoperit într-un mormint de tip Hamangia*, în Revista muzeelor, 1966, 5, 445.
2. NECRASOV O., CRISTESCU M., MAXIMILIAN C., NICOLĂESCU-PLOPȘOR D., *Studiul antropologic al scheletelor neolitice descoperite în cimitirul preistoric de la Cernavodă*, în Probleme de antropologie, 1959, IV, 21—46.
3. NECRASOV O., CRISTESCU M., *Aspecte antropologice ale neoliticului și eneoliticului românesc*, în St. cerc. antropol., 1967, 4, 159—169.
4. NICOLĂESCU-PLOPȘOR D., *Expertiză antropologică asupra unui craniu de copil descoperit la Gumelnița în 1960*, în SCIV, 1966, 17, 109—112.
5. OLIVIER G., *Pratique anthropologique*, Paris, 1960, p. 183.
6. WOLSCHI W., IRIMIE M., *Descoperiri arheologice la Mangalia și Limanu aparținând culturii Hamangia*, în Pontice. Studii și cercetări arheologice. II, Muzeul de arheologie Constanța, 1968, p. 58, 81 și 86.

Centrul de cercetări antropologice  
București

Primit la redacție la 9 februarie 1974.



## VARIABILITATEA CONSTITUȚIONALĂ A POPULAȚIEI MASCULINE DIN SATUL PEȘTERA — BRAN

DE

MARIA VLĂDESCU

572.5

În cadrul cercetărilor complexe din zona Bran, studiului constituției umane i s-a acordat un loc important.

Deși tot mai puțini sînt autorii care se preocupă astăzi de această problemă, totuși ea continuă să rețină atenția unor antropologi de renume (3), (4), (7), care au fost preocupați timp de decenii de aspectele de biotipologie umană.

Subscriind la ideea că o cercetare de morfologie umană, dusă pînă la nivel de diagnostic constituțional, poate fi mai edificatoare decît o analiză a dimensiunilor somatice și a indicilor, prezentăm în continuare fizionomia constituțională a populației masculine din așezarea montană Peștera.

### MATERIAL ȘI METODĂ

Studiul s-a efectuat pe un eșantion de 103 subiecți reprezentînd populația de sex masculin în vîrstă de 20—70 de ani. Grupul cuprinde atît bărbați originari de generații din această așezare, cît și bărbați prezentînd grade diferite de rudenie cu familii din așezările înconjurătoare Măgura, Șirnea, Moeciu de Jos.

Au fost prelevate 10 caractere somatice (tabelul nr. 1), care au fost apoi prelucrate după metoda antropometrică L. Brian (1). Principiile de bază ale acestei metode și etapele principale de desfășurare au fost comentate în studiile noastre anterioare (6).

Lucrarea este o prezentare de date care au valoare de diagnoză constituțională la nivel de populație și la nivel de individ. Ea caracterizează atît tipologia vîrstei mature, relativ stabilă din punct de vedere ontogenetic, cît și modificările fenotipice concomitente procesului de îmbătrînire. Pentru aceasta s-a construit un grafic general de referință

Tabelul nr. 1

## Variabilitatea caracterelor în raport cu vârsta

Vîrstă (ani)	N	valori	St tt	IcTr	IcTo	IcAb	IMi	DapTo	DtTo	DtAb	PmTo	PmAb
21—40	44	$\bar{X}$	1681,00	572,20	164,58	407,40	789,50	196,50	388,62	278,30	917,70	781,50
		$\pm m$	9,46	3,35	1,95	3,64	6,84	2,18	2,57	1,84	6,33	9,68
		$\pm \sigma$	62,75	22,20	12,96	24,15	45,15	14,46	17,04	12,18	42,00	64,20
		CV	3,73	3,88	7,87	5,93	5,72	7,36	4,38	4,38	4,58	8,18
41—50	24	$\bar{X}$	1657,84	562,00	165,75	395,33	785,34	198,25	384,50	279,92	916,16	800,34
		$\pm m$	16,50	6,13	3,02	5,56	11,04	4,33	3,31	3,94	11,29	12,67
		$\pm \sigma$	79,20	29,40	14,50	26,70	53,00	20,80	15,90	18,90	54,20	60,80
		CV	4,78	5,23	8,75	6,75	6,75	10,49	4,14	6,75	5,92	7,60
51—60	19	$\bar{X}$	1652,66	553,97	166,61	384,50	787,40	203,45	375,55	275,55	901,08	774,76
		$\pm m$	13,35	5,24	3,56	4,79	8,30	3,14	3,33	2,59	8,82	12,55
		$\pm \sigma$	56,60	22,20	15,10	20,30	35,20	13,30	14,10	11,00	37,40	53,20
		CV	3,42	4,01	9,06	5,28	4,47	6,54	3,75	3,99	4,15	6,85
61—70	16	$\bar{X}$	1653,26	548,88	170,75	378,25	790,76	215,13	387,63	283,87	934,76	815,76
		$\pm m$	19,43	7,96	3,77	6,54	10,90	4,86	5,06	4,86	13,95	20,10
		$\pm \sigma$	75,20	30,80	14,60	25,30	42,20	18,80	19,60	18,80	54,00	77,80
		CV	4,55	5,61	8,55	6,69	5,34	8,74	5,06	6,62	5,77	9,54

al bărbaților de 20—40 de ani, la care s-au raportat apoi succesiv tipurile bazomorfe caracteristice decadelor următoare de vîrstă (tabelul nr. 2).

Întrucît materialul este structurat diferit față de studiile noastre anterioare, pentru a face posibile comparațiile atunci cînd vom trece la studii de sinteză, am mai construit un grafic general al eșantionului în totalitatea sa, plecînd de la bazomorful de 20—70 de ani, și am separat, prin referință la acest tip, pe baza antropometrogramelor, bărbații autoh-toni de cei care sînt înrudiți prin căsătorii cu persoane din așezările înconjurătoare.

## REZULTATE

Combi-națiile constituționale caracteristice populației masculine de la Peștera sînt cuprinse în tabelul nr. 3.

Bărbații de 20—40 de ani sînt conformați mai curînd după model longilin. Deși nu este vorba de procentaje majoritare, totuși avantajul în frecvență este deținut de constituția liniară, unde paralongilini și dolicotipii totalizează 43 %, față de mediolini 34,4 % și de brevilini numai 22,7 %.

Un alt fenomen specific acestei vîrste este predominanța conformațiilor armonice, în special în cadrul tipologiilor longiline și medii.

Din analiza datelor pentru următoarele două decade de vîrstă (41—50; 51—60) se desprind alte două concluzii importante: o virare a conformației către modelul brevilin (20—40 ani 11,4 % Br; 51—60 ani



Tabelul nr. 2

Grafic general, eșanșon 20-40 de ani:  $\sigma$  (St tt) = 62,75; raport fundamental (St tt) = 1866/1681 = 1,10

Grade	St tt	IcTr	IcTo	IcAb	IMi	DapTo	DtTo	DtAb	PmTo	PmAb
+ 10										
+ 9										
+ 8										
+ 7										
+ 6										
RMa	1866	629	182	448	869	217	428	306	1010	864
	1847,5	623,3	180,3	443,9	861,1	215	424,1	303,2	1000,8	856,1
+ 4	1829	617,6	178,6	439,8	853,2	213	420,2	300,4	991,6	848,2
	1810,5	611,9	176,9	435,7	845,3	211	416,3	297,6	982,4	840,3
+ 3	1792	606,2	175,2	431,6	837,4	209	412,4	294,8	973,2	832,4
	1773,5	600,5	173,5	427,5	829,5	207	408,5	292	964	824,5
+ 2	1755	594,8	171,8	423,4	821,6	205	404,6	289,2	954,8	816,6
	1736,5	589,1	170,1	419,3	813,7	203	400,7	286,4	945,6	808,7
+ 1	1718	583,4	168,4	415,2	805,8	201	396,8	283,6	936,4	800,8
	1699,5	577,7	166,7	411,1	797,9	199	392,9	280,8	927,2	792,2
BB	1681	572	165	407	790	197	389	278	918	785
	1662,5	566,3	163,3	402,9	782,1	195	385,1	275,2	908,8	777,1
- 1	1644	560,6	161,6	398,8	774,2	193	381,2	272,4	899,6	769,2
	1625,5	554,9	159,9	394,7	766,3	191	377,3	269,6	890,4	761,3
- 2	1607	549,2	158,2	390,6	758,4	189	373,4	266,8	881,2	753,4
	1588,5	543,5	156,5	386,5	750,5	187	369,5	264	872	745,5
- 3	1570	537,8	154,8	382,4	742,6	185	365,6	261,2	862,8	737,6
	1551,5	532,1	153,1	378,3	734,7	183	361,7	258,4	853,6	729,7
- 4	1533	526,4	151,4	374,2	726,8	181	357,8	255,6	844,4	721,8
	1514,5	520,7	149,7	370,1	718,9	179	353,9	252,8	835,2	713,9
RMi	1496	515	148	366	711	177	350	250	826	706
- 6										
- 7										
- 8										
- 9										
- 10										
Ma-Mi	370	114	34	82	158	40	78	56	184	158
Gd	37	11,4	3,4	8,2	15,8	4	7,8	5,6	18,4	15,8
Gd/2	18,5	5,7	1,7	4,1	7,9	2	3,9	2,8	9,2	7,9

31,5% Bra) și creșterea proporției de tipuri disarmonice, în special longiline și medioline.

În ultima decadă de vîrstă asistăm la o răsturnare a fenomenului, cu revenirea la situația de la început, cînd din nou sînt mai frecvente tipurile longiline, de data aceasta însă evident disarmonice (6,3% Lo față de 37,5% Dol).

Analizînd frecvențele procentuale din tabelul nr. 4 și în funcție de energia de dezvoltare mega sau micro, în afară de repetarea fenomenului menționat, deși mai dispersat din punctul de vedere al valorilor, mai putem menționa că, față de conformația bazomorfa, sînt mai frecvente tipurile micromorfe și sînt destul de rare constituțiile medimorfe.

Urmărind evoluția grafică a mozaicurilor de tendințe constituționale (fig. 1), caracteristice tipurilor bazomorfe pe clase de vîrstă, putem aprecia comportamentul fiecărei dimensiuni în cadrul acestui proces. Dacă o serie de caractere antropometrice (statura, înălțimea trunchiului și înălțimea convențională a abdomenului) se situează constant sub

Tabelul nr. 3

## Frecvența procentuală a tipurilor constituționale

Vârsta (ani)	N	Longilini				Mediolini				Brevilini			
		Lo		Dol		Paramedi- diotip		Mediotip		Br		Bra	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
20-40	44	13	29,6	6	13,6	11	25,0	4	9,1	5	11,4	5	11,3
		Lo + Dol = 19 43,2%				Param + Medio = 15 34,4%				Br + Bra = 10 22,7%			
41-50	24	5	20,8	5	20,8	5	20,8	2	8,3	3	12,5	4	16,7
		Lo + Dol = 10 41,7%				Param + Medio = 7 29,2%				Br + Bra = 7 29,2%			
51-60	19	2	10,5	5	26,4	1	5,3	4	21,1	6	31,5	1	5,3
		Lo + Dol = 7 36,8%				Param + Medio = 5 26,4%				Br + Bra = 7 36,8%			
61-70	16	1	6,3	6	37,5	1	6,3	4	25,0	3	18,8	1	6,3
		Lo + Dol = 7 43,8%				Param + Medio = 5 31,3%				Br + Bra = 4 25,0%			

Tabelul nr. 4

## Frecvența procentuală a tipurilor constituționale în funcție de energia de dezvoltare

Vârsta (ani)	N	Morfie ±	Lo pînă la Dol				Paramedio-Medio				Br pînă la Bra			
			N		%		N		%		N		%	
			N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
20-40	44	mega	6	13,7	2	4,5	4	9,1	1	2,3	3	6,8	3	6,8
		medio	—	—	1	2,3	—	—	—	—	1	2,3	2	4,5
		micro	7	15,9	3	6,8	7	15,9	3	6,8	1	2,3	—	—
41-50	24	mega	—	—	3	12,5	3	12,5	2	8,3	1	4,2	—	—
		medio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4,2
		micro	5	20,8	2	8,3	2	8,3	—	—	2	8,3	3	12,5
51-60	19	mega	—	—	4	21,1	—	—	—	—	2	10,5	—	—
		medio	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5,3	—	—
		micro	2	10,5	1	5,3	1	5,3	4	21,1	3	15,7	1	5,3
61-70	16	mega	—	—	1	6,3	—	—	2	12,5	2	12,5	1	6,3
		medio	—	—	—	—	1	6,3	—	—	—	—	—	—
		micro	1	6,3	5	31,2	—	—	2	12,5	1	6,3	—	—

nivelul bazomorfului de 20-40 de ani, accentuându-se chiar cu vârsta, cum este cazul înălțimii abdomenului, care înregistrează o deformare disarmonică de ordinul a  $-3\frac{1}{2}$  grade decimale, altele evoluează în sens invers tot după același model. Diametrul antero-posterior toracic la vârsta de aproximativ 70 de ani este situat la o distanță de  $+4\frac{1}{2}$  grade




Fig. 1. — Traseul antropometrogramelor în funcție de vîrstă.

BB 20-40 ani  
 ——— 41-50 ani  
 - - - 51-60 ani  
 o-o-o-o 61-70 ani

decimale față de același bazomorf. Este probabil fenomenul de dilatație atonică a toracelui, concomitent pierderii elasticității pereților alveolari și apariției emfizemului pulmonar, descris de Pende (5). Tot la aceeași vîrstă, depunerile mai mari de grăsime pe torace și abdomen explică valorile

Tabelul nr. 5

Variabilitatea caracterelor metrice folosite în metoda constituțională L. Brian (eșantion 20-70 de ani)

Nr. crt.	Caractere	N	$X_1 - X_n$	Valori statistice			
				$\bar{X}$	$\pm m$	$\pm \sigma$	CV
1	Statură	103	1523-1829	1668,90	6,74	68,40	4,10
2	Înălțime convențională trunchi (sst-așezat)	103	505-639	562,85	3,53	35,85	6,37
3	Înălțimea convențională torace (sst-xy)	103	134-195	165,70	1,29	13,05	7,88
4	Înălțime convențională abdomen (xy-așezat)	103	344-465	396,55	2,69	27,30	6,88
5	Lungime membru inferior (statură minus șezindă)	103	690-889	788,30	4,36	44,40	5,63
6	Diametru antero-posterior torace (nivel xifoid)	103	151-251	201,30	1,70	17,30	8,59
7	Diametru transvers torace (a-a)	103	351-425	385,20	1,69	17,20	4,47
8	Diametru transvers abdomen (ic-ic)	103	242-324	279,50	1,53	15,52	5,55
9	Perimetru torace (nivel xifoid)	103	818-1050	912,50	4,78	48,50	5,32
10	Perimetru abdomen (minim mezogastric)	103	680-992	784,50	6,41	65,10	8,17

crescute ale diametrelor și circumferințelor trunchiului față de toate decadele anterioare.

În tabelul nr. 5 am concentrat variabilitatea caracterelor metrice, folosite în metoda constituțională L. Brian, la eșantionul general de 20-70 de ani.

Pe baza antropometrogramelor individuale, raportate la graficul general al întregului eșantion (tabelul nr. 6), am separat cele două categorii de indivizi. Cu toate rezervele impuse de reprezentarea lor numerică (tabelul nr. 7), un fenomen se conturează clar, cel puțin pentru intervalul 20-60 de ani: tendința mai marcată către constituția longilin-armonică la Peștera și frecvențe mai mari de constituții brevilin-armonice în cadrul populației de amestec.

## CONCLUZII

Fizionomia constituțională a populației masculine de la Peștera prezintă următoarele trăsături principale:

1. În cadrul grupei de vîrstă 20-40 de ani sînt mai frecvente conformațiile longiline și medioline de tip armonic.

Tabelul nr. 6

Grafic general, eșantion 20-70 de ani:  $\sigma$  (St tt) = 68,49; raport fundamental (St tt) = 1969/1069 = 1,13

Grade	St	IcTr	IcTo	IcAb	IMi	DapTo	DtTo	DtAb	PmTo	PmAb
+ 10										
+ 9										
+ 8										
+ 7										
+ 6										
RMa	1869	631	186	445	883	225	431	314	1028	887
	1849	624,2	184	140,2	873,5	222,6	426,4	310,6	1017	877,5
+ 4	1829	617,4	182	435,4	864	220,2	421,8	307,2	1006	868
	1809	610,6	180	430,6	854,5	217,8	417,2	303,8	995	858,5
+ 3	1789	603,8	178	425,8	845	215,4	412,6	300,4	984	849
	1769	597	176	421	835,5	213	408	297	973	839,5
+ 2	1749	590,2	174	416,2	826	210,6	403,4	293,6	962	830
	1729	583,4	172	411,4	816,5	208,2	398,8	290,2	951	820,5
+ 1	1709	576,6	170	406,6	807	205,8	394,2	286,8	940	811
	1689	569,8	168	401,8	797,5	203,4	389,6	283,4	929	801,5
BB	1669	563	166	397	788	201	385	280	918	792
	1649	556,2	164	392,2	778,5	198,6	380,4	276,6	907	782,5
- 1	1629	549,4	162	387,4	769	196,2	375,8	273,2	896	773
	1609	542,6	160	382,6	759,5	193,8	371,2	269,8	885	763,5
- 2	1589	535,8	158	377,8	750	191,4	366,6	266,4	874	754
	1569	529	156	373	740,5	189	362	263	863	744,5
- 3	1549	522,2	154	368,2	731	186,6	357,4	259,6	852	735
	1529	515,4	152	363,4	721,5	184,2	352,8	256,2	841	725,5
- 4	1509	508,6	150	358,6	712	181,8	348,2	252,8	830	716
	1489	501,8	148	353,8	702,5	179,4	343,6	249,4	819	706,5
RMi	1469	495	146	349	693	177	339	246	808	697
- 6										
- 7										
- 8										
- 9										
- 10										
Ma-Mi	400	136	40	96	190	48	92	68	220	190
Gd	40	13,6	4	9,6	19	4,8	9,2	6,8	22	19
Gd/2	20	6,8	2	4,8	9,5	2,4	4,6	3,4	11	9,5

Tabelul nr. 7

Repartiția procentuală a bărbaților originari din Peștera față de amestec, în funcție de tipul constituțional

Vârsta (ani)	N	Morfie ±	Lo		Dol		Paramedioidiotip		Medioidiotip		Br		Bra	
			N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
20-40	17	Peștera	6	35,3	2	11,8	5	29,4	3	17,6	1	5,9	-	-
	27	amestec	3	11,1	4	14,8	8	29,6	4	14,8	6	22,2	2	7,4
41-50	12	Peștera	5	41,7	1	8,3	2	16,7	1	8,3	2	16,7	1	8,3
	12	amestec	-	-	-	-	4	33,3	3	25,0	4	33,3	1	8,3
51-60	8	Peștera	2	25,0	1	12,5	1	12,5	2	25,0	1	12,5	1	12,5
	11	amestec	2	18,2	1	9,1	2	18,2	1	9,1	5	45,4	-	-
61-70	3	Peștera	-	-	-	-	1	33,3	1	33,3	-	-	1	33,3
	13	amestec	2	15,4	5	38,5	3	23,1	2	15,4	1	7,7	-	-

2. Cu vîrsta se accentuează caracterele longilin-disarmonice și crește proporția subiecților cu constituție brevilină, cu excepția decadei 60—70 de ani, unde se observă o revenire la conformația de tip longilin, însă disarmonică.

3. Comparația între bărbații autohtoni din satul Peștera cu eșantionul neselectat din punct de vedere genealogic arată că la primii sînt mai frecvente constituțiile longilin-armonice, iar la cei din urmă constituțiile brevilin-armonice.

## LA VARIABILITÉ CONSTITUTIONNELLE DE LA POPULATION MASCULINE DU VILLAGE PEȘTERA — BRAN

### RÉSUMÉ

L'auteur étudie la physionomie constitutionnelle d'une population de montagne utilisant la méthode anthropométrographique L. Brian

D'après la systématisation des données par décades d'âge, on remarque une plus grande fréquence des constitutions longilignes-harmoniques chez les hommes entre 20 et 40 ans. Dans les deux périodes suivantes croît la fréquence des constitutions brévignes, tandis que, autour de l'âge de 70 ans, on constate de nouveau une croissance de la fréquence des constitutions longilignes, mais dysharmoniques.

Au cours du processus de vieillissement, des modifications importantes interviennent au niveau de l'abdomen et du diamètre antéro-postérieur du thorax, qui enregistre une grande déformation en sens mégamorphe de l'ordre 4 1/2 degrés décimaux (fig. 1). Toujours à 70 ans, les dépôts légers de graisse sur le thorax et l'abdomen expliquent les valeurs plus grandes, par rapport à tous les âges, des dimensions transversales et des circonférences du tronc.

Etant donné que l'échantillon général comprend tant des individus originaires de Peștera que des individus apparentés par des mariages faits dans les localités voisines Măgura, Sirnea, Moeciu de Jos, on a séparé deux échantillons. Leur référence au graphique général pour 20—70 ans et le calcul des fréquences des pourcentages démontrent que, tandis que les hommes autochtones ont une conformation de type paralongiligne, en ce qui concerne les populations mélangées les constitutions para-brévignes sont plus fréquentes.

## BIBLIOGRAFIE

1. BRIAN L., *Construction immédiate des anthropométrogrammes et diagnostics constitutionnels d'orientation dans les recherches sur les échantillons très amples de populations humaines*, Anthropologie, Brno, 1966, IV, 3.
2. BRIAN L., *Types morpho-psychologiques d'athlètes des plus communes spécialités sportives*, VIIIth International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, Tokyo and Kyoto, 1968, vol. I.
3. BRIAN L., *Problèmes actuels et objectifs souhaités de la recherche sur les constitutions humaines*, Bull. Mém. Soc. Anthropol., 1973, 3, XII<sup>e</sup> série.
4. MARTINY M., *Quelques réflexions critiques sur l'existence des morphotypes humains*, Bull. Mém. Soc. Anthropol., 1973, 3, XII<sup>e</sup> série.
5. PENDE N., *Biotypologie de la sénescence. Les géotypes*, In *Traité de médecine biotypologique*, Doin, Paris, 1955.
6. POP-GRINȚESCU SUZANA, VLĂDESCU MARIA, ENĂCHESCU TH., *Fizionomia constituțională a populației din satul Șirnea*, St. cerc. antropol., 1972, 9, 2.
7. SCHREIDER E., *Une typologie constitutionnelle est-elle possible?*, Bull. Mém. Soc. Anthropol., 1973, 3, XII<sup>e</sup> série.
8. VLĂDESCU MARIA, *Tipul constituțional al populației de mineri și de agricultoare din stația-pilot Berevoiești-Argeș*, St. cerc. antropol., 1972, 9, 2.

Centrul de cercelări antropologice  
București





# CONSIDERAȚII ASUPRA VARIABILITĂȚII CONFORMATIV-SOMATICE ȘI FIZIONOMIEI CONSTITUȚIONALE A UNOR SERII DE FEMEI DIN COMUNITATEA PEȘTERA — CULOARUL BRAN

DE

ELENA RADU și OANA ROȘETEANU

572.541.3

Studiul de față se referă la conformația somatică și la fizionomia constituțională a două serii de femei, între 18 și 55 de ani, din comunitatea Peștera — culoarul Bran: seria I (4/4) avînd în ascendență cel puțin trei generații parentale originare din comunitatea respectivă și seria II (3/4, 2/4, 1/4) avînd în ascendență mai puține generații din comunitatea respectivă, dar originare din comunitățile culoarului Bran.

Prezenta lucrare reprezintă o nouă contribuție la definirea antropologică complexă a populațiilor de altitudine din țara noastră, în speță a populațiilor din culoarul Bran.

Au fost prelevate o serie de dimensiuni somatice, în vederea caracterizării somatotipice a unei populații de altitudine și a definirii fizionomiei ei constituționale după metoda antropometrică a prof. Luigi Brian.

Conform acestei metode, s-a apreciat fizionomia constituțională a fiecărui subiect prin cîte o diagnoză sintetică (diagnoză de orientare). Aceste diagnoze s-au repartizat ulterior pe categoriile fizionomiei constituționale propuse de către L. Brian.

## ANALIZA REZULTATELOR

### DIMENSIUNILE CORPULUI ÎNTREG ȘI INDICII CONFORMATIVI

*Statura* prezintă o valoare medie care o situează în categoria supra-mijlocie a scării de clasificare Martin ( $1570,94 \pm 10,23$ ) pentru seria I de femei (4/4), susținută de o repartiție absolută și relativă a categoriei

de staturi mari, relativ predominantă în scara de clasificare Martin, urmată îndeaproape de frecvențele situate în categoria supramijlocie, în timp ce valoarea medie a staturii pentru seria II de femei  $1566,68 \pm \pm 7,50$ ) se încadrează în aceeași categorie supramijlocie, dar la limita sa inferioară, însoțită de o relativă dominare a frecvențelor din aceeași

Tabelul nr. 1

Variabilitatea unor dimensiuni somatice pe seria de femei 4/4 din comunitatea Peștera - culoarul Bran

Dimensiuni somatice	N	Valori extreme	$\bar{X} \pm m$	$\pm \sigma$	V
Statură	36	1466 - 1686	$1570,94 \pm 10,23$	61,38	3,90
Statură șezândă	36	748 - 883	$840,55 \pm 5,57$	33,45	3,97
Suprasternale - plan așezat	36	462 - 577	$535,66 \pm 4,44$	26,68	4,98
Xifoid - plan așezat	36	283 - 433	$380,80 \pm 5,12$	30,75	8,07
Suprasternale - xifoid	36	124 - 187	$153,96 \pm 2,64$	15,89	10,32
Suprasternale - simfizion	36	400 - 510	$470,80 \pm 4,18$	25,10	5,33
Acromion - dactilion	36	640 - 760	$692,80 \pm 5,42$	32,55	4,69
Diametrul biacromial	36	325 - 385	$358,00 \pm 2,74$	16,44	4,59
Diametrul bitrohanterian	36	285 - 371	$321,87 \pm 3,25$	19,55	6,07
Diametrul biiliac	36	238 - 332	$275,53 \pm 3,31$	19,89	7,21
Diametrul transvers toracic	36	225 - 315	$261,99 \pm 3,66$	21,96	8,38
Diametrul antero-posterior toracic	36	164 - 234	$188,16 \pm 2,87$	17,22	9,15
Circumferință toracică	36	740 - 1000	$832,30 \pm 10,79$	64,74	7,77
Greutate	36	42 - 78	$55,20 \pm 1,48$	8,88	16,08
Statură - statură șezândă	36	670 - 828	$732,72 \pm 6,74$	40,48	5,52

Tabelul nr. 2

Variabilitatea unor dimensiuni somatice pe seria de femei de amestec din comunitatea Peștera-culoarul Bran

Dimensiuni somatice	N	Valori extreme	$\bar{X} \pm m$	$\pm \sigma$	V
Statură	41	1475 - 1711	$1566,68 \pm 7,50$	48,00	3,06
Statură șezândă	41	792 - 905	$842,82 \pm 4,07$	26,07	3,09
Suprasternale - plan așezat	41	497 - 597	$545,00 \pm 3,28$	21,00	3,85
Xifoid - plan așezat	41	342 - 454	$390,18 \pm 3,38$	21,67	5,55
Suprasternale - xifoid	41	124 - 187	$153,68 \pm 2,14$	13,72	8,92
Suprasternale - simfizion	41	410 - 520	$475,00 \pm 3,46$	22,20	4,67
Acromion - dactilion	41	630 - 730	$686,20 \pm 3,74$	23,95	3,49
Diametrul biacromial	40	322 - 385	$353,98 \pm 2,22$	14,04	3,96
Diametrul bitrohanterian	40	246 - 365	$321,00 \pm 3,43$	21,75	6,76
Diametrul biiliac	40	225 - 306	$276,56 \pm 2,12$	13,44	4,05
Diametrul transvers toracic	40	225 - 292	$263,15 \pm 2,25$	14,42	5,47
Diametrul antero-posterior toracic	40	166 - 214	$186,40 \pm 1,81$	11,46	6,14
Circumferință toracică	40	720 - 970	$828,25 \pm 7,67$	48,50	5,85
Greutate	40	39 - 75	$55,32 \pm 1,15$	7,32	13,23
Statură - statură șezândă	41	650 - 810	$724,80 \pm 5,37$	34,40	4,74

categorie, cu tendință clară de variabilitate spre straturile mari (tabelul nr. 1, 2 și 4).

Greutatea prezintă nivele valorice foarte apropiate pentru cele două serii de femei, având indici de variabilitate foarte mari, indicatori ai neomogenității seriilor studiate, explicabil și prin determinismul multi-factorial al acesteia (tabelul nr. 1).

*Indicele Rohrer*, considerat ca un indicator al gradului de robustețitate corporală, încadrează cele două serii de femei în categoria eutrofică a scării de clasificare Rohrer, dar spre limita ei inferioară. Pentru seria I de femei, aceasta se susține de o predominanță a aceleiași categorii în

Tabelul nr. 3

Variabilitatea indicilor conformativi somatici pentru seriile de femei din comunitatea Peștera – culoarul Bran

Indici conformativi somatici	N	Valori extreme	$\bar{X} \pm m$	$\pm \sigma$	V
<b>Seria I</b>					
Indicele Rohrer	36	0,90 – 1,90	$1,40 \pm 0,03$	1,19	13,57
Indicele cormic	36	50,50 – 55,50	$53,40 \pm 0,18$	1,12	2,09
Indicele lărgimii umerilor	36	21,00 – 24,50	$22,75 \pm 0,16$	0,98	4,30
Indicele lărgimii bazinului	36	15,00 – 21,00	$17,13 \pm 0,18$	1,13	6,59
Indicele lărgimii coapselor	36	17,00 – 23,00	$19,98 \pm 0,20$	1,23	6,15
Indicele acromio-iliac	36	65,00 – 87,00	$76,84 \pm 0,90$	5,42	7,05
Indicele DAPT/DTT	36	60,00 – 84,00	$72,92 \pm 0,98$	5,92	8,11
Indicele circumferinței toracice	36	47,00 – 58,00	$52,47 \pm 0,52$	3,15	6,00
Indicele înălțimii anterioare a trunchiului	36	26,00 – 32,50	$29,30 \pm 0,21$	1,26	4,30
Indicele de lungime al membrului superior	36	42,00 – 46,50	$43,39 \pm 0,20$	1,22	2,81
Indicele de lungime al membrului inferior	36	43,00 – 49,60	$46,08 \pm 0,21$	1,27	2,75
<b>Seria II</b>					
Indicele Rohrer	40	1,10 – 1,70	$1,41 \pm 0,02$	0,13	9,21
Indicele cormic	40	51,50 – 55,50	$53,32 \pm 0,15$	1,00	1,87
Indicele lărgimii umerilor	40	21,00 – 23,50	$22,58 \pm 0,11$	0,71	3,14
Indicele lărgimii bazinului	40	14,00 – 19,00	$17,12 \pm 0,14$	0,90	5,25
Indicele lărgimii coapselor	40	17,00 – 25,00	$20,17 \pm 0,18$	1,20	5,94
Indicele acromio-iliac	40	65,00 – 87,00	$78,40 \pm 0,61$	3,86	4,92
Indicele DAPT/DTT	40	60,00 – 76,00	$71,40 \pm 0,74$	4,68	6,55
Indicele circumferinței toracice	40	48,00 – 57,00	$52,22 \pm 0,38$	2,41	4,61
Indicele înălțimii anterioare a trunchiului	40	26,00 – 52,00	$29,78 \pm 0,20$	1,27	4,26
Indicele de lungime al membrului superior	40	42,00 – 46,50	$43,55 \pm 0,16$	1,07	2,45
Indicele de lungime al membrului inferior	40	43,00 – 48,00	$45,70 \pm 0,16$	1,05	2,29

repartiția absolută și relativă, în timp ce pentru a doua serie preponderența aparține aproape la paritate categoriilor eutrofică și subeutrofică, tendința generală de variație fiind însă spre supraeutrofie (tabelele nr. 3 și 5).

#### DIMENSIUNILE ȘI INDICIILE CONFORMATIVI AI TRUNCHIULUI

*Statura șezândă* este caracterizată prin valori medii nesemnificativ diferențiate pentru cele două serii de femei, și anume de  $840,55 \pm 5,57$  pentru seria I și de  $842,82 \pm 4,07$  pentru seria II (tabelele nr. 1 și 2).

*Indicele cormic* prezintă valori medii foarte apropiate pentru cele două serii de femei, nesemnificativ diferențiate, și anume de  $53,40 \pm 0,18$  pentru seria I și de  $53,32 \pm 0,15$  pentru cealaltă serie, valori încadrate

în categoria trunchiurilor mijlocii metriocormes a scării de clasificare Giuffrida-Ruggeri.

În ceea ce privește repartitia absolută și relativă a acestui indice în scara Giuffrida-Ruggeri, este consemnată aceeași situație pentru ambele serii de femei, și anume predominanța categoriei mijlocii de trunchiuri metriocormes (tabelul nr. 6).

Tabelul nr. 4

Variabilitatea relativă și absolută a staturii pentru seriile de femei I și II din comunitatea Peștera - culoarul Bran

Scara Martin	Seria I		Seria II	
	N	%	N	%
Foarte mică	×	139,9	—	—
Mică	140	148,9	4	11,11
Submijlocie	149	152,9	5	13,88
Mijlocie	153	155,9	6	16,66
Supramijlocie	156	158,9	9	25,00
Mare	159	167,9	11	30,55
Foarte mare	168	186,9	1	2,77
			1	2,43

Tabelul nr. 5

Variabilitatea relativă și absolută a indicelui Rohrer pentru seriile de femei I și II din comunitatea Peștera - culoarul Bran

Scara Rohrer	Seria I		Seria II	
	N	%	N	%
Hipotrofie	×	1,19	4	11,11
Subeutrofie	1,20	1,34	9	25,00
Eutrofie	1,35	1,54	11	38,88
Supracutrofie	1,55	1,69	7	19,44
Hipertrofie	1,70	×	2	5,55
			2	5,00

Indicele înălțimii anterioare a trunchiului atestă predominanța la paritate a trunchiurilor medii și lungi pentru prima serie de femei și în exclusivitate a trunchiurilor lungi pentru cea de-a doua serie de femei, nivelele medii valorice ale acestui indice situându-se în ambele cazuri la limita superioară a categoriei de trunchiuri mijlocii.

Indicele de lărgime al umerilor indică preponderența categoriei de umeri mijlocii și lați pentru prima serie de femei și a categoriei de umeri mijlocii pentru cea de-a doua, atestate de nivelele valorice medii încadrate spre limita superioară a categoriei mijlocii pentru primul caz și în centrul categoriei respective pentru cel de-al doilea caz.

Indicele de lărgime al bazinului consemnează predominanța bazinelor mijlocii pentru prima serie de femei și a bazinelor largi (tipic feminine) pentru cea de-a doua serie, susținute de nivele valorice medii ale seriilor respective, încadrate în categoria bazinelor mijlocii înspre limita lor superioară.

Tabelul nr. 6

Variabilitatea de valori absolute și relative a unor indici conformativi somatici pentru seriile I și II de femei din comunitatea Peștera - culoarul Bran

Indici conformativi somatici	N		%		N		%		N		%	
Indicele cormic	brahiorcormes pînă la 52,0		metriocormes 52,1-54,0		macrocormes peste 54,1							
	Seria I	5	13,88	20	55,55	11	30,55					
	Seria II	2	5,00	23	57,50	15	37,50					
Indicele de lărgime al umerilor	umeri strîmți pînă la 21,9		umeri mijlocii 22,0-23,0		umeri lați peste 23,1							
	Seria I	9	25,00	13	36,11	14	38,88					
	Seria II	11	27,50	20	50,00	9	22,50					
Indicele de lărgime al bazinului	bazin îngust pînă la 16,4		bazin mijlociu 16,5-17,5		bazin larg peste 17,6							
	Seria I	3	8,33	19	52,77	14	38,88					
	Seria II	3	7,50	16	40,00	21	52,50					
Indicele de lărgime al coapselor	coapse înguste pînă la 17,9		coapse mijlocii 18,0-19,9		coapse largi peste 20,0							
	Seria I	1	2,77	12	33,33	23	63,88					
	Seria II	1	2,50	13	32,50	26	65,00					
Indicele acromioliac	trunchi trapezoid pînă la 69,9		trunchi intermediar 70,0-74,9		trunchi rectangu- lar peste 75,0							
	Seria I	3	8,33	8	22,22	25	69,44					
	Seria II	1	2,50	8	20,00	31	77,50					
Indicele de înălțime anterioară a trunchiului	trunchi scurt pînă la 27,9		trunchi mediu 28,0-29,9		trunchi lung peste 30,0							
	Seria I	2	5,55	17	47,22	17	47,22					
	Seria II	1	2,50	12	30,00	27	67,50					
Indicele perimetrului toracic	torace strîmt pînă la 50,9		torace mediu 51,0-55,9		torace larg peste 56,0							
	Seria I	12	33,33	16	44,44	8	22,22					
	Seria II	11	27,50	24	60,00	5	12,50					
Indicele de lungime al membrului superior	membru superior scurt pînă la 44,9		membru superior mijlociu 45,0-46,9		membru superior lung peste 47,0							
	Seria I	27	75,0	9	25,0	—	—					
	Seria II	36	90,0	4	10,0	—	—					

*Indicele de lărgime al coapselor* înregistrează pentru prima serie de femei o valoare medie situată la limita superioară a categoriei de coapse mijlocii, însoțită de o evidentă preponderență a categoriei de coapse largi, în timp ce pentru următoarea serie valoarea medie a acestui indice se susține net printr-o dominare a categoriei de coapse largi.

Tabelul nr. 7

Repartiția absolută și relativă a femeilor în raport cu tipul constituțional din Feștera – culoarul Bran

Diferențiere	Morfie ±	Tip constituțional	N <sub>I</sub>	%	N <sub>II</sub>	%
Armonici N <sub>I</sub> = 15 = 41,66 % N <sub>II</sub> = 27 = 67,50 %	Megamorfi N <sub>I</sub> = 4 = = 26,66 % N <sub>II</sub> = 12 = = 44,44 %	Paralongilini	1	2,77	4	10,00
		Paramediolini	1	2,77	1	2,50
		Parabrevilini	2	5,55	7	17,50
Disarmonici N <sub>I</sub> = 21 = 58,33 % N <sub>II</sub> = 13 = 32,5 %	Mediomorfi N <sub>I</sub> = 1 = = 6,66 % N <sub>II</sub> = 0	Paralongilini	—	—	—	—
		Paramediolini	1	2,77	—	—
		Parabrevilini	—	—	—	—
	Micromorfi N <sub>I</sub> = 10 = = 66,66 % N <sub>II</sub> = 15 = = 55,55 %	Paralongilini	4	11,11	6	15,00
		Paramediolini	2	5,55	3	7,50
		Parabrevilini	4	11,11	6	15,00
	Megamorfi N <sub>I</sub> = 11 = = 52,38 % N <sub>II</sub> = 6 = = 46,15 %	Dolicotipi	2	5,55	2	5,00
		Mediotipi	3	8,33	1	2,50
		Brahitipi	6	16,66	3	7,50
	Mediomorfi N <sub>I</sub> = 1 = = 6,66 % N <sub>II</sub> = 0	Dolicotipi	1	2,77	—	—
		Mediotipi	—	—	—	—
		Brahitipi	—	—	—	—
	Micromorfi N <sub>I</sub> = 9 = 42,85 % N <sub>II</sub> = 7 = = 53,81 %	Dolicotipi	7	19,44	2	5,00
		Mediotipi	2	5,55	2	5,00
		Brahitipi	—	—	3	7,50

*Indicele acromio-iliac* indică o predominanță atît în ceea ce privește nivelele valorice medii seriale, cît și repartiția absolută și relativă a categoriei de trunchiuri rectangulare, tipic feminine.

*Indicele perimetrului toracic* atestă pentru seriile luate în studiu nivele medii valorice încadrabile în categoria de torace mediu ca dimensionare, spre limita inferioară a categoriei respective, fapt confirmat și de preponderența aceleiași categorii în repartiția absolută și relativă (tabelul nr. 3).

*Indicele de lungime al membrului superior* încadrează ambele serii, atît prin nivelele lor valorice medii, cît și prin repartiția lor în scara de

clasificare respectivă, în categoria de membre superioare scurte (tabelul nr.3).

*Indicele de lungime al membrului inferior prezintă nivele valorice ne semnificativ diferențiate între cele două serii de femei (tabelul nr. 3).*

Tabelul nr. 8

Repartiția absolută și relativă detaliată a femeilor în raport cu cele trei tipuri constituționale principale din Peștera - culoarul Bran

Armonici	Paralongilini (Lo)		Paramediolini		Parabrevilini (Br)	
	N	%	N	%	N	%
N <sub>I</sub> Total	1	6,66	1	6,66	2	13,33
	—	—	1	6,66	—	—
	4	26,66	2	13,33	4	26,66
	5	33,33	4	26,66	6	40,00
N <sub>II</sub> Total	4	14,81	1	3,70	7	25,92
	—	—	—	—	—	—
	6	22,22	3	11,11	6	22,22
	10	37,03	4	14,81	13	48,14
Disarmonici	Dolicotipi (Dol)		Mediotipi		Brahitipi (Bra)	
	N	%	N	%	N	%
N <sub>I</sub> Total	2	9,52	3	14,28	6	28,57
	1	4,76	—	—	—	—
	7	33,33	2	9,52	—	—
	10	47,61	5	23,80	6	28,57
N <sub>II</sub> Total	2	15,38	1	7,69	3	23,07
	—	—	—	—	—	—
	2	15,38	2	15,38	3	23,07
	4	30,76	3	23,07	6	46,14

#### FIZIONOMIA CONSTITUȚIONALĂ

Din datele cuprinse în tabelele nr. 7, 8, 9 și 10 se pun în evidență următoarele aspecte ale tipologiei constituționale a femeilor din comunitatea Peștera :

— pentru prima serie de femei, avînd deci în ascendență trei generații parentale originare din comunitatea respectivă, se consemnează frecvența prioritară a formelor constituționale disarmonice (58,33%) față de cele armonice (41,66%).

— pentru cea de-a doua serie de femei, avînd în ascendență generații incluzînd elemente străine comunității respective, se pune în evidență o dominare netă a formelor armonice (67,50%) față de formele disarmonice, situație total opusă primei serii de femei.

În ceea ce privește masa somatică, se înregistrează următoarele aspecte :

— în cadrul constituțiilor armonice predomină formele micromorfe, în mod mai net pentru prima serie de femei în raport cu cea de-a doua ;

— în cadrul constituțiilor disarmonice predomină categoriile de megamorfi pentru prima serie de femei (52,38 %) și de micromorfi pentru cea de-a doua serie (53,84 %).

În ceea ce privește principalele tipuri constituționale, se constată că pentru constituțiile armonice există o orientare relativ preferențială pentru tipurile breviline pentru ambele serii de femei, în timp ce în cadrul constituțiilor disarmonice pentru prima serie de femei predomină categoria dolicotipi, iar pentru cealaltă serie brahitipi.

În general vorbind, prima serie de femei prezintă o dominanță a formelor înalte și zvelte, categoriile longilini sau dolicotipi (41,66 %), iar cea de-a doua serie o dominanță a formelor brevilingi și brahitipi (47,50 %) deci o tipologie constituțională îndesată.

#### CONCLUZII

Din punctul de vedere al dimensiunilor și al conformației somatice, populația feminină a comunității Peștera se încadrează în tipologia somatică a populațiilor din culoarul Bran.

În ceea ce privește seriile studiate de noi, avînd o ascendență variată, se consemnează o tendință de diferențiere între ele, care poate merge uneori pînă la semnificație, cum este cazul pentru următoarele dimensiuni : diametrul biacromial, trohanterion — sol, circumferință abdomen (semnificativ mai mari pentru seria de femei 4/4) și suprasternale — plan așezat, xifoid — plan așezat, epigastric — sol, circumferință șold și circumferință coapsă (semnificativ mai mare pentru seria cu ascendenți 3/4, 2/4, 1/4).

Din punctul de vedere al fizionomiei constituționale, se remarcă o dominare a constituțiilor longilin-disarmonice pentru prima serie de femei și a constituțiilor breviling-armonice pentru cea de-a doua serie.



Tabellul nr. 9

Grafic general de referință (GG) pentru seria sintetică de femei din Peștera  $\bar{X} = 1569,18; \sigma = 54,78; \text{raport fundamental} = 1,10$

Grade	St	IcTr	IcTo	IcAb	IMi	DAPTo	DTTo	DTAb	PmTo	PmAb
+ 10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
+ 9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
+ 8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
+ 8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
+ 7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
+ 6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
RMa	1734	593	169	424	796	207	392	304	915	775
	1717,5	587,6	167,5	420,1	788,8	205,1	388,4	301,2	906,7	768,0
+ 4	1701,0	582,2	166,0	416,2	781,6	203,2	384,8	294,4	898,4	761,0
	1684,5	576,8	164,5	412,3	774,4	201,3	381,2	295,6	890,1	754,0
+ 3	1668,0	571,4	163,0	408,4	767,2	199,4	377,6	292,8	881,8	747,0
	1651,5	566,0	161,5	404,5	760,0	197,5	374,0	290,0	873,5	740,0
+ 2	1635,0	560,6	160,0	400,6	752,8	195,6	370,4	287,2	865,2	733,0
	1618,5	555,2	158,5	396,7	745,6	193,7	366,8	284,4	856,9	726,0
+ 1	1602,0	549,8	157,0	392,8	738,4	191,8	363,2	281,6	848,6	719,0
	1585,5	544,4	155,5	388,9	731,2	189,9	359,6	278,8	840,3	712,0
BB	1569	539	154	385	724	188	356	276	832	705
	1552,5	533,6	152,5	381,1	716,8	186,1	352,4	273,2	823,7	698,0
- 1	1536,0	528,2	151,0	377,2	709,6	184,2	348,8	270,4	815,4	691,0
	1519,5	522,8	149,5	373,3	702,4	182,3	345,2	267,6	807,1	684,0
- 2	1503,0	517,4	148,0	369,4	695,2	180,4	341,6	264,8	798,8	677,0
	1486,5	512,0	146,5	365,5	688,0	178,5	338,0	262,0	790,5	670,0
- 3	1470,0	506,6	145,0	361,6	680,8	176,6	334,4	259,2	782,2	663,0
	1453,5	501,2	143,5	357,7	673,6	174,7	330,8	256,4	773,9	656,0
- 4	1437,0	495,8	142,0	353,8	666,4	172,8	327,2	253,6	765,6	649,0
	1420,5	490,4	140,5	349,9	659,2	170,9	323,6	250,8	757,3	642,0
RMi	1404	485	139	346	652	169	320	248	749	635
- 6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- 7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- 8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- 9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- 10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ma—Mi	330	108	30	78	144	38	72	56	166	140
Gd	33	10,8	3	7,8	14,4	3,8	7,2	5,6	16,6	14,0
Gd/2	16,5	5,40	1,5	3,9	7,2	1,9	3,6	2,8	8,3	7
Rf	1,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--

— Seria I

..... Seria II



Tabelul nr. 10

Grafic general de referință (GG) pentru seria de femei din Peștera 4/4  $\bar{X}$  = 1570,94;  $\sigma$  = 61,38; raport fundamental = 1,11

Grade	St	IcTr	IcTo	IcAb	IMi	DapTo	DTTo	DtAb	PmTo	PmAb
+ 10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
+ 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
+ 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
+ 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
+ 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>RMa</b>	1754,0	595,0	171,0	423,0	814,0	209,0	397,0	264,0	924,0	787,0
—	1735,7	589,1	169,3	418,8	805,9	206,9	393,1	261,4	914,8	779,2
+ 4	1717,4	583,2	167,6	414,6	797,8	204,8	389,2	258,8	905,6	771,4
—	1699,1	577,3	165,9	410,4	799,7	202,7	385,3	256,2	896,4	863,6
+ 3	1680,8	571,4	164,2	406,2	781,6	200,6	381,4	253,6	887,2	755,8
—	1662,5	565,5	162,5	402,0	773,5	198,5	377,5	251,0	878,0	748,0
+ 2	1644,2	559,6	160,8	397,8	765,4	196,4	373,6	248,4	868,8	740,2
—	1625,9	553,7	159,1	393,6	757,3	194,3	369,7	245,8	859,6	732,4
+ 1	1607,6	547,8	157,4	389,4	749,2	192,2	365,8	243,2	850,4	724,9
—	1589,3	541,9	155,7	385,2	741,1	190,1	361,9	240,6	841,2	716,8
—	1571	536	154	381	733	188	358	258	832	709
<b>BB</b>	1552,7	530,1	152,3	376,8	724,9	185,9	354,1	235,4	822,8	701,2
— 1	1534,4	524,2	150,6	372,6	716,8	183,8	350,2	232,8	813,6	693,1
—	1516,1	518,3	148,9	368,4	708,7	181,7	346,3	230,2	804,4	685,6
— 2	1497,8	512,4	147,2	364,2	700,6	179,6	342,4	227,6	795,2	677,8
—	1479,5	506,5	145,5	360,0	692,5	177,5	338,5	225,0	786,0	670,0
— 3	1461,2	500,6	143,8	355,8	684,4	175,4	334,7	222,4	776,8	662,2
—	1442,9	494,7	142,1	351,6	676,3	173,3	330,6	219,8	767,6	654,1
— 4	1424,6	488,8	140,4	347,4	668,2	171,2	326,8	217,2	758,4	646,6
—	1406,3	482,9	138,7	343,2	660,1	169,1	322,9	214,6	749,2	638,8
<b>RMi</b>	1388,0	477,0	137,0	339,0	652,0	167,0	319,0	212,0	740,0	631,0
— 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— 10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Ma—MI</b>	366	118	34	84	162	42	78	52	181	156
<b>Gd</b>	36,6	11,8	3,4	8,4	16,2	4,2	7,8	5,2	18,4	15,6
<b>Gd/2</b>	18,3	5,9	1,7	4,2	8,1	2,1	3,9	2,6	9,2	7,8



**CONSIDÉRATIONES CONCERNANT LA VARIABILITÉ  
CONFORMATIVE-SOMATIQUE ET CELLE DE LA PHYSIONOMIE  
CONSTITUTIONNELLE DE CERTAINES SÉRIES FÉMININES  
DE LA COMMUNAUTÉ VILLAGEOISE DE PEȘTERA — COULOIR  
DE BRAN**

**RÉSUMÉ**

Le présent travail représente une nouvelle contribution dans le sens de la définition complexe des populations d'altitude de notre pays, à savoir les populations du couloir de Bran.

On a considéré deux séries de femmes, différenciées sous l'aspect de l'origine des ascendants, et on a mis en évidence deux aspects essentiels :

— au point de vue somatique et conformatif, cette population vient s'encadrer dans la typologie somatique des populations du couloir de Bran ayant évidemment une série de particularités ;

— au point de vue de la physionomie constitutionnelle, on constate pour la série des femmes ayant dans leur ascendance au moins trois générations parentales autochtones — de Peștera — une prédominance des constitutions longilignes dysharmoniques, tandis que pour l'autre série — celle ayant dans son ascendance des éléments étrangers à la communauté Peștera — on enregistre une prédominance des constitutions brévillignes harmoniques.

**BIBLIOGRAFIE**

1. BRIAN L., *Tecnica ed applicazione degli antropometrogrammi par delle schede costituzionalistiche individuali*, Arch. per l'Antrop. e la Ethnologia, 1965, **XCV**.
2. NECRASOV O., ROȘCA M.-E., LAZĂR A., PETROVICI O., *Conformația corporală și variabilitatea ei dimorfică la populația din Fundata*, St. cerc. antropol., 1968, **5**, 2, 161—169.
3. OLIVIER G., *Pratique anthropologique*, Masson, Paris, 1960.
4. POP-GRINȚESCU S., VLĂDESCU M., ENĂCHESCU TH., *Fizionomia constituțională a populației din satul Șirnea*, St. cerc. antropol., 1970, **7**, 2, 193—205.
5. POP-GRINȚESCU S., VLĂDESCU M., ENĂCHESCU TH., *Fizionomia constituțională a populației din satul Sohodol*, St. cerc. antropol., 1971, **8**, 2, 165—174.
6. RADU E., SCHMIDT H., *Variabilitatea somatică a populației din satul Șimon*, St. cerc. antropol., 1967, **4**, 1, 48—53.
7. RADU E., VLĂDESCU M., RUDESCU AL., *Considérations sur la variabilité somatique de la population des villages de Șimon et de Moeciuc de Sus*, Ann. roum. Anthropol., 1967, **4**, 53—61.
8. RADU E., *Fizionomia constituțională a seriei de femei din comunitatea Măgura — culoarul Bran*, St. cerc. antropol., 1972, **9**, 2, 145—149.
9. RADU E., ROȘTEANU O., *Considerații preliminare asupra variabilității conformativ-somatice a unei serii de femei din comunitatea Măgura — culoarul Bran*, St. cerc. antropol., 1972, **9**, 1.

*Centrul de cercetări antropologice  
București*

Primit în redacție la 9 februarie 1974



# STUDIUL ANTROPOLOGIC AL UNEI POPULAȚII GERMANE DIN MUNȚII BANATULUI

DE

HORST SCHMIDT

572.5

Cu aproape un secol și jumătate în urmă, mai bine zis în anul 1827, în Banat, aflat atunci sub ocupația Imperiului austriac, au fost aduse, în vederea exploatării fondului forestier, primele familii din Boenuia și localizate în zona Munților Banatului: cehi care au format sate atât la Dunăre, cât și în Munții Almăjului și germani colonizați în Masivul Semenic. Au pornit de la Viena, pe Dunăre, pînă în apropierea orașului iugoslav Bela Crkva și au continuat drumul cu căruțele peste munți pe la Șopot, Bozovici, Teregova spre Valea Timișului. În apropiere de Slatina Timiș, unde întregul grup de coloniști își făcuse adăpost peste iarna anului 1827/1828, o parte din ei au rămas definitiv, fundînd satul Sadova Veche. Restul grupului a fost repartizat spre locurile anume amenajate la poalele Semenicului, fundînd patru sate. Din cauza lipsurilor și a nemulțumirilor inițiale, după numai 5 ani cele patru sate au fost părăsite, populația răsfirîndu-se prin satele din Cîmpia Banatului. Aici însă, datorită unor puternice epidemii, o parte din această populație s-a reîntors la satele părăsite cu un an în urmă. Numai satul Wolfswiese, din cauza climatului aspru și a lipsei de apă, nu a mai fost reînființat. Celelalte trei sate, și anume Brebu Nou, Gărina și Lindenfeld, fac obiectul articolului de față.

Brebu Nou, cel mai mare dintre ele, cu o populație de peste 1 000 de locuitori, se află așezat la o altitudine de 884 m la confluența celor trei izvoare ale Timișului. În apropiere, la o altitudine ceva mai mare (955 m) se află al doilea sat ca mărime, și anume Gărina (circa 900 locuitori). Lindenfeld (798 m), cel mai mic (sub 200 locuitori), este așezat departe de celelalte două și legat de acestea doar prin poteci anevoioase de parcurs, care deseori iarna sînt impracticabile. De aceea, din punct de vedere economic, satul Lindenfeld este legat de satele românești Poiana și Buchin, de care aparține de fapt din punct de vedere administrativ. În ceea ce privește arealul de căsătorie, situația se prezintă cu totul altfel.

Faptul că această populație este de religie catolică și vorbește limba germană a făcut, ca în trecut, arealul de căsătorie să fie limitat, deosebindu-se din acest punct de vedere două izolate: unul mai mare, format din satele Brebu Nou și Gărîna, și altul foarte mic, Lindenfeld. Între cele două izolate delimitate printr-o graniță geografică, cazurile de căsătorie sînt rare. Datorită acestor cauze și numărului mic de locuitori, în satul Lindenfeld aria alegerii partenerului era extrem de limitată, de-a lungul generațiilor producîndu-se căsătorii între rude mai apropiate sau îndepărtate, ceea ce a făcut ca indicele de consangvinitate a acestei populații să crească continuu. Aceasta, probabil, este și cauza unor fenomene mai deosebite din cadrul populației respective, fenomene de care ne vom ocupa însă într-o lucrare viitoare.

În ultimul timp, datorită modernizării unor căi de acces, dar mai ales prin crearea unor noi locuri de muncă și prin integrarea acestei populații în procesul de industrializare a țării, asistăm la un proces de spargere treptată a acestor izolate.

Majoritatea bărbaților din satele Brebu Nou și Gărîna lucrează în cadrul întreprinderilor siderurgice din Reșița, iar cei din Lindenfeld la fabrica de mobilă din Caransebeș. Puțini sînt cei ce lucrează la exploatarea forestieră. Femeile sînt casnice.

Am considerat util acest studiu pentru cunoașterea fondului biologic al acestei populații încă înainte de a se produce amestecul caracteristic epocii noastre. De aceea, studiul izolatelor umane, acolo unde ele mai există, constituie o urgență de prim ordin, știind că într-un viitor apropiat ele vor dispărea.

#### MATERIAL ȘI METODĂ

Au fost studiați doar indivizii între 20 și 50 de ani și care de cel puțin trei generații erau din satul respectiv, încercîndu-se astfel crearea unor loturi specifice fiecărui sat pentru a se putea surprinde posibilele linii evolutive independente. Loturile au fost alcătuite în satul Gărîna din 81 bărbați și 87 femei, în satul Brebu Nou din 94 bărbați și 88 femei, iar în satul Lindenfeld, datorită numărului mic de locuitori, din 40 bărbați și 39 femei.

S-au făcut testele de semnificație (T) pentru fiecare caracter în parte, comparîndu-se satele două cite două. Rezultatele sînt redade în figurile 1, 2 și 3. În aceste figuri, ordinea celor 40 de caractere este aceeași ca și în tabelele nr. 1—4, adică se începe cu g—op și se continuă cu restul măsurătorilor masivului cefalo-facial, urmînd apoi indicii respectivi. După linia de demarcație centrală sînt plasate în continuare măsurătorile corporale și indicii corporali. De la valorile de 1,97, 2,60 și 3,33 încep deosebirile semnificative cu o probabilitate de eroare de 5, 1 și, respectiv, 0,1 %.

#### REZULTATE

**Calota cefalică.** În afară de t—v, întreaga calotă se înscrie în limita categoriei mari. Astfel g—op este incipient lung, distanța dintre euri-oane este mare, iar fruntea este largă, la bărbați chiar spre foarte largă (tabelele nr. 1 și 2). În ceea ce privește înălțimea calotei, majoritatea



valorilor cad în categoria medie, la femei însă spre limita superioară a acesteia. Indicele cefalic ne indică în general o brahicefalie spre hiperbrahicefalie. Calotele se caracterizează și printr-o hipsicefalie moderată, precum și prin tapeinocefalie. Indicele fronto-parietal se clasează cu o mare frecvență în categoria eurimetopă. Caracterele ectoscopice ale calotei se referă la forma occipitalului, care cel mai adesea este mijlociu de bombat, uneori însă și bombat (în special la bărbați).

**Caracterele masivului facial.** Populația se caracterizează prin fețe lungi și mijlociu de late. Astfel dimensiunile masivului facial propriu-zis (n—sto) este în majoritate foarte înalt. Înaltă, uneori chiar foarte înaltă, este și distanța dintre nasion și gnation. Atît distanța bigonică, cît și cea bizigomatică se încadrează în partea superioară a categoriei mijlocii. Avînd în vedere aceste dimensiuni, majoritatea fețelor vor fi leptoprosope, fiind urmate de cele mezo- și hiperleptoprosope. Atît indicele jugomandibular, cît și cel fronto-jugal se repartizează majoritar în categoria medie.

Lățimea nasului este mijlocie sau îngustă, distanța dintre nasion și subnazale fiind aproape întotdeauna lungă sau foarte lungă. Astfel și indicele nazal indică în cele mai multe cazuri un nas îngust, uneori foarte îngust sau, din contră, mijlociu.

**Caracterele somatoscopice** (tabelul nr. 5). Conturul facial la bărbați este în majoritate dreptunghiular sau oval; la femei predomină forma ovală, urmată de cea dreptunghiulară. Fanta palpebrală are o deschidere medie, mai rar îngustă, orientarea ei fiind mijlocie, uneori oblică. Forma buzei dermice superioare, văzută din profil, este dreaptă sau concavă; văzută din față, este concavă și dreaptă la femei și convexă la bărbați. Malarele au o orientare medie, uneori frontală, fiind mijlociu de reliefate. Bărbia are o poziție intermediară; mentonul este conturat la bărbați și mijlociu de conturat la femei, arcul mandibular fiind mijlociu de oblic, adesea chiar oblic. Regiunea nazală se caracterizează la bărbați printr-un profil drept, uneori convex sau ondulat, un septum orizontal, o rădăcină mijlocie sau îngustă, așezată înalt față de ochi și intermediar față de frunte. La femei profilul este în genere drept, septumul orizontal sau ascendent, rădăcina putînd fi lată, mijlocie sau îngustă și avînd o poziție înaltă sau mijlocie față de ochi și față de frunte.

**Pigmentația.** Predomină masiv ochii de culoare deschisă, în special cei albaștri, atingînd proporții în jur de 45%. Excepție fac doar femeile de la Lindenfeld, la care predomină culorile cenușie și verde. Și în culoarea părului se observă un anumit grad de depigmentare. Deși predomină culorile brune, totuși frecvența părului blond sau castaniu trece de 30%.

**Măsurători și indici corporali** (tabelele nr. 3 și 4). În satele Brebu Nou și Gârîna staturile sînt preponderent mari, însă cu destule cazuri în care pot oscila între categoria supra- și submijlocie. Indicele Rohrer se plasează majoritar în categoria eutrofă cu tendințe spre subeutrofie (în special la bărbați). Trunchiul raportat la statură este metriocorm, adesea și macrocorm. Raportați la statură, la ambele sexe umerii sînt relativ largi, bazinele relativ înguste, toracele fiind în general mijlociu de dezvoltat.

Tabelul nr. 1

## Variabilitatea dimensiunilor cefalei și a masivului facial

Caracterul	Satul	♂					♀				
		ampli- tudină	M	m	$\sigma$	v	ampli- tudină	M	m	$\sigma$	v
g — op	Gârlna	174—202	187,0	0,67	6,07	3,23	167—191	178,8	0,63	5,89	3,29
	Brebu Nou	176—204	186,6	0,62	6,06	3,25	167—193	177,6	0,60	5,64	3,18
	Lindenfeld	179—194	187,4	0,73	4,60	3,45	167—188	177,9	0,76	4,73	2,66
eu — eu	Gârlna	147—167	157,5	0,48	4,33	2,75	140—163	152,1	0,53	4,94	3,25
	Brebu Nou	148—166	158,6	0,47	4,54	2,86	142—163	153,5	0,46	4,30	2,81
	Lindenfeld	147—168	158,2	0,88	5,54	3,50	144—164	152,5	0,73	4,48	2,93
ft — ft	Gârlna	97—127	113,0	0,74	6,68	5,91	99—127	107,8	0,61	5,65	5,24
	Brebu Nou	99—128	112,2	0,71	6,94	6,19	96—120	108,2	0,59	5,53	5,11
	Lindenfeld	97—123	110,4	0,89	5,64	5,11	99—124	108,7	0,81	5,06	4,65
zy — zy	Gârlna	131—155	142,7	0,55	4,91	3,44	121—147	133,8	0,55	5,15	3,84
	Brebu Nou	131—157	142,5	0,59	5,72	4,01	127—149	135,2	0,44	4,13	3,05
	Lindenfeld	133—153	142,8	0,78	4,96	3,47	125—149	136,0	0,92	5,77	4,24
go — go	Gârlna	97—120	109,4	0,55	4,97	4,54	86—111	100,9	0,54	5,07	5,02
	Brebu Nou	95—120	109,1	0,62	6,03	5,53	92—117	102,1	0,51	4,74	4,64
	Lindenfeld	101—124	109,5	0,73	4,60	4,20	91—113	103,3	0,94	5,86	5,67

n – gn	Gârlna	108 – 139	126,9	0,75	6,79	5,35	104 – 137	115,5	0,67	6,22	5,38
	Brebu Nou	103 – 146	127,2	0,72	7,02	5,51	107 – 131	117,7	0,59	5,47	4,64
	Lindenfeld	114 – 139	126,9	1,00	6,30	4,97	102 – 135	117,3	1,12	6,65	5,67
n – sto	Gârlna	70 – 87	78,3	0,55	4,77	6,10	60 – 81	71,9	0,45	4,16	5,78
	Brebu Nou	63 – 87	79,3	0,46	4,46	5,63	64 – 87	73,7	0,42	3,93	5,32
	Lindenfeld	70 – 90	79,2	0,75	4,74	5,98	65 – 85	73,4	0,60	3,54	4,82
n – sn	Gârlna	50 – 64	56,9	0,44	3,95	6,94	47 – 60	53,5	0,36	3,33	6,23
	Brebu Nou	46 – 66	57,3	0,44	4,24	7,39	42 – 62	54,2	0,41	3,84	7,09
	Lindenfeld	49 – 65	57,3	0,65	4,11	7,17	47 – 61	53,5	0,51	3,19	5,97
al – al	Gârlna	27 – 41	33,7	0,33	3,00	8,91	22 – 38	31,5	0,30	2,77	8,79
	Brebu Nou	29 – 41	33,3	0,26	2,50	7,48	27 – 36	31,3	0,23	2,13	6,80
	Lindenfeld	30 – 39	34,3	0,45	2,84	8,27	27 – 39	32,1	0,45	2,81	8,75
t – v	Gârlna	108 – 136	120,7	0,54	4,86	4,02	105 – 126	117,2	0,50	4,66	3,97
	Brebu Nou	113 – 137	122,8	0,47	4,56	3,71	109 – 129	118,7	0,45	4,21	3,55
	Lindenfeld	115 – 133	122,1	0,63	3,99	3,26	108 – 128	117,3	0,77	4,79	4,08
Lungime ureche	Gârlna	55 – 74	63,9	0,47	4,23	6,62	51 – 70	59,2	0,34	3,20	5,39
	Brebu Nou	66 – 74	65,2	0,37	3,62	5,55	50 – 73	59,4	0,39	3,63	6,10
	Lindenfeld	51 – 71	63,0	0,64	4,06	6,44	49 – 67	58,5	0,62	3,85	6,58
Lățime ureche	Gârlna	30 – 46	36,6	0,37	3,30	9,03	28 – 39	32,9	0,26	2,47	7,50
	Brebu Nou	31 – 58	37,7	0,54	5,29	14,02	30 – 39	32,9	0,26	2,41	7,32
	Lindenfeld	30 – 41	34,5	0,38	2,39	6,93	25 – 36	31,7	0,48	3,00	9,48

Tabelul nr. 2

## Variabilitatea indicilor cefalo-faciali

Caracterul	Satul	♂					♀				
		amplitudine	M	m	$\sigma$	v	amplitudine	M	m	$\sigma$	v
eu - eu	Gârlna	77,6-94,5	84,0	0,35	3,15	3,75	77,5-94,5	85,2	0,34	3,20	3,76
g - op	Brebu Nou	77,5-91,0	85,0	0,30	2,90	3,41	80,1-92,4	86,4	0,34	3,16	3,66
	Lindenfeld	75,7-89,3	84,4	0,58	3,70	4,38	80,2-91,4	85,8	0,43	2,69	3,13
t - v	Gârlna	57,4-70,1	64,3	0,28	2,56	3,98	57,5-72,6	65,6	0,30	2,80	4,27
g - op	Brebu Nou	57,6-74,2	65,8	0,27	2,67	4,05	62,4-75,0	66,9	0,29	2,68	4,01
	Lindenfeld	59,3-69,1	65,1	0,38	2,38	3,66	60,3-72,1	65,9	0,44	2,75	4,17
t - v	Gârlna	60,8-83,3	76,7	0,33	2,99	3,90	68,9-83,3	77,1	0,31	2,87	3,72
eu - eu	Brebu Nou	71,1-83,7	77,5	0,30	2,91	3,76	71,0-82,6	77,5	0,28	2,62	3,38
	Lindenfeld	72,6-88,6	77,2	0,52	3,28	4,25	71,5-82,3	76,8	0,47	2,88	3,76
ft - ft	Gârlna	62,2-83,0	71,8	0,47	4,20	5,86	63,6-81,4	70,9	0,39	3,62	5,10
eu - eu	Brebu Nou	64,3-79,3	70,6	0,42	4,00	5,66	65,2-78,2	70,6	0,36	3,36	4,76
	Lindenfeld	62,6-74,8	69,7	0,45	2,86	4,10	65,2-78,4	71,6	0,52	3,23	4,52
ft - ft	Gârlna	70,2-87,4	79,2	0,46	4,15	5,25	72,7-74,8	80,6	0,42	3,96	4,92
zy - zy	Brebu Nou	69,4-92,4	78,8	0,51	4,94	6,27	73,3-90,2	80,1	0,43	4,09	5,10
	Lindenfeld	69,7-83,1	77,3	0,50	3,19	4,13	73,3-86,4	79,9	0,47	2,96	3,70
go - go	Gârlna	69,2-85,6	76,7	0,38	3,46	4,51	68,6-81,3	75,4	0,25	2,37	3,14
zy - zy	Brebu Nou	70,3-85,4	76,6	0,36	3,50	4,58	66,7-82,0	75,5	0,33	3,11	4,11
	Lindenfeld	69,1-85,5	76,7	0,53	3,36	4,38	69,4-81,0	75,9	0,45	2,79	3,68
n - gn	Gârlna	71,5-101,4	88,9	0,57	5,14	5,78	78,2-97,7	86,3	0,48	4,41	5,11
zy - zy	Brebu Nou	72,5-104,6	89,4	0,55	5,33	5,96	75,8-96,9	87,1	0,45	4,16	4,78
	Lindenfeld	79,3-99,2	88,9	0,83	5,28	5,94	76,6-98,4	85,5	0,85	4,86	5,69
n - sto	Gârlna	47,0-63,7	54,8	0,39	3,50	6,40	46,2-62,0	53,8	0,34	3,14	5,84
zy - zy	Brebu Nou	44,4-65,2	55,7	0,36	3,45	6,20	46,3-64,2	55,0	0,47	4,34	7,90
	Lindenfeld	48,6-64,7	55,5	0,57	3,60	6,49	48,8-63,2	54,0	0,53	3,11	5,77
al - al	Gârlna	44,3-74,1	59,4	0,70	6,26	10,55	43,1-70,8	59,1	0,63	5,88	9,95
n - sn	Brebu Nou	46,2-69,5	58,4	0,56	5,39	9,23	46,6-71,4	58,2	0,58	5,43	9,34
	Lindenfeld	47,6-73,4	60,1	1,01	6,40	10,65	45,9-73,0	60,3	0,95	5,94	9,86
Indice ureche	Gârlna	47,1-65,7	57,3	0,50	4,46	7,78	42,9-67,2	55,6	0,49	4,55	8,20
	Brebu Nou	48,6-88,7	57,9	0,83	8,03	13,86	46,9-64,9	5,53	0,40	3,72	6,73
	Lindenfeld	47,6-63,0	55,0	0,57	3,62	6,57	43,8-65,4	54,1	0,81	5,08	9,37

Tabelul nr. 3

## Variabilitatea principalelor măsurători corporale

Caracterul	Satul	♂					♀				
		amplitudine	M	m	$\sigma$	v	amplitudine	M	m	$\sigma$	v
Statura	Gârlna	1536-1813	1694,9	6,88	61,55	3,63	1423-1777	1585,6	6,61	61,32	3,87
	Brebu Nou	1566-1865	1697,1	6,34	60,79	3,58	1453-1695	1582,2	5,47	51,28	3,24
	Lindenfeld	1567-1742	1670,5	8,28	52,40	3,14	1430-1699	1558,7	11,16	68,78	4,41
Şezlnnda	Gârlna	807- 981	898,3	3,47	31,06	3,46	777- 928	852,6	3,37	31,28	3,67
	Brebu Nou	841- 954	897,2	3,34	32,07	3,57	775- 910	846,1	2,72	25,52	3,02
	Lindenfeld	829- 958	881,8	4,59	29,06	3,30	764- 901	838,3	5,55	34,66	4,13
Greutatea	Gârlna	50- 83	67,1	0,93	8,18	12,20	38- 100	39,4	1,15	10,70	18,02
	Brebu Nou	50- 105	68,4	1,12	10,85	15,86	42- 89	61,1	1,09	10,19	16,69
	Lindenfeld	49- 83	65,2	1,56	9,84	15,10	47- 86	66,6	1,75	10,93	16,42
a - a	Gârlna	351- 436	391,7	1,90	17,15	4,38	323- 395	360,0	1,75	16,32	4,53
	Brebu Nou	333- 443	393,2	2,20	21,19	5,39	327- 399	361,9	1,88	17,64	4,87
	Lindenfeld	352- 428	392,9	2,43	15,37	3,91	323- 396	364,5	2,37	14,80	4,06
h - h	Gârlna	400- 482	436,1	2,10	18,83	4,32	359- 475	403,7	2,48	23,10	5,72
	Brebu Nou	349- 497	435,9	2,88	27,82	6,38	318- 497	408,8	2,93	27,47	6,72
	Lindenfeld	399- 499	438,2	3,73	23,27	5,31	379- 466	421,4	3,90	24,34	5,78
ic - ic	Gârlna	238- 319	282,9	1,84	16,34	5,79	238- 363	279,8	2,28	21,28	7,60
	Brebu Nou	242- 321	281,2	2,10	20,22	7,17	241- 327	279,0	2,15	20,07	7,19
	Lindenfeld	252- 317	282,2	2,22	14,06	4,98	246- 364	294,0	4,51	26,92	9,16
tro - tro	Gârlna	290- 372	326,9	1,81	16,02	4,90	283- 393	330,3	2,32	21,60	6,54
	Brebu Nou	280- 373	326,3	1,88	18,14	5,56	301- 400	333,7	2,37	22,24	6,66
	Lindenfeld	305- 399	329,8	2,88	18,22	5,52	309- 395	344,5	4,10	25,27	7,33
Circumfe- rință torace	Gârlna	830-1090	934,5	5,57	49,51	5,30	700-1098	858,9	7,23	67,7	7,88
	Brebu Nou	800-1171	929,2	7,50	72,31	7,78	773-1055	871,4	6,97	64,6	7,42
	Lindenfeld	830-1080	942,5	10,24	64,77	6,87	795-1055	911,0	11,21	69,1	7,58
Circumfe- rință şold	Gârlna	818-1050	923,0	6,10	33,91	5,84	820-1230	957,6	8,17	75,75	7,91
	Brebu Nou	815-1060	916,8	5,91	56,72	6,19	850-1170	963,6	8,34	77,36	8,03
	Lindenfeld	815-1060	916,2	9,74	60,81	6,64	870-1252	1033,0	15,88	99,18	9,60
Circumfe- rință coapsă	Gârlna	410- 580	505,7	4,37	38,84	7,68	430- 642	539,9	5,38	49,87	9,24
	Brebu Nou	415- 589	502,8	4,77	45,49	9,05	460- 690	553,2	7,08	66,03	11,94
	Lindenfeld	420- 620	507,3	8,88	55,45	10,93	440- 729	595,4	10,75	67,16	11,28

Tabelul nr. 4

## Variabilitatea indicilor corporali

Caracterul	Satul	♂					♀				
		amplitudine	M	m	$\sigma$	v	amplitudine	M	m	$\sigma$	v
Indice cormic	Gârlna	49,6--55,2	53,0	0,15	1,39	2,62	51,2--56,8	53,8	0,13	1,22	2,27
	Brebu Nou	50,4--56,3	52,9	0,13	1,28	2,43	51,0--55,7	53,5	0,12	1,16	2,17
	Lindenfeld	50,3--54,9	52,8	0,18	1,17	2,21	50,3--56,4	53,8	0,23	1,11	2,62
Indice Rohrer	Gârlna	1,11--1,97	1,38	0,02	0,16	11,89	1,12--2,45	1,49	0,03	0,23	15,45
	Brebu Nou	0,95--1,91	1,40	0,02	0,20	14,55	1,18--2,07	1,52	0,02	0,22	14,29
	Lindenfeld	1,03--2,05	1,39	0,03	0,18	13,27	1,10--2,44	1,74	0,05	0,31	18,16
a - a Statură	Gârlna	21,1--24,9	23,1	0,09	0,84	3,63	20,2--34,6	22,7	0,09	0,86	3,80
	Brebu Nou	20,2--26,0	23,2	0,12	1,13	4,90	21,1--25,1	22,9	0,10	0,93	4,07
	Lindenfeld	20,5--25,6	23,5	0,17	1,08	4,60	21,3--26,7	23,4	0,16	1,02	4,37
ic - ic Statură	Gârlna	14,1--18,6	16,7	0,10	0,88	5,27	15,1--22,7	17,6	0,13	1,22	6,90
	Brebu Nou	14,9--20,4	16,6	0,10	1,00	6,02	15,3--21,3	17,6	0,13	1,25	7,06
	Lindenfeld	15,6--18,2	16,9	0,13	0,81	4,81	15,6--22,4	18,8	0,28	1,71	9,10
ic - ic a - a	Gârlna	62,6--79,9	72,1	0,46	4,08	5,65	68,1--92,1	77,7	0,54	5,05	6,49
	Brebu Nou	62,5--85,7	71,6	0,44	4,25	5,94	64,4--90,8	77,0	0,54	5,02	6,52
	Lindenfeld	64,2--86,1	71,9	0,66	4,19	5,83	67,1--96,6	81,2	1,16	7,15	8,81
Circumferință torace Statură	Gârlna	47,7--66,2	55,2	0,36	3,21	5,81	46,9--68,5	54,2	0,43	3,96	7,30
	Brebu Nou	45,5--62,1	54,6	0,41	3,95	7,22	47,1--66,3	55,1	0,44	4,12	7,48
	Lindenfeld	49,0--65,8	56,4	0,59	3,71	6,57	48,0--72,3	58,2	0,80	4,90	8,42
Circumferință șold Statură	Gârlna	49,0--65,6	54,4	0,34	2,96	5,45	51,2--76,8	60,2	0,51	4,72	7,84
	Brebu Nou	47,9--62,0	54,1	0,33	3,17	5,87	53,3--57,5	60,9	0,53	4,89	8,02
	Lindenfeld	49,8--65,7	54,8	0,50	3,15	5,76	53,7--81,9	65,8	1,11	6,73	10,22
Circumferință coapsă Statură	Gârlna	25,0--35,7	29,8	0,25	2,25	7,54	28,1--39,7	34,0	0,32	3,00	8,82
	Brebu Nou	24,5--34,8	29,6	0,28	2,69	9,08	29,3--42,9	34,7	0,35	3,27	9,41
	Lindenfeld	24,1--38,5	30,3	0,49	3,09	10,18	27,6--45,3	38,1	0,74	4,54	11,90

Tabelul nr. 5

## Repartiția procentuală a caracterelor somatoscopice

Caracterul	Satul	Sexul	N	%	N	%	N	%	N	%
Occipital	Gârina	♂ ♀	plat		mijlociu		bombat			
			5	6,2	39	48,8	36	45,0		
	Brebu Nou	♂ ♀	1	1,2	52	64,2	28	34,6		
			4	4,3	51	54,8	38	40,9		
	Lindenfeld	♂ ♀	6	7,0	54	62,8	26	30,2		
			—	—	25	62,5	15	37,5		
			2	5,0	32	80,0	6	16,0		
Poziția rădăcinii nasului față de frunte	Gârina	♂ ♀	înaltă		mijlocie		joasă			
			23	28,8	43	53,7	14	17,5		
	Brebu Nou	♂ ♀	44	50,6	40	46,0	3	3,4		
			31	33,0	45	47,9	18	19,1		
	Lindenfeld	♂ ♀	43	48,9	40	45,4	5	5,7		
			6	15,0	25	62,5	9	22,5		
			12	30,0	21	52,5	7	17,5		
Poziția rădăcinii nasului față de unghiul intern al ochiului	Gârina	♂ ♀	înaltă		mijlocie		joasă			
			42	52,5	29	36,3	9	11,2		
	Brebu Nou	♂ ♀	29	33,3	48	55,2	10	11,5		
			66	70,2	22	23,4	16	6,4		
	Lindenfeld	♂ ♀	35	39,8	41	46,6	12	13,6		
			12	30,0	24	60,0	4	10,0		
			11	27,5	23	57,5	6	15,0		
Lățimea rădăcinii nasului	Gârina	♂ ♀	îngustă		mijlocie		lată			
			31	38,8	32	40,0	17	21,2		
	Brebu Nou	♂ ♀	15	17,2	31	35,7	41	47,1		
			37	39,4	32	34,0	25	26,6		
	Lindenfeld	♂ ♀	29	33,0	29	33,0	30	34,0		
			10	25,0	18	45,0	12	30,0		
			5	12,5	16	40,0	19	47,5		
Profilul nasului	Gârina	♂ ♀	convex		drept		concau		ondulat	
			20	25,0	37	46,3	8	10,0	15	18,7
	Brebu Nou	♂ ♀	9	10,3	43	49,5	24	27,6	11	12,6
			30	31,9	39	41,5	5	5,3	20	21,3
	Lindenfeld	♂ ♀	19	21,6	35	39,8	16	18,2	18	20,4
			12	30,0	15	37,5	6	15,0	7	17,5
			7	17,5	14	35,0	9	22,5	10	25,0

Tabelul nr. 5 (continuare)

Caracterul	Satul	Sexul	N	%	N	%	N	%
Orientarea septumului nazal	Gărina	♂ ♀	descendent		orizontal		ascendent	
			16	20,0	44	55,0	20	25,0
	Brebu Nou	♂ ♀	14	16,5	39	45,9	32	37,6
			18	19,1	54	57,5	22	23,4
	Lindendorf	♂ ♀	10	11,1	43	48,8	35	39,8
			9	22,5	24	60,0	7	17,5
Deschiderea fantei palpebrale	Gărina	♂ ♀	îngustă		mîlocie		largă	
			11	27,5	20	50,0	9	11,2
	Brebu Nou	♂ ♀	28	35,0	43	53,8	19	21,8
			8	9,2	60	69,0	19	21,8
	Lindendorf	♂ ♀	20	21,3	55	58,5	19	20,2
			17	19,3	55	62,5	16	18,2
Orientarea fantei palpebrale	Gărina	♂ ♀	oblică		mijlocie		orizontală	
			13	32,5	19	47,5	8	20,0
	Brebu Nou	♂ ♀	13	32,5	22	55,0	5	12,5
			26	32,5	41	51,3	13	16,2
	Lindendorf	♂ ♀	39	44,8	38	43,7	10	11,5
			21	22,3	45	47,9	28	29,8
Relief mare	Gărina	♂ ♀	proeminent		mijlociu		șters	
			34	38,7	39	44,3	15	17,0
	Brebu Nou	♂ ♀	12	30,0	21	52,5	5	17,5
			17	42,5	16	40,0	7	17,5
	Lindendorf	♂ ♀	8	10,0	56	70,0	16	20,0
			27	31,0	54	62,1	6	6,9
Orientare mare	Gărina	♂ ♀	frontală		mijlocie		temporală	
			1	12,8	63	67,0	19	20,2
	Brebu Nou	♂ ♀	2	29,5	58	65,9	4	4,6
			8	20,0	22	55,0	10	25,0
	Lindendorf	♂ ♀	8	20,0	—	—	32	80,0
			13	16,2	55	68,8	12	15,0
Forma buzei dermice superioare (din profil)	Gărina	♂ ♀	convexă		dreaptă		concavă	
			28	32,2	56	64,4	3	3,4
	Brebu Nou	♂ ♀	19	20,0	70	74,5	5	5,3
			39	44,3	48	54,6	1	1,1
	Lindendorf	♂ ♀	10	25,0	25	62,5	5	12,5
			13	32,5	27	67,5	—	—
Forma buzei dermice superioare (din profil)	Gărina	♂ ♀	convexă		dreaptă		concavă	
			7	8,8	39	48,7	31	42,5
	Brebu Nou	♂ ♀	7	8,1	42	48,9	37	43,0
			9	9,5	54	57,5	31	33,0
	Lindendorf	♂ ♀	7	7,9	46	52,3	35	39,8
			9	22,5	26	65,0	5	12,5
Lindendorf	♂ ♀	2	5,0	23	57,5	15	37,5	



Tabloul nr. 5 (continuare)

Caracterul	Satul	Sexul	N	%	N	%	N	%
Forma buzei dermice superioare (din față)	Gârlna	♂ ♀	convexă		dreaptă		concavă	
			43	53,8	24	30,0	13	16,2
	Brebunou	♂ ♀	15	17,6	31	36,5	39	45,9
			52	55,3	32	34,0	10	10,7
	Lindenfeld	♂ ♀	22	25,9	35	41,2	28	32,9
			16	41,0	16	41,0	7	18,0
			10	26,3	13	34,2	15	39,5
Poziția bărbiei	Gârlna	♂ ♀	retrasă		mijlocie		prominentă	
			16	20,0	61	76,2	3	3,8
	Brebunou	♂ ♀	8	9,3	77	89,5	1	1,2
			17	18,1	70	74,5	7	7,4
	Lindenfeld	♂ ♀	8	9,1	78	88,6	2	2,3
			6	15,0	31	77,5	3	7,5
		3	7,5	35	87,5	2	5,0	
Conturul mentonului	Gârlna	♂ ♀	șters		mijlociu		conturat	
			13	16,2	25	31,3	42	52,5
	Brebunou	♂ ♀	21	24,4	37	43,0	28	32,6
			6	6,4	25	26,6	63	67,0
	Lindenfeld	♂ ♀	16	18,2	44	50,0	28	31,8
			4	10,0	15	37,5	21	52,5
		8	20,0	18	45,0	14	35,0	
Oblicitatea arcului mandibular	Gârlna	♂ ♀	oblică		mijlocie		orizontală	
			44	55,0	33	41,2	3	3,8
	Brebunou	♂ ♀	32	37,2	42	48,8	12	14,0
			42	44,7	48	51,1	4	4,2
	Lindenfeld	♂ ♀	28	31,8	53	60,3	7	7,9
			20	50,0	19	47,5	1	2,5
		9	22,5	29	72,5	2	5,0	
Conturul feței	Gârlna	♂ ♀	dreptunghi		oval		pătrat	
			39	48,7	25	31,2	7	8,8
	Brebunou	♂ ♀	13	15,1	48	55,8	14	16,3
			51	54,3	21	22,3	5	5,3
	Lindenfeld	♂ ♀	20	22,7	39	44,3	15	17,0
			21	52,5	10	25,0	1	2,5
			11	27,5	13	32,5	10	25,0
	Gârlna	♂ ♀	romb		pentagon		rotund	
			2	2,5	7	8,8	—	—
	Brebunou	♂ ♀	3	3,5	1	1,2	7	8,1
			4	4,2	12	12,8	1	1,1
	Lindenfeld	♂ ♀	4	4,6	—	—	10	11,4
4			10,0	3	7,5	1	2,5	
		—	—	2	5,0	4	10,0	

Tabelul nr. 6

## Repartiția procentuală a culorii irisului

Culoarea	Gărina				Brebu Nou				Lindenfeld			
	♂		♀		♂		♀		♂		♀	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Deschisă (1a-2b)	38	17,5	37	42,5	46	49,5	33	38,4	18	45,0	8	20,5
Intermediară deschisă (3-6)	15	18,7	15	17,2	18	19,3	23	26,7	9	22,5	15	38,5
Intermediară închisă (7-11)	22	27,5	30	34,5	25	26,9	25	29,1	11	27,5	12	30,7
Închisă (12-16)	5	6,3	5	5,7	4	4,3	5	5,8	2	5,0	4	10,3

Tabelul nr. 7

## Repartiția procentuală a culorii părului

Culoarea	Gărina				Brebu Nou				Lindenfeld			
	♂		♀		♂		♀		♂		♀	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Blondă (M-O)	11	14,1	11	12,9	22	24,7	20	23,8	6	15,0	8	20,0
Castanie deschis (P-R)	17	21,8	16	18,8	16	18,0	14	16,7	5	12,5	13	32,5
Castanie închis (S-T)	7	9,0	13	15,3	3	3,4	5	5,9	5	12,5	1	2,5
Brună (U-V)	24	30,7	18	21,2	12	13,5	16	19,1	13	32,5	4	20,0
Brun-neagră (W-Y)	18	23,1	25	29,4	31	34,8	22	26,2	8	20,0	12	30,0
Roșcată (I-IV)	1	1,3	2	2,4	5	5,6	7	8,3	3	7,5	2	5,0

În satul Lindenfeld există un evident dimorfism sexual. Bărbații se apropie ca structură de cei din Gărina și Brebu Nou, având staturi variate cu tendințe spre staturi supramijlocii, trunchiuri metrio- sau macrocorme, un indice Rohrer plasat în categoria eutrofă sau subeutrofă, umeri relativ largi și bazine mijlocii sau înguste. La femei aproape toți parametrii corporali se deosebesc semnificativ de cei ai populației feminine din celelalte două sate. Astfel, deși media staturii cade în categoria mijlocie, în realitate numărul femeilor cu o asemenea statură este cel mai mic. Această medie rezultă de fapt din procente egale de staturi fie mici și submijlocii, fie mari și supramijlocii. Avem deci de-a face cu o curbă de repartiție cu două vîrfuri. Indicele Rohrer ne indică o accentuată hipertrofie, iar indicele cormic se plasează și el majoritar în categoria macrocorm. În rest, atît umerii, cît și bazinul și toracele sînt în marea lor majoritate relativ largi.

## DISCUȚII

După cum am mai spus, avem de-a face cu populații de aceeași origine, atestată documentar, ceea ce reiese atît din tabelele nr. 1-4, cît și din figurile 1-3. Adesea mediile valorice sînt foarte apropiate, iar deosebirile la nivelul caracterelor calotei cefalice și al masivului facial sînt puține, majoritatea dintre ele fiind slab semnificative. Referindu-ne

la caracterele corporale, remarcăm unele aspecte deosebite. Între Gârâna și Brebu Nou, cele două sate apropiate între care există și relații de căsătorie, nu va apărea la nici unul dintre sexe vreo deosebire semnificativă. Comparînd caracterele acestor două sate cu cele din Lindenfeld, se constată la femei deosebiri extrem de semnificative. În afară de lățimea biacromială și indicele cormic, în cazul ambelor comparații celelalte caractere se deosebesc semnificativ, în majoritate chiar puternic semnificativ. Astfel, la femeile din Lindenfeld statura este mai mică; în schimb, toate celelalte dimensiuni corporale sînt evident mai mari. La bărbați fenomenul nu apare decît ca o tendință, fiind vorba și în acest caz de statură semnificativ mai mici.

Avînd în vedere acest fapt, am putea crede chiar că este vorba de o populație diferită de celelalte două. Și totuși atît documentele, cît și caracterele cefalo-faciale, caractere mai stabile în funcție de mediu decît cele corporale, indică originea comună a acestor populații. Originea comună este sprijinită și de omogenitatea lotului de bărbați. Aceste deosebiri la nivelul caracterelor corporale la femei ne indică de fapt existența unui fenomen ce a avut loc aici de-a lungul cîtorva generații și ale cărui cauze sînt probabil de ordin genetic.

Cele cîteva deosebiri la nivelul caracterelor cefalo-faciale se pot datora unei fertilități diferențiale, care a schimbat întrucîtva frecvența genică în sinul fiecăreia din cele trei populații. Aceste procese specifice fiecărei comunități de reproducere, cu excepția caracterelor corporale ale femeilor din satul Lindenfeld, nu au produs încă diferențieri atît de puternice încît să afecteze omogenitatea acestei populații. De aceea, în caracterizarea antropologică cele trei loturi au fost grupate făcînd obiectul unei singure analize.

Considerînd ansamblul caracterelor studiate reiese că la aceste populații există un fond preponderent nordic și alpin. Caracterele alpine apar în caracteristicile calotei prin însuși indicele cefalic și înălțimea joasă a calotei. Cele nordice sînt mai numeroase, manifestîndu-se prin fețe lungi și înguste, prin menton conturat, buză dermică dreaptă, nasuri lungi și drepte, avînd de multe ori rădăcină îngustă și așezată înalt, prin numărul mare de occipitale bombate și în special printr-o puternică depigmentare. Mai rar se pot observa și fante palpebrale oblice, precum și rădăcini nazale late, ambele atribuite rasei est-europide. Elementele dinarice se manifestă doar printr-un anumit procent de profiluri nazale convexe și de ramuri mandibulare oblice.

După cum am arătat, această populație s-a colonizat aici la începutul secolului trecut, venind din Boemia. Am încercat să găsim materiale antropologice comparative din zona de origine. Din păcate, acestea sînt extrem de puține și pentru comparație am putut folosi doar datele culese de A. Knöbl în anul 1931. Ne referim aici la populația a două sate germane, Benke și Liebesdorf, din regiuni apropiate celor de origine. La aceste sate lipsesc distanța bizigomatică și lățimea frunții, iar în ceea ce privește lungimea nasului și a feței avem unele rezerve în privința metcdei de recoltare a datelor. Dar chiar dacă ne vom referi doar la lungimea, lățimea și înălțimea calotei și lățimea feței și a nasului vom con-




Fig. 1. — Valoarea testelor de semnificație între satele Gărina și Brebu Nou.




Fig. 2. — Valoarea testelor de semnificație între satele Gârna și Lindenfeld.




Fig. 3. — Valoarea testelor de semnificație între satele Brebu Nou și Lindenfeld.

stata evidenta asemănare dintre cele două populații. Cu unele rezerve din cauza lipsei unui material comparativ mai vast, credem că se poate susține unitatea structurală a acestor populații.

## ANTHROPOLOGIE EINER DEUTSCHEN BEVÖLKERUNG AUS DEM BANATER GEBIRGE

### ZUSAMMENFASSUNG

Das Material wurde im Banater Gebirge, aus drei Dörfern mit einer deutschen Bevölkerung, die Anfang des XIX-ten Jahrhunderts aus Böhmen kam und sich hier ansiedelte, gesammelt. Zwei dieser Dörfer, Gărina und Brebu Nou, befinden sich in unmittelbarer Nähe und stehen in engen Heiratsbeziehungen zueinander. Das dritte Dorf — Lindenfeld —, das kleinste ist ziemlich weit entfernt und durch keine fahrbaren Wege mit den anderen beiden verbunden. Da diese Bevölkerungen eine andere soziale Struktur im Vergleich mit den nebenliegenden rumänischen Dörfern besitzt, haben sich im Verlaufe der Zeit zwei Isolate gebildet die sich selbstständig weiter entwickelt haben. Eins Brebu Nou und Gărina mit einer größeren Bevölkerung und ein zweites Lindenfeld, mit nur sehr wenig Individuen, deren Heiratskreis sehr beschränkt ist und darum zu einer Erhöhung des Inzuchtkoeffizienten führte.

Die Signifikanzteste der 40 anthropologischen studierten Merkmale zeigen folgendes: Unterschiede zwischen den Kopf-Gesicht Merkmalen sind wenige und nur schwach signifikant. Was die Körpermerkmale betrifft, wie es auch zu erwarten war, zwischen Brebu Nou und Gărina, gibt es keinen einzigen signifikanten Unterschied. Dafür unterscheiden sich die Frauen aus Lindenfeld durch fast alle studierten Körpermaße hoch signifikant von den Frauen beider anderen Dörfer. Die Körperhöhe ist kleiner, dafür sind alle anderen Merkmale wesentlich größer. Einige Merkmale liefern Verteilungskurven mit 2 Spitzen. Die Einheit der Kopf-Gesichteigenschaften und die Homogenität der Männergruppen unterstützen die Idee einer gemeinsamen Abstammung dieser Bevölkerung. Darum werden in unserer anthropologischen Analyse, alle drei Dörfer als eine einzige Gruppe angesehen. Die Bevölkerung hat vorwiegend nordische und alpine Merkmale. Es wurde auch ein Vergleich mit der Bevölkerung aus dem Abstammungsgebiet versucht.

### BIBLIOGRAFIE

1. GRINȚESCU-POP SUZANA, ENĂCHESCU T., GEORGESCU V., *Morfograma taxonomică*, St. cerc. antropol., 1965, 2, 1, 151—159.
2. GRINȚESCU-POP SUZANA, ENĂCHESCU T., *Contribution à la détermination du faciès anthropologique des populations de Roumanie*, Ann. roum. Anthrop., 1966, 3, 47—64.
3. KNÖBL A., *Anthropologische Untersuchungen in den Sudetenländern. I. Untersuchungen in drei nordmährischen Dörfern*, Praga, 1931.
4. SCHMIDT H., *Studiul antropologic al unui sat izolat de populație cehă din Banat — Șumița*, St. cerc. antropol., 1972, 9, 1, 71—86.

Primit în redacție la 9 februarie 1974

Centrul de cercetări antropologice  
București





# OBSERVAȚII ASUPRA DESENELOR PAPILARE DIGITALE, PALMARE ȘI PLANTARE LA POPULAȚIA DIN PEȘTERA (BRAN)

DE  
CORNELIU VULPE

572.524.12

Satul Peștera face parte din grupul așezărilor de altitudine din partea de vest a culoarului Bran și este situat în apropierea masivului muntos Piatra Craiului.

Denumirea localității provine de la grota pe care localnicii, pe drept cuvânt, o numesc Peștera Liliecilor, datorită cheiropterelor care o locuiesc. Relieve ale altor viețuitoare, precum și urme incerte ale omului preistoric au fost puse în evidență prin săpăturile efectuate în această peșteră, în urma cărora s-au identificat resturi fosile de faună (2) și un fragment de femur, presupus a aparține lui *Homo sapiens fossilis* (1).

Deci, această localitate a suscitat și suscită interesul nu numai al antropologilor, dar și al arheologilor și paleofauniștilor, fapt ce concură la elucidarea aspectelor complexe despre om în regiuni mai puțin cunoscute ale țării.

Campania de la Peștera din vara anului 1973 a încheiat suita de cercetări antropologice efectuate în localitățile de altitudine ale zonei Bran. Investigațiile antropologice complexe din această locuire umană s-au finalizat prin studierea a circa 400 de persoane, din care au fost selecționate pentru studiul de etnicitate 106 (54 ♂ și 52 ♀), acestea având o cit mai veche ascendență locală.

## DESENELE PAPILARE DIGITALE

La studiul dermatoglifelor digitale s-au luat în considerație tipul de desen (ALV), precum și orientarea lui (rsu — notația Monique de Lestrangle), urmărindu-se pe eșantion modul de distribuție al desenelor în funcție de deget, mână și sex. S-au urmărit, de asemenea, concordanța sau neconcordanța cu schema clasică a repartiției desenelor, precum

și încadrarea frecvențelor față de limitele de variabilitate la populațiile românești studiate anterior.

Repartiția desenelor digitale, așa cum apare în tabelul nr. 1, arată, atât la bărbați cât și la femei, o frecvență mai accentuată a lațurilor radiale și a arcurilor pe degetul II, în timp ce lațurile ulnare sînt mai numeroase pe degetele V și III. Verticilele se găsesc într-un procent mai ridicat pe degetele I și IV și prezintă particularitatea că pe degetul I mai mult de jumătate sînt dublucentrice, iar pe degetul IV mai bine de jumătate sînt monocentrice.

Arcurile au fost întîlnite doar sporadic pe degetele IV și V, iar lațurile radiale apar cu totul întîmplător pe degetul V al bărbaților ele lipsind cu desăvîrșire pe degetele I și IV atât la bărbați cât și la femei.

Din punctul de vedere al orientării desenului, cel mai frecvent întîlnită este poziția ulnară cu următoarea distribuție în suită:  $V > IV > III > I > II$ , fapt ce concordă cu schema clasică. Pe locul următor se situează poziția simetrică a desenelor, unde, de asemenea, distribuția în suită concordă cu schema clasică:  $I > II > III > IV > V$ . Poziția radială apare într-un procent mai scăzut și este caracteristică degetului II. Această poziție nu a fost întîlnită deloc pe degetul I, iar pe degetele IV și V se găsește doar sporadic.

Se poate observa tot din tabelul nr. 1 că prezența sau absența poziției radiale pe un anumit deget (cum ar fi, spre exemplu, degetele II și III) se poate corela, într-o mare măsură, cu prezența sau absența pe acel deget a lațurilor radiale, după cum prezența poziției ulnare într-un procent foarte ridicat pe degetul V se corelează cu numărul foarte mare de lațuri ulnare de pe acest deget. Poziția simetrică, mai des întîlnită pe degetul I, se corelează cu numărul crescut de verticile de pe acest deget.

Comparînd distribuția desenelor în funcție de mîna și sex, așa cum apare în tabelul nr. 2, se poate observa următoarea situație:

♂ = A : s > d ; Lr : d > s ; Lu : s > d ; V : d > s ; r : d > s ; s : d > s ; u : s > d

♀ = A : s > d ; Lr : s > d ; Lu : d > s ; V : s > d ; r : s > d ; s : s > d ; u : d > s

Rezultă de aici că repartiția desenelor în funcție de latură este inversă la femei față de bărbați, putîndu-se conchide, pe baza tabelului nr. 2, că frecvențele întîlnite la mîna dreaptă a femeilor sînt mai apropiate de cele întîlnite la mîna stîngă a bărbațiilor. Acest raport de asimetrie opusă sexului masculin s-ar datora, după unii autori, genelor legate de sex.

Într-o lucrare anterioară (3) am încercat să localizăm pe care deget se manifestă mai puternic această asimetrie opusă sexului masculin față de cel feminin și am observat că la populații situate diferit din punct de vedere geografic asimetria apare în mod diferit. Astfel, la populațiile din bazinul superior al Teleajenului asimetria (dreapta-stînga), opusă la cele două sexe, apare, în general, mai bine conturată pe degetul II, în timp ce la populațiile din culoarul Bran este întîlnită mai frecvent pe degetul III. O situație asemănătoare cu cele trei localități din zona Bran (Șirnea, Moeciu de Sus și Sohodol), cercetate anterior, s-a întîlnit

Tabelul nr. 1

Repartiția descendenței papilare digitale la populația din Feștera

Deget	Sex	Mână	A	Lr	Lu	ΣL	V	VS	ΣV	r	s	u	Nr. degete
I	♂	dr.	2 3,70	— —	22 40,74	22 40,74	19 35,18	11 20,37	30 55,55	— —	24 44,44	30 55,55	54
		st.	3 5,55	— —	27 50,00	27 50,00	8 14,81	16 29,63	24 44,44	— —	10 18,52	44 81,48	54
	♀	dr.	1 1,92	— —	26 50,00	26 50,00	9 17,31	16 30,77	25 48,08	— —	16 30,77	36 69,23	52
		st.	1 1,92	— —	25 48,08	25 48,08	8 15,38	18 34,62	26 50,00	— —	21 40,38	31 59,62	52
II	♂	dr.	3 5,55	20 37,04	14 25,92	34 62,96	12 22,22	5 9,26	17 31,48	28 51,85	8 14,81	18 33,33	54
		st.	4 7,41	10 18,52	25 46,29	35 64,81	9 16,66	6 11,11	15 27,77	12 22,22	11 20,37	31 57,41	54
	♀	dr.	5 9,62	4 7,69	25 48,08	29 55,77	14 26,92	4 7,69	18 34,61	8 15,38	14 26,92	30 57,69	52
		st.	2 3,85	13 25,00	22 42,30	35 67,30	12 23,07	3 5,77	15 28,84	13 25,00	14 26,92	25 48,08	52
III	♂	dr.	4 7,41	— —	35 64,81	35 64,81	12 22,22	3 5,55	15 27,77	— —	13 24,07	41 75,92	54
		st.	2 3,70	4 7,41	41 75,92	45 83,33	4 7,41	3 5,55	7 12,96	4 7,41	4 7,41	46 85,18	54
	♀	dr.	1 1,92	1 1,92	40 76,92	41 78,84	10 19,23	— —	10 19,23	2 3,85	7 13,46	43 82,69	52
		st.	3 5,77	1 1,92	33 63,46	34 65,38	11 21,15	4 7,69	15 28,84	3 5,77	9 17,31	40 76,92	52
IV	♂	dr.	— —	— —	29 53,70	29 53,70	23 42,59	2 3,70	25 46,29	— —	13 24,07	41 75,92	54
		st.	1 1,85	— —	40 74,07	40 74,07	12 22,22	1 1,85	13 24,07	1 1,85	5 9,26	48 88,89	54
	♀	dr.	— —	— —	35 67,30	35 67,30	16 30,77	1 1,92	17 32,69	— —	10 19,23	42 80,77	52
		st.	1 1,92	— —	31 59,62	31 59,62	14 26,92	6 11,54	20 38,46	— —	8 15,38	44 84,62	52
V	♂	dr.	— —	2 3,70	42 77,77	44 81,48	6 11,11	4 7,41	10 18,52	2 3,70	1 1,85	51 94,44	54
		st.	1 1,85	2 3,70	48 88,89	50 92,59	1 1,85	2 3,70	3 5,55	1 1,85	— —	53 98,15	54
	♀	dr.	— —	— —	47 90,38	47 90,38	3 5,77	3 3,85	5 9,62	— —	1 1,92	51 98,08	52
		st.	— —	— —	46 88,46	46 88,46	4 7,69	2 3,85	6 11,54	— —	1 1,92	51 98,08	52

Tabelul nr. 2

Desenele papilare digitale în funcție de mână și sex la populația din Peștera

Mână	Sex	A	Lr	Lu	ΣL	V	VS	ΣV	r	s	u	Nr. degete
Dreapta	♂	9 3,33	22 8,15	142 52,59	164 60,74	72 26,66	25 9,26	97 35,92	30 11,11	59 21,85	181 67,04	270
	♀	7 2,69	5 1,92	173 66,54	178 68,46	52 20,00	23 8,85	75 28,85	10 3,85	48 18,46	202 77,69	260
	♂+♀	16 3,02	27 5,09	315 59,43	342 64,52	124 23,39	48 9,06	172 32,45	40 7,55	107 20,19	383 72,26	530
Stînga	♂	11 4,07	16 5,92	181 67,04	197 72,96	34 12,59	28 10,37	62 22,96	18 6,66	30 11,11	222 82,22	270
	♀	7 2,69	14 5,38	157 60,38	171 65,76	49 18,85	33 12,69	82 31,54	16 6,15	53 20,38	191 73,46	260
	♂+♀	18 3,39	30 5,66	338 63,77	368 69,43	83 15,66	61 11,51	144 27,17	34 6,42	83 15,66	413 77,92	530
Dreapta + stînga	♂	20 3,70	38 7,04	323 59,81	361 66,85	106 19,63	53 9,81	159 29,44	48 8,88	89 16,48	403 74,63	540
	♀	14 2,69	19 3,65	330 63,46	349 67,11	101 19,42	56 10,77	157 30,19	26 5,00	101 19,42	393 75,58	520
	♂+♀	34 3,21	57 5,38	653 61,60	710 66,98	207 19,53	109 10,28	316 29,81	74 6,98	190 17,92	796 75,09	1060

și la studiul mai recent al populațiilor din Măgura și Peștera, din aceeași zonă.

Reprezentarea simbolică a frecvenței desenelor digitale în funcție de mână și sex (tabelul nr. 3) indică, atât la populația din Măgura (4), cât și la cea din Peștera, o concentrare vizibilă a asimetriilor opuse pe degetul III.

Făcînd o apreciere globală asupra repartîției desenelor digitale pe întreg eșantionul ( $A=3,21\%$ ;  $L=66,98\%$ ;  $V=29,81\%$ ;  $r=6,98\%$ ;  $s=17,92\%$ ;  $u=75,09\%$  – tabelul nr. 2), se constată că frecvențele se încadrează atât în limitele de variabilitate ale populațiilor românești studiate anterior, cât și în cele caracteristice populațiilor europide ( $A=4-7\%$ ;  $L=60-70\%$ ;  $V=20-30\%$ ).

#### DESENELE PAPIARE PALMARE

Pentru stabilirea punctelor de terminație ale principalelor linii palmare (A, B, C, D) s-a utilizat notația lui Cummins și Midlo, iar pentru gruparea punctelor de terminație ale liniilor B, C, D s-au folosit formulele lui Wilder.

Linia A se termină mai frecvent în punctele 3 și 4 de la mîna stîngă și în punctele 5' și 4 de la mîna dreaptă atât la bărbați cât și la femei, fapt ce indică o tendință spre transversalitate a liniei, mai accentuată la mîna dreaptă (tabelul nr. 4).

Tabelul nr. 3

Reprezentarea simbolică a frecvenței desenelor digitale în funcție de mână și sex la populațiile din Măgura și Peștera (culoarul Bran)

## Măgura

Deget	Sex	A	Lr	Lu	ΣL	V	VS	ΣV	r	s	u	Nr. deget e
I	♂	s > d	d > s	s > d	s > d	d > s	s > d	d > s	d > s	d > s	s > d	54
	♀	s > d	d > s	s > d	s = d	d > s	d > s	d > s	d = s	d > s	s > d	69
II	♂	s = d	s > d	s > d	s > d	d > s	s > d	d > s	s > d	d > s	s > d	54
	♀	d > s	s > d	s = d	s > d	d > s	d > s	d > s	s > d	d > s	d > s	69
III	♂	s = d	d > s	s > d	s > d	d > s	d > s	d > s	d > s	s > d	s > d	54
	♀	s > d	s > d	d > s	d > s	s > d	d > s	d > s	s > d	s > d	d > s	69
IV	♂	—	—	s > d	s > d	d > s	s > d	d > s	d > s	d > s	s > d	54
	♀	—	—	s > d	s > d	d > s	s > d	d > s	—	d > s	s > d	69
V	♂	s > d	—	s > d	s > d	d > s	s = d	d > s	—	d > s	s > d	54
	♀	s > d	—	d > s	d > s	d > s	—	d > s	d = s	d = s	d = s	69

## Peștera

I	♂	s > d	—	s > d	s > d	d > s	s > d	d > s	—	d > s	s > d	54
	♀	s = d	—	d > s	d > s	d > s	s > d	s > d	—	d > s	d > s	52
II	♂	s > d	d > s	s > d	s > d	d > s	s > d	d > s	d > s	s > d	s > d	54
	♀	d > s	s > d	d > s	s > d	d > s	d > s	d > s	s > d	s = d	s > d	52
III	♂	d > s	s > d	s > d	d > s	d > s	d = s	d > s	s > d	d > s	s > d	54
	♀	s > d	s = d	d > s	d > s	s > d	s > d	s > d	s > d	s > d	d > s	52
IV	♂	s > d	—	s > d	s > d	d > s	d > s	d > s	s > d	d > s	s > d	54
	♀	s > d	—	d > s	d > s	d > s	s > d	s > d	—	d > s	s > d	52
V	♂	s > d	s = d	s > d	s > d	d > s	d > s	d > s	d > s	d > s	s > d	54
	♀	—	—	d > s	d > s	s > d	d = s	s > d	—	d = s	d = s	52

Notă. Dreptunghiurile punctate reprezintă asimetriile opuse la bărbați și femei.

Linia B prezintă pentru mîna stîngă un număr mai crescut de trasee terminate în punctele 5'' și 5', în timp ce pentru mîna dreaptă traseele caracteristice sînt cele terminate în punctele 7 și 5'' (♂ și ♀).

Linia C se caracterizează printr-un număr mai ridicat de terminații în punctul 7 de la mîna stîngă și în punctele 9 și 7 de la mîna dreaptă

Tabelul nr. 4

Principalele puncte de terminație ale liniilor palmare (A, B, C, D) la populația din Peștera  
Bărbați

Puncte de terminație	Stînga								Dreapta							
	A		B		C		D		A		B		C		D	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1	3	5,55														
2	9	16,66						1	1,85							
3	29	53,70						7	12,96							
4	9	16,66	3	5,55				19	35,18							
5'	4	7,41	17	31,48	1	1,85		26	48,15	5	9,26					
5''			18	33,33	7	12,96		1	1,85	16	29,63	3	5,55			
6			2	3,70						1	1,85					
7			14	25,93	28	51,85	8	14,81		32	59,26	22	40,74	3	5,55	
8																
9					13	24,07	30	55,55				25	46,29	18	33,33	
10							2	3,70						1	1,85	
11							14	25,93						32	59,26	
X					2	3,70						1	1,85			
x					2	3,70						1	1,85			
0					1	1,85						2	3,70			
N	54		54		54		54		54		54		54		54	

## Femei

1	2	3,85						1	1,92							
2	8	15,38														
3	16	30,77						6	11,54							
4	18	34,62						20	38,46							
5'	8	15,38	16	30,77				21	40,38	3	5,77					
5''			25	48,08	4	7,69		4	7,69	17	32,69	4	7,69			
6																
7			11	21,15	28	53,85	4	7,69		31	59,62	12	23,08	4	7,69	
8																
9					14	26,92	37	71,15				24	46,15	16	30,77	
10							11	21,15								
11												1	1,92	32	61,54	
X					3	5,77						4	7,69			
x					1	1,92						4	7,69			
0					2	3,85				1	1,92	3	5,77			
N	52		52		52		52		52		52		52		52	

atit la bărbați cît și la femei. Formele abortive, specifice liniei C(C<sub>x</sub> și C<sub>0</sub>), sînt mai numeroase la femei decît la bărbați, iar considerate global (C<sub>x</sub>+C<sub>0</sub>) ele prezintă diferențe de latură opuse la cele două sexe ( $\delta: s > d$ ;  $\text{♀}: d > s$ ). Luate separat, se observă că aceste asimetrii opuse la cele două sexe se mențin în cazul formei abortive C<sub>x</sub>( $\delta: s > d$ ;  $\text{♀}: d > s$ ), în timp ce pentru forma abortivă C<sub>0</sub> asimetria se prezintă la fel pentru ambele sexe ( $\delta$  și  $\text{♀}: d > s$ ).

Linia D se prezintă la ambele sexe cu un număr mai ridicat de terminații în punctul 9 al mîinii stîngi și în punctul 11 al mîinii drepte, situație ce reflectă, ca și în cazul liniei A, o mai accentuată tendință spre transversalitate la mîna dreaptă (tabelul nr. 4).

Această tendință de transversalitate a creștelor papilare, mai accentuată la mîna dreaptă, este atestată și de prezența în număr mai ridicat a formulei 11-9-7 la mîna dreaptă în comparație cu cea stîngă la ambele sexe (tabelul nr. 5). Tendința spre oblicitate a creștelor papilare

Tabelul nr. 5  
Frecvența principalelor formule ale lui Wilder

Formule	♂			♀			♂ + ♀
	st.	dr.	st + dr.	st.	dr.	st. + dr.	
11-9-7	8	25	33	9	29	38	71
-x-	14,81	46,29	30,55	17,31	55,77	36,54	
-0-							
9-7-5	22	16	38	29	15	44	82
-x-	40,74	29,63	35,18	55,77	28,84	42,31	
-0-							
7-5-5	6	3	9	4	4	8	17
-x-	11,11	5,55	8,33	7,69	7,69	7,69	
-0-							
Alte formule	18	10	28	10	4	14	42
	33,33	18,52	25,93	19,23	7,69	13,46	
N	54	54	108	52	52	104	212

este mai bine conturată la mîna stîngă, situație ce se desprinde din frecvența mai crescută atit a terminațiilor liniei A în punctele 3 și 4, cît și a liniei D în punctele 9 și 7. Traseul mai oblic al creștelor papilare palmare la mîna stîngă este confirmat și de formula 9-7-5, întîlnită mai des la această mîna atit la bărbați cît și la femei (tabelul nr. 5).

Repartiția desenelor palmare la cele două sexe indică vizibile diferențe de latură, date de frecvența mai mare a desenelor în regiunea hipotenară și în spațiile interdigitale II și III de la mîna dreaptă, precum și de numărul crescut de desene în regiunea tenară și în spațiul interdigital IV de la mîna stîngă (tabelul nr. 6).

Însumînd frecvențele desenelor palmare ale ambelor mîini, se constată că bărbații prezintă un număr evident mai mare de desene în aproape toate regiunile palmare, excepție făcînd spațiul interdigital III, unde procentul înclină ușor în favoarea femeilor.

Tabelul nr. 6

Repartiția desecelor papilare palmare și a triradiusului axial la populația din Feștera

Mână	Sex	Regiunea		Spațiul interdigital			N	Triradiusul axial						N
		H	T + I	II	III	IV		t	t'	t''	tu	ttu	t', tu, tt', tt'' etc.	
Dreapta	♂	23 42,59	4 7,41	10 18,52	24 44,44	34 62,96	54	24 44,44	5 9,26	2 3,70	—	12 22,22	11 20,37	54
	♀	17 32,69	5 9,62	6 11,54	24 46,15	21 40,38	52	19 36,54	12 23,07	2 3,85	2 3,85	11 21,15	6 11,54	52
	♂ + ♀	40 37,74	9 8,49	16 15,09	48 45,28	55 51,88	106	43 40,57	17 16,04	4 3,77	2 1,88	23 21,69	17 16,04	106
Stînga	♂	22 40,74	14 25,92	3 5,55	15 27,77	41 75,92	54	25 46,29	9 16,66	—	—	11 20,37	9 16,66	54
	♀	14 26,92	8 15,38	3 5,77	15 28,84	37 71,15	52	24 46,15	11 21,15	3 5,77	—	5 9,62	9 17,31	52
	♂ + ♀	36 33,96	22 20,75	6 5,66	30 28,30	78 73,58	106	49 46,23	20 18,87	3 2,83	—	16 15,09	18 16,98	106
St. + dr.	♂	45 41,66	18 16,66	13 12,04	39 36,11	75 69,44	108	49 45,37	14 12,96	2 1,85	—	23 21,29	20 18,52	108
	♀	31 29,81	13 12,50	9 8,65	39 37,50	58 55,77	104	43 41,35	23 22,12	5 4,81	2 1,92	16 15,38	15 14,42	104
	♂ + ♀	76 35,85	31 14,62	22 10,38	78 36,79	133 62,73	212	92 43,39	37 17,45	7 3,30	2 0,94	39 18,39	35 16,51	212

Aranjarea în suită a frecvențelor în funcție de regiune, mână și sex, conform cu tabelul nr. 6, se prezintă astfel:

$$\begin{aligned}
 \text{Dreapta} & \left\{ \begin{array}{l} \text{♂ : IV} > \text{III} > \text{H} > \text{II} > \text{T+I} \\ \text{♀ : III} > \text{IV} > \text{H} > \text{II} > \text{T+I} \end{array} \right. \\
 \text{Stînga} & \left\{ \begin{array}{l} \text{♂ : IV} > \text{H} > \text{III} > \text{T+I} > \text{II} \\ \text{♀ : IV} > \text{III} > \text{H} > \text{T+I} > \text{II} \end{array} \right.
 \end{aligned}$$

Rezultă de aici că numărul cel mai mare de desene palmare se găsește în spațiul interdigital IV al ambelor mâini, în timp ce numărul cel mai mic de desene se întâlnește în regiunea tenară a mîinii drepte și în spațiul interdigital II de la mîna stîngă (♂ și ♀).

Aspectul global al suitei, pe întreg eșantionul, arată astfel:

$$\begin{aligned}
 \text{Dr. + st.} & \left\{ \begin{array}{l} \text{IV} > \text{III} > \text{H} > \text{T+I} > \text{II} \\ \text{♂ + ♀} \end{array} \right.
 \end{aligned}$$



Și în acest caz se confirmă observația cu privire la frecvența mai crescută a desenelor palmare în spațiul interdigital IV, precum și a frecvenței mai scăzută, de data aceasta, doar în spațiul interdigital II.

Repartiția triradiusului axial în funcție de latură indică, atât la bărbați cât și la femei, un număr mai mare de poziții proximale la mîna stîngă și altul mai crescut de poziții combinate la mîna dreaptă (tabelul nr. 6). Triradiusul axial în poziție proximală (t) și sub formă combinată (ttu, tt', tt'' etc.) apare mai frecvent la bărbați, în timp ce pozițiile mediană (t'), distală (t'') și ulnară (tu) sînt mai des întîlnite la femei.

Indiferent de latură și sex, distribuția triradiusului axial în suită se prezintă astfel:  $t > t \text{ comb.} > t' > t'' > tu$ . Rezultă de aici că pe primul loc se situează poziția proximală, secundată de cea combinată, după care urmează, în ordine descrescîndă, pozițiile mediană, distală și ulnară.

### DESENELE PAPILARE PLANTARE

Pentru clasificarea desenelor plantare s-a utilizat metoda de notație Wichmann. Din tabelul nr. 7 se poate observa că numărul cel mai mare de desene arcuiforme se găsește în cîmpul 3, lațurile distale și verticilele în regiunea tenară, iar lațurile proximale și tibiale în cîmpul 1 și, respectiv, în regiunea hipotenară. În privința desenelor distale se constată că la femei ele apar mai des în regiunea tenară, în timp ce la bărbați sînt mai frecvente în cîmpul 2.

Repartiția desenelor plantare în funcție de latură a pus în evidență o serie de asimetrii opuse la cele două sexe. Astfel, în aproape toate regiunile plantare, desenele arcuiforme și lațurile proximale sînt mai frecvente la piciorul drept al bărbaților și la cel stîng al femeilor. Lațurile distale se întîlnesc mai des la piciorul drept, iar verticilele la piciorul stîng atât la bărbați cât și la femei (tabelul nr. 7).

### CONCLUZII

Studiul dermatoglifelor la populația din Peștera arată că lațurile radiale și arcurile sînt mai numeroase pe degetele II și III, lațurile ulnare se găsesc mai des pe degetele V și III, iar verticilele pe degetele I și IV. Corelativ cu preponderența unui anumit tip de desen pe unul din degete, se observă că orientarea radială apare de cele mai multe ori pe degetul II, cea ulnară pe degetul V, iar orientarea simetrică pe degetul I. Repartiția desenelor digitale în funcție de latură a pus în evidență asimetrii opuse la cele două sexe, în special pe degetul III. Aceeași situație a fost întîlnită și la alte populații din culoarul Bran, studiate anterior, fapt ce ar putea constitui o caracteristică a întregii zone.

Principalele creste papilare palmare descriu trasee mai oblice la mîna stîngă și mai transversale la mîna dreaptă atât la bărbați cât și la femei. Formele abortive ale liniei C, mai numeroase la femei decît la bărbați, prezintă diferențe de latură opuse la cele două sexe.

Tabelul nr. 7

## Desenecle papilare plantare la populația din Peștera

Picior	Desen	Bărbați					Femei						
		T	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	C <sub>3</sub>	H	T	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	C <sub>3</sub>	H		
Drept	O	4 7,41	36 66,66	13 24,07	42 77,77	42 77,77	4 7,69	36 69,23	22 42,30	47 90,38	45 86,53		
	D	27 50,00	4 7,41	32 59,26	8 14,81		32 61,54	3 5,77	22 42,30	5 9,62			
	P		13 24,07	4 7,41	2 3,70			12 23,07	2 3,85				
	T	5 9,26			1 1,85	12 22,22	5 9,62				7 13,46		
	F												
	W	12 22,22	1 1,85	2 3,70			10 19,23	1 1,92	3 5,77				
	WS	6 11,11		3 5,55	1 1,85		1 1,92		3 5,77				
Stîng	O	3 5,55	40 74,07	15 27,77	50 92,59	46 85,18	3 5,77	35 67,31	19 36,53	48 92,31	44 84,62		
	D	24 44,44	2 3,70	29 53,70	3 5,55	1 1,85	30 57,69	3 5,77	25 48,08	3 5,77			
	P		10 18,52	4 7,41	1 1,85			13 25,00	2 3,85				
	T	10 18,52				7 12,96	4 7,69				8 15,38		
	F												
	W	14 25,92	2 3,70	1 1,85			13 25,00		4 7,69	1 1,92			
	WS	3 5,55		5 9,27			2 3,85	1 1,92	2 3,85				
N			54						52				

Distribuția desenelor papilare palmare indică, pentru toate regiunile palmei, frecvențe evident mai ridicate la bărbați în comparație cu femeile. De asemenea, s-au semnalat și diferențe de latură date de numărul mai crescut de desene în regiunea hipotenară și în spațiile interdigitale II și III de la mîna dreaptă, precum și de frecvența mai mare a desenelor în regiunea tenară și în spațiul interdigital IV de la mîna stîngă (♂ și ♀).

Triradiusul axial prezintă diferențe de latură date de numărul crescut de poziții proximale la mîna stîngă și altul de poziții combinate

la mîna dreaptă atît la bărbați cît și la femei. De asemenea, poziția proximală și forma combinată apar mai des la bărbați, pe cînd pozițiile mediană, distală și ulnară sînt mai frecvente la femei.

Desenele papilare plantare prezintă diferențe în funcție de sex datorită lațurilor distale mai numeroase în regiunea tenară la femei și în cîmpul 2 la bărbați. Tot aici apar diferențe de latură, opuse celor două sexe, date de lațurile proximale și de desenele arcuiforme, mai frecvente la piciorul drept al bărbaților și la cel stîng al femeilor.

## OBSERVATIONS SUR LES DESSINS PAPILLAIRES DIGITAUX, PALMAIRES ET PLANTAIRES CHEZ LA POPULATION DE PEȘTERA (BRAN)

### RÉSUMÉ

Sur la base des dessins papillaires digitaux, palmaires et plantaires on met en évidence, en fonction du côté et du sexe, une série d'asymétries entre les deux sexes. De pareilles asymétries opposées, comme par exemple celle du doigt III de la main, paraissent constituer une caractéristique des populations du couloir de Bran. Sur le tégument palmaire ont été saisies des différences des côtés opposés chez les deux sexes pour les formes abortives de la ligne C; quant au tégument plantaire, ces asymétries opposées sont données par les boucles proximales et des dessins arciformes plus fréquents au pied droit des hommes et à celui gauche des femmes. Les fréquences rencontrées dans l'étude des dessins papillaires digitaux (A=3,21%; L=66,98%; V=29,81%) s'inscrivent tant entre les limites de variabilité des populations roumaines étudiées antérieurement, que dans celles des populations européennes en général.

### BIBLIOGRAFIE

1. NECRASOV O., *Évolution de la structure anthropologique de la population de la Roumanie depuis le paléolithique jusqu'à nos jours et les problèmes qui s'y rattachent*, Ann. roum. Anthropol., 1973, **10**, 3—19.
2. NICOLĂESCU-PLOPȘOR C. S. și colab., *Cercetări paleolitice în peșterile din Țara Birsei*, Materiale și cercetări de arheologie, 1961, **VII**, 15—19.
3. VULPE C., *Desenele papilare digitale, palmare și plantare la populația din Sohodol (Bran)*, St. cerc. antropol. 1971, **8**, 1, 75—84.
4. VULPE C., *Observații asupra reliefului cufanal digito-palmar și plantar la populația din Măgura*, St. cerc. antropol. 1972, **9**, 2, 167—175.

Centrul de cercetări antropologice  
București

Primit în redacție la 9 februarie 1974



# STUDIUL ANTROPOLOGIC AL POPULAȚIEI DIN COMUNA SĂPÎNȚA (JUD. MARAMUREȘ)

## INTRODUCERE

DE

OLGA NECRASOV

572.5

Comuna Săpînța, formată dintr-un singur sat (cu același nume), este așezată aproape de malul stîng al Tisei, pe pîrîul Săpînța în continuarea șesului Sărăsăului și Cîmpulungului la Tisa. Coordonatele sale geografice sînt : aproape de 48° latitudine Nord și între longitudinile 23 și 24° Est<sup>1</sup>.

Clima este continentală. Media anuală de temperatură este de +8°C, media pentru luna ianuarie fiind de -4°C și pentru luna iulie de +18°C. Media precipitațiilor anuale este de 800 mm<sup>3</sup> pe m<sup>2</sup>. Media zilelor ploioase este de 140 pe an, la care se adaugă în medie 30 de zile de zăpadă<sup>2</sup>.

Terenul agricol al comunei (peste 6500 ha) este reprezentat prin pășuni și fînețe naturale (peste 5500 ha), teren arabil (peste 600 ha) și livezi (peste 400 ha). Fondul forestier se ridică la peste 7500 ha (cu păduri de fag amestecat cu stejar)<sup>3</sup>.

Numărul locuitorilor era la data de 1 ianuarie 1970 de 3101, dintre care 1367 bărbați și 1734 femei.

Ocupația locuitorilor este în mod dominant pastoral-agricolă, în cooperativa agricolă de producție fiind înscrși 1874 membri apti de muncă, aparținînd la 1091 familii. Agricultură (culturi de cereale : porumb, grîu, cartofi), pomicultura și creșterea vitelor sînt ocupația lor principală. O parte din bărbați lucrează însă la exploatarea forestiere și în cariera de piatră a comunei, precum și într-o măsură mai mică la moară, la piuă, la cazanele de țuică ale comunei și la îmbuteliat apa

<sup>1</sup> *Monografia geografică a Republicii Populare Române*, vol. I și anexa, București, 1960.

<sup>2</sup> După datele luate din *Atlasul climatologic al Republicii Socialiste România*, București, 1965 (calculate pentru perioada 1896—1965).

<sup>3</sup> Pop Gh. T., Dobra Gh., Mihalache D., Ardelean M., Husian M., *Localitățile județului Maramureș*, Baia Mare, 1971.

minerală acidulată de la izvorul Săpînța. Femeile mai lucrează la industria casnică (țesutul covoarelor și al cergelor). De asemenea, peste 500 de locuitori domiciliați în comună lucrează în orașele mai mult sau mai puțin apropiate, ca Sighet, Baia, Borșa. Trebuie să mai adăugăm că în acest sat se găsește un atelier binecunoscut de cioplire artistică a lemnului, în care lucrează meșterul Stan Ion Pătraș, autorul sculpturilor din „Cimitirul vesel”.

În 1973, așezarea studiată a împlinit 600 de ani de existență, atestată prin documente. În adevăr, un document din 1373 menționează că „nobilii de la Zapancha” au intrat în conflict de hotar cu „oaspeții regali” din Cîmpulung la Tisa, ceea ce înseamnă că în acel an Săpînța era deja reședința unei curți feudale, fără ca din această informație să se poată deduce vechimea ei reală, care ar putea să fi fost mult mai mare <sup>4</sup>.

Din datele obținute în cursul campaniei de lucru din august 1973 în comuna Săpînța (la care au participat : Olga Necrasov, Maria-Elena Gramatopol-Roșca, Cezarina Teodorescu-Bălțeanu, Ana Lazăr-Țarcă, Olimpia Tudose, D. Botezatu, C. Neamțu, Gh. Ștefănescu și C. Feodorovici) publicăm deocamdată lucrările care urmează.

## INTRODUCTION

### RÉSUMÉ

Ce chapitre introductif présente les principales données géographiques, sociales, économiques et occupationnelles concernant le village de Săpînța, dont l'existence est documentée depuis 1373.

*Centrul de cercetări biologice Iași,  
Sectorul de ecologie umană și paleoantropologie*

Primit în redacție la 9 februarie 1974.

<sup>4</sup> Popa R., *Țara Maramureșului în veacul al XIV-lea*, Edit. Academiei, București, 1970.

# CONFORMAȚIA CEFALO-FACIALĂ, PIGMENTAȚIA ȘI TIPUL ANTROPOLOGIC LA POPULAȚIA DIN SATUL SĂPÎNȚA

DE

OLGA NECRASOV, D. BOTEZATU', SILVIA GHIGEA și C. FEODOROVICI

572.52/54

Studiul nostru pe teren realizat în vara anului 1973 se referă la 148 de bărbați și 143 de femei în vîrstă de 20—60 de ani, cu ascendenți localnici din Săpînța de cel puțin trei generații.

Prelucrarea datelor biometrice a fost făcută după tehnica lui R. Martin, cele somatoscopice corespunzînd unui program propriu avînd la bază pe acela al lui E. von Eickstedt, completat cu unele aspecte ale celui elaborat de J. Weninger. Pentru tipologie a fost utilizată metoda lui E. von Eickstedt. Prelucrarea biostatistică a fost făcută după metodele obișnuite.

Am înscris în tabelul nr. 1 parametrii de poziție și de dispersie pentru principalele dimensiuni și indici studiați, iar în tabelul nr. 2 repartiția lor pe categorii. Tabelele nr. 3, 4 și 5 prezintă datele referitoare la pigmențație.

## REGIUNEA CEFALICĂ: DIMENSIUNI ȘI CONFORMAȚIE

Așa cum rezultă din analiza cifrelor înscrise în tabelul nr. 1, calota craniană la bărbați se încadrează prin mediile dimensiunilor în categoria mijlocie spre lungă (185,25 mm), destul de largă (157,36 mm) și destul de înaltă (125,10 mm), cu o frunte aproape foarte largă (113,01 mm).

Aceleași dimensiuni ale eșantionului feminin, apreciate după scara dimorfică (cu excepția lărgimii frunții, pentru care o astfel de scară nu există), caracterizează calota craniană drept ușor alungită (177,29 mm), destul de largă (150,92 mm) și destul de înaltă (120,83 mm), fruntea oferind o medie care se încadrează după scara unitară în interiorul categoriei largi (110,02 mm). Luînd însă în considerație dimorfismul sexual, această dimensiune poate fi apreciată drept aproape foarte largă.

Tabelul nr. 1

Parametrii de poziție și dispersie a principalelor caractere antropometrice la seriile masculină și feminină din satul Săpița

Caracterul	Bărbați (N = 148)						Femei (N = 143)					
	min.	max.	M	$\pm m$	$\sigma$	V	min.	max.	M	$\pm m$	$\sigma$	V
g - op	172	204	185,25	0,32	5,83	3,14	159	189	177,29	0,31	5,53	3,11
eu - eu	143	174	157,36	0,35	6,32	4,01	138	166	150,92	0,28	5,08	3,36
ft - ft	102	123	113,01	0,23	4,26	3,76	96	121	110,02	0,23	4,17	3,79
t - v	113	133	125,10	0,25	4,52	3,61	108	133	120,23	0,26	4,65	3,86
zy - zy	131	161	145,09	0,33	6,03	4,15	123	147	135,26	0,26	4,71	3,48
go - go	99	128	111,60	0,29	5,37	4,81	92	117	104,57	0,29	5,17	4,94
n - gn	105	139	121,91	0,34	6,24	4,99	90	124	111,73	0,32	5,82	5,20
n - sto	62	89	76,45	0,25	4,52	5,91	57	79	70,22	0,14	2,62	3,73
n - sbn	42	63	53,89	0,19	3,61	6,69	42	60	50,39	0,19	3,37	4,70
al - al	26	41	33,61	0,15	2,75	8,18	26	40	30,80	0,10	1,48	5,97
Ind. cefalic	75	100	85,04	0,20	3,72	4,37	75	95	85,08	0,19	3,52	4,13
Ind. vertico-trans.	69	86	79,49	0,15	2,83	3,56	71	90	79,60	0,19	3,38	4,24
Ind. vertico-long.	60	74	67,45	0,15	2,79	4,13	59	75	67,51	0,17	3,09	4,57
Ind. fronto-pariet.	64	79	71,83	0,14	2,69	3,74	66	81	72,91	0,16	2,91	3,99
Ind. jugo-pariet.	83	100	91,14	0,17	3,12	3,42	82	97	89,68	0,16	2,88	3,21
Ind. jugo-mandib.	69	86	77,32	0,19	3,48	4,50	68	84	77,11	0,17	3,08	3,99
Ind. fronto-jugal	72	85	78,39	0,14	2,63	3,35	73	89	81,39	0,17	3,08	3,78
Ind. facial total	72	100	85,09	0,28	5,18	6,08	68	93	82,66	0,25	4,56	5,51
Ind. facial sup.	42	66	53,01	0,21	3,94	7,43	42	57	51,73	0,17	3,08	5,95
Ind. nazal	47	80	61,89	0,36	6,51	10,51	46	79	60,95	0,32	5,80	9,51
Statura			169,06	0,31	5,61	3,31			157,96	0,26	4,89	3,09



Tabelul nr. 2

Repartiția pe categorii a principalelor caractere

Caracterul	Bărbați (N = 148)			Femei (N = 143)		
	categoria	N	%	categoria	N	%
g - op Scara Lebzelter-Saller	x-169 f. scurt 170-177 scurt 178-185 mijlociu 186-193 lung 194-x f. lung	— 18 70 52 8	— 12,16 47,29 35,13 5,40	x-161 f. scurt 162-169 scurt 170-176 mijlociu 177-184 lung 185-x f. lung	1 12 50 71 9	0,69 8,39 34,96 49,65 6,29
eu - eu Scara Lebzelter-Saller	x-139 f. îngust 140-147 îngust 148-155 mijlociu 156-163 larg 164-x f. larg	— 8 45 82 13	— 5,40 30,40 55,40 8,78	x-134 f. îngust 135-141 îngust 142-149 mijlociu 150-157 larg 158-x f. larg	— 6 55 70 12	— 4,19 38,46 48,95 8,39
Indicele cefalic Scara Martin-Saller	x-70,9 hiperdolico 71-75,9 dolico 76-80,9 mezo 81-85,4 brahi 85,5-90,9 hiperbrahi 91-x ultrabrahi	— 2 27 71 42 6	— 1,35 18,21 47,97 28,37 4,05	x-71,9 hiperdolico 72-76,9 dolico 77-81,9 mezo 82-86,4 brahi 85,5-91,9 hiperbrahi 92-x ultrabrahi	— 1 28 76 36 2	— 0,69 19,58 53,14 25,17 4,39
t - v Scara Routil	x-109 f. jos 110-117 jos 118-125 mijlociu 126-133 înalt 134-x f. înalt	— 11 72 65 —	— 7,43 48,61 43,91 —	x-103 f. jos 104-111 jos 112-119 mijlociu 120-127 înalt 128-x f. înalt	— 5 67 65 6	— 3,49 46,85 45,45 4,19
Indicele vertico-longitudinal Scara Martin-Saller	x-57,9 camecefal 58-62,9 ortocefal 63-67,9 Hipsi- moderat 68-72,9 cefal mijlociu 73-x marcat	— 8 81 58 1	— 5,40 54,72 39,18 0,67	x-57,9 camecefal 58-62,9 ortocefal 63-67,9 Hipsi- moderat 68-72,9 cefal mijlociu 73-x marcat	— 10 70 57 6	— 6,99 48,95 39,86 4,19
Indicele vertico-transversal Scara Martin-Saller	x-78,9 tapeinocefal 79-84,9 metricefal 85-x acrocefal	59 83 5	39,86 56,08 3,37	x-78,9 tapeinocefal 79-84,9 metricefal 85-x acrocefal	60 76 7	41,95 53,14 4,89
ft - ft Scara Martin-Saller	x-92 f. îngustă 93-99 îngustă 100-106 mijlocie 107-113 largă 114-x f. largă	— — 14 86 48	— — 9,45 58,10 32,42	Aceeași scară ca cea masculină — 1 26 98 18	— — 0,69 18,18 68,53 12,58	
Indicele fronto-parietal Scara Martin-Saller	x-65,9 stenometop 66-68,9 metriometop 69-x eurimetop	2 22 124	1,35 14,86 83,78	Aceeași scară ca cea masculină — 15 128	— 10,48 89,52	
zy - zy Scara Lebzelter-Saller	x-127 f. îngust 128-135 îngust 136-143 mijlociu 144-151 larg 152-x f. larg	— 10 72 55 11	— 6,75 48,64 37,16 7,43	x-120 f. îngust 121-127 îngust 128-135 mijlociu 136-142 larg 143-x f. larg	— 7 76 54 6	— 4,89 53,14 37,76 4,19
n - gn Scara Lebzelter-Saller	x-111 f. joasă 112-117 joasă 118-123 mijlocie 124-129 înaltă 130-x f. înaltă	11 24 57 59 7	7,43 16,21 38,51 39,86 4,72	x-102 f. joasă 103-107 joasă 108-113 mijlocie 114-119 înaltă 120-x f. înaltă	6 23 71 34 9	4,19 16,08 49,65 23,77 6,29
Indicele facial total Scara Martin-Saller	x-78,9 hipereuriprosop 79-83,9 euriprosop 84-87,9 mezoprosop 88-92,9 leptoprosop 93-x hiperleptoprosop	21 36 49 35 7	14,18 21,32 33,10 23,64 4,72	x-76,9 hipereuriprosop 77-80,9 euriprosop 81-84,9 mezoprosop 85-89,9 leptoprosop 90-x hiperleptoprosop	14 35 50 39 5	9,45 24,47 34,96 27,27 3,49
n - sto Scara Weninger	x-58 f. jos 59-65 jos 66-70 mijlociu 71-76 înalt 77-x f. înalt	— 3 13 60 72	— 2,02 8,78 40,54 48,64	x-53 f. jos 54-59 jos 60-65 mijlociu 66-71 înalt 72-x f. înalt	— 3 17 80 43	— 2,09 11,88 55,94 30,06
Indicele facial superior Scara Martin	x-46,9 hipereurien 47-51,9 eurien 52-56,9 mezen 57-60,9 lepten 61-x hiperlepten	9 46 69 22 2	6,08 31,08 46,62 14,86 1,35	Aceeași scară ca cea masculină — 10 69 61 3 —	— 6,99 48,25 42,65 2,09 —	
go - go Scara Weninger	x-92 f. îngust 93-98 îngust 99-104 mijlociu 105-110 larg 111-x f. larg	— — 21 44 83	— — 14,18 29,72 56,08	x-85 f. îngust 86-91 îngust 92-97 mijlociu 98-103 larg 104-x f. larg	— — 14 55 74	— — 9,45 38,46 51,74
Indicele jugo-mandibular Scara Lebzelter-Saller	x-69,9 f. îngust 70-74,9 îngust 75-79,9 mijlociu 80-84,9 larg 85-x f. larg	1 34 84 28 1	0,67 22,97 56,75 18,91 0,67	x-67,9 f. îngust 68-72,9 îngust 73-77,9 mijlociu 78-82,9 larg 83-x f. larg	— 15 65 59 4	— 10,48 45,45 41,25 2,79
Indicele fronto-jugal Scara Lebzelter-Saller	x-69,9 f. îngust 70-74,9 îngust 75-79,9 mijlociu 80-84,9 larg 85-x f. larg	— 16 89 42 1	— 10,81 60,13 20,37 0,67	x-71,9 f. îngust 72-76,9 îngust 77-81,9 mijlociu 82-86,9 larg 87-x f. larg	— 8 76 52 7	— 5,59 53,14 36,36 4,89
n - sbn Scara E. von Eickstedt	x-49 f. scurt 50-52 scurt 53-55 mijlociu 56-58 lung 59-x f. lung	21 31 49 28 19	14,18 20,94 33,10 18,91 12,83	x-45 f. scurt 46-48 scurt 49-51 mijlociu 52-54 lung 55-x f. lung	16 30 49 37 11	11,18 20,97 34,26 25,87 7,69
al - al Scara E. von Eickstedt	x-30 f. îngust 31-33 îngust 34-36 mijlociu 37-39 larg 40-x f. larg	26 62 43 15 2	17,56 41,89 29,05 10,13 1,35	x-27 f. îngust 28-30 îngust 31-33 mijlociu 34-36 larg 37-x f. larg	9 75 49 6 4	6,29 52,44 34,26 4,19 2,79
Indicele nazal Scara E. von Eickstedt	x-54,9 hiperleptorin 55-59,9 leptorin 60-64,9 mezorin 65-69,9 camerin 70-x hipercamerin	27 45 38 25 13	18,24 30,40 25,67 16,89 8,78	Aceeași scară ca cea masculină — 17 59 31 24 12	— 11,88 41,25 21,67 16,78 8,39	



Considerind repartiȚia pe categorii a acestor caractere (tabelul nr. 2), notăm cĂ frecvenȚele maxime se situeazĂ, atit la bĂrbaȚi cĂt Ńi la femei, dupĂ cum urmeazĂ :

*Lungimea neurocraniului* oferĂ o concentrare majoritarĂ in categoriile mijlocie Ńi lungĂ (impuneĂ 82,42 % la bĂrbaȚi Ńi 84,61 % la femei), celelalte categorii fiind fie slab, fie deloc reprezentate. De notat inŃĂ cĂ, contrar aŃteptĂrilor, la femei categoria lungĂ este aceea care intruneŃte mai multe cazuri decit cea mijlocie, la bĂrbaȚi situaȚia fiind inversĂ.

*LĂrgimea neurocraniului* prezintĂ frecvenȚe maxime in categoriile mijlocie Ńi largĂ (impuneĂ 85,80 % la bĂrbaȚi Ńi 87,41 % la femei), cu o concentrare mai mare la ambele sexe in categoria largĂ. Celelalte categorii snt fie absente, fie reprezentate prin procente mult mai joase.

*InĂlȚimea neurocraniului* se caracterizeazĂ prin procente foarte ridicate ale categoriilor mijlocie Ńi inaltĂ (impuneĂ 92,55 % la bĂrbaȚi Ńi 92,30 % la femei, cu frecvenȚe foarte apropiate in ambele categorii). Celelalte categorii snt fie absente, fie foarte slab reprezentate.

*LĂrgimea minimĂ a frunȚii* este majoritar largĂ (58,10 % la bĂrbaȚi Ńi 68,53 % la femei), dar, in timp ce la primii frunȚile foarte largi snt inCĂ foarte bine reprezentate (32,42 %), cele mijlocii fiind mai rare (9,45 %), iar cele inġuste absente, la femei, din contra, frunȚile mijlocii intrunesc inCĂ un procent destul de apreciabil (18,18 %), cele foarte largi fiind puȚin mai rare (12,58 %). Credem inŃĂ cĂ aceste diferenȚe de frecvenȚĂ inȚre cele douĂ sexe se datoresc lipsei unei scĂri dimorfice pentru acest caracter, aŃa cum am arĂtat-o la analiza mediilor.

Combinarea diverselor dimensiuni craniene sub formĂ de indici permite sĂ se caracterizeze populaȚia studiatĂ din punctul de vedere al valorilor medii, dupĂ cum urmeazĂ :

Din punctul de vedere al indicelui cefalic, atit eŃantionul masculin, cĂt Ńi cel feminin snt in medie uŃor hiperbrahicefali (85,04 Ńi 85,08). Aceste medii corespund unor frecvenȚe unde dominĂ formele brahicefale moderate, urmate de cele hiperbrahicefale, formĂnd impuneĂ o majoritate substanȚialĂ (76,34 Ńi 78,31 %); mezocefalii se situeazĂ pe al treilea loc. Procentele care revin ultrabrahicefaliilor Ńi dolicocefaliilor moderate snt negliabile, dolicocefalii accentuaȚi fiind absenȚi.

Indicii vertico-longitudinali medii se inCădreazĂ atit la bĂrbaȚi cĂt Ńi la femei in categoria hipsicranĂ moderatĂ (67,45 Ńi 67,51), aceste valori corespunzĂnd unei frecvenȚe majoritare a categoriilor hipsicefalĂ moderatĂ Ńi hipsicefalĂ mijlocie (luate impuneĂ 93,90 Ńi 88,81 %); urmeazĂ apoi, in procente foarte joase, categoria ortocefalĂ, precum Ńi cea hipsicefalĂ accentuatĂ. Categoria camecefaliilor nu este deloc reprezentatĂ.

*Indicii vertico-transversali* oferĂ medii care corespund categoriei metriocefale moderate atit in eŃantionul masculin, cĂt Ńi in cel feminin (79,49 Ńi 79,60). RepartiȚia pe categorii este caracterizatĂ printr-o concentrare in categoria metriocefalĂ (56,08 Ńi 53,14 %), urmĂnd apoi categoria tapeinocefalĂ, cu procente inCĂ foarte apreciable (39,86 Ńi 41,95 %), in timp ce categoria acrocefalĂ este foarte rar inȚilnitĂ, datoritĂ in special dezvoltĂrii relativ mari a lĂrgimii calotei craniene, care intrĂ in componenȚa acestui indice.

*Indicele fronto-parietal* este caracterizat prin medii ce aparțin categoriei eurimetope în ambele eșantioane (71,89 și 72,91), precum și printr-o repartitie în care domină numeric această din urmă categorie (83,78 și 89,52%), cea metriometopă fiind mult mai puțin frecventă, iar cea stenometopă excepțional prezentă (și numai în seria masculină).

### REGIUNEA FACIALĂ: DIMENSIUNI ȘI CONFORMAȚIE

Valorile medii ale principalelor dimensiuni ale feței ne indică o populație caracterizată, atât la bărbați cât și la femei, prin fețe în medie mijlociu de largi (145,09 și 135,26 mm) și mijlociu de înalte (121,91 și 111,73 mm), cu dimensiunea verticală a masivului facial propriu-zis încadrată în categoria înaltă (76,45 și 70,22 mm) și cu lărgimea mandibulară destul de pronunțată (111,60 și 104,56 mm).

Combinarea acestor dimensiuni caracterizează ambele eșantioane drept în medie mesoprosope (85,09 și 82,66), cu masivul facial mezen (53,01 și 51,73) și cu raportul jugo-mandibular de tip mijlociu (77,32 și 77,11).

În ceea ce privește raporturile cranio-faciale transversale, ele sînt caracterizate prin indici fronto-jugali medii aparținînd categoriei mijlocii (78,39 și 81,39) și prin indici parieto-jugali medii aparținînd categoriei mesopside la bărbați (91,14) și micropside la femei (89,68).

Repartitia pe categorii a dimensiunilor studiate și a indicilor prezintă următoarele caracteristici :

*Lărgimea bizigomatică* (jugală) se caracterizează prin predominanța, atât la bărbați cât și la femei, a dimensiunilor mijlocii (48,64 și 53,14%), urmate de cele largi (37,16 și 37,76%), celelalte două categorii fiind slab reprezentate (și aproape la paritate).

*Înălțimea totală a feței* oferă la bărbați o oarecare concentrare în categoriile înaltă și mijlocie (39,86 și 38,51%), urmate de categoria joasă (16,21%), celelalte două clase fiind mult mai puțin frecvente. La femei, categoria mijlocie este aceea care predomină, întrunind aproape jumătate din cazuri (49,65%), urmată mai întii de categoria înaltă (23,77%) și apoi de cea joasă (16,08%). Categoriile extreme sînt și aici mai slab reprezentate. În comparație cu bărbații însă, fețele foarte înalte sînt mai frecvente, cele foarte joase fiind mai puțin numeroase.

*Indicele facial total* oferă la ambele sexe o repartitie mai puțin concentrată decît dimensiunile componente. În adevăr, dacă atât la bărbați cât și la femei categoria cea mai frecventă este cea mesoprosopă (33,10 și 34,96%), categoriile euriprosopă și leptoprosopă sînt încă bine reprezentate (la bărbați 24,32 și 23,64%, iar la femei 24,47 și 27,27%). De notat că și categoriei hipereuriprosope îi corespunde un procent destul de ridicat la bărbați (14,18%), fiind însă mai mic la femei (9,45%). Cealaltă categorie extremă, hiperleptoprosopă, se întilnește foarte rar.

*Înălțimea superioară a feței* cea mai frecventă se situează în categoriile foarte înaltă și înaltă la bărbați (cu 48,64 și 40,54%). La femei această situație este inversată, categoria înaltă întrunind mult mai multe cazuri decît cea foarte înaltă (55,94 și 30,06%). La ambele sexe, aceste

două categorii întrunesc majoritatea subiecților. Categoria mijlocie și apoi cea a masivelor faciale joase sînt mult mai puțin reprezentate, categoria masivelor faciale foarte joase fiind absentă.

Dacă comparăm frecvențele majoritare ale înălțimii totale a feței cu acelea ale masivului facial propriu-zis, constatăm că la acesta din urmă valorile cele mai frecvente corespund categoriilor înaltă și foarte înaltă, în timp ce la prima ele se situează în categoriile mijlocie și înaltă. Această deplasare a ponderii frecvențelor ne arată că înălțimea etajului inferior al feței (care corespunde cu înălțimea mandibulei) este în medie relativ moderată, ceea ce constituie un fapt interesant pentru tipologia populației studiate.

*Indicele facial superior*, ale cărui valori individuale depind atît de înălțimea masivului facial, cît și de lărgimea bizigomatică, prezintă la bărbați o concentrare maximă în categoria mezenă (46,62%), urmată de cea eurienă (31,08%), categoria leptenă fiind relativ slab reprezentată (14,86%); celelalte categorii oferă frecvențe aproape neglijabile. La femei, categoria cea mai bine reprezentată este cea eurienă (48,25%), urmată foarte îndeaproape de cea mezenă (42,62%). Celelalte două categorii (leptenă și hipereurienă) sînt puțin frecvente, iar cea hiperleptenă absentă.

*Lărgimea bigoniană* oferă o distribuție în care predomină mandibulele foarte largi atît la femei cît și la bărbați, urmate de cele largi, care, luate împreună, întrunesc majoritatea (85,80 și 90,20%), mandibulele mijlocii fiind mult mai rare, iar cele înguste absente. De notat faptul că la femei mandibulele foarte largi sînt mai puțin frecvente decît la bărbați, cele largi fiind în schimb mai numeroase.

*Indicele jugo-mandibular* oferă la bărbați o concentrare puternică în categoria mijlocie (56,75%), urmată de cea îngustă (22,97%) și apoi de cea largă (18,91%), cele două categorii extreme fiind foarte puțin reprezentate. La femei, categoria mijlocie (45,45%) este aproape tot atît de frecventă ca cea largă (41,25%), cea îngustă fiind mult mai rar întilnită (10,48%). Dintre categoriile extreme, numai cea foarte largă găsește cîțiva reprezentanți.

Dintre raporturile cranio-faciale transversale, *indicele fronto-jugal* cel mai frecvent întilnit în ambele eșantioane este cel mijlociu (60,13 și 53,14%), urmat de cel larg, cu procente mai ridicate însă în seria feminină decît în cea masculină (36,36 și 20,37%), unde indicii înguști sînt în schimb mai frecvenți decît în prima (10,81 și 5,59%). Indicii foarte înguști lipsesc, în timp ce indicii foarte largi sînt prezenți, dar cu o frecvență neglijabilă la bărbați.

*Dimensiunile nasului* prezintă o distribuție foarte răspîdită în ambele eșantioane. Vom nota totuși pentru lungimea nazală o oarecare concentrare în clasa mijlocie (33,10 și 34,26%), categoriile scurtă și lungă fiind mai puțin frecvente (20,94 și 18,91% la bărbați; 20,97 și 18,91% la femei). În ceea ce privește lărgimea nazală, maximul de frecvență se situează în categoria îngustă, urmată de cea mijlocie și apoi de cea foarte îngustă la bărbați (întrunind împreună 88,50%); la femei frecvența maximă corespunde tot cu categoria îngustă, urmată de cea mijlocie (formînd împreună 86,70%), celelalte categorii fiind mult mai puțin frecvente.

*Indicele nazal* este și el foarte puțin concentrat în ceea ce privește repartitia procentuală după categorii, care sînt toate prezente (inclusiv cea hiperkamerină, care este însă puțin frecventă 8,78 și 8,39%) în ambele serii. Frecvențele maxime revin în primul rînd categoriei leptorine (30,40 și 41,25%), urmată de cea mezorină (25,67 și 21,67%), celelalte categorii întrunind procente mai joase.

### PIGMENTAȚIA OCHILOR ȘI A PĂRULUI

În tabelele nr. 3 și 4, dăm repartitia subiecților după culoarea ochilor și a părului.

Tabelul nr. 3

Repartitia procentuală a culorii irisului (scara Martin-Schultz)

Culoarea	Bărbați		Femei	
	N	%	N	%
Deschisă (1 a – 2 b)	16	10,88	28	19,58
Intermediară (3–11)	56	38,09	58	40,55
Închisă (12–14)	75	51,02	57	39,86
Total	147	99,99	143	99,99

Din analiza frecvențelor constatăm că la bărbați predomină culoarea închisă a irisului, urmată de cea intermediară, nuanțele deschise fiind mult mai rare.

La femei, distribuția culorilor este puțin diferită de cea precedentă, ochii de nuanță închisă și cei intermediari întrunind procente aproape asemănătoare, cei de nuanță deschisă fiind de două ori mai frecvenți decît la bărbați. Pigmentația irisului este astfel în ansamblu mai deschisă în eșantionul feminin.

Tabelul nr. 4

Repartitia procentuală a culorii părului

Culoarea	Bărbați		Femei	
	N	%	N	%
Blondă închis (M – O)	—	—	—	—
Castanie (P – T)	17	11,56	18	12,58
Brună (U – Y)	128	87,08	125	87,41
Roșcată (I – VI)	2	1,36	—	—

Pigmentația părului oferă însă o distribuție aproape identică la cele două sexe, marcată prin predominanța părului brun, frecvența mică a celui castaniu și absența părului blond. Singura diferență dintre cele două eșantioane constă astfel doar în prezența a două cazuri de păr roșcat la cel masculin.

În tabelul nr. 5 prezentăm diferitele combinații individuale între culoarea părului și cea a irisului.

La bărbați, așa cum era de așteptat, combinația cea mai frecvent întâlnită este cea armonică brună, care se întâlnește la aproape jumătate din subiecți, urmînd apoi combinația disarmonică păr brun — ochi intermediari. Luate împreună, aceste două combinații întrunesc 78,90%,

Tabelul nr. 5

## Asocieria tipului pigmentar al irisului cu cel al părului

Culoarea irisului	Sexul	Culoarea părului					
		castanie		brună		roșcată	
		N	%	N	%	N	%
Deschisă	♂	4	2,42	12	8,16	—	—
	♀	7	4,89	21	14,68	—	—
Intermediară	♂	10	6,80	44	29,93	2	1,36
	♀	9	6,29	49	34,26	—	—
Închisă	♂	3	2,04	72	48,97	—	—
	♀	2	1,39	55	38,46	—	—

reprezentînd astfel majoritatea subiecților cercetați. Restul de 21,10% se repartizează în celelalte combinații. Dintre acestea, numai combinațiile păr brun — iris deschis și păr castaniu — iris intermediar sînt puțin mai bine reprezentate. De notat că cei doi subiecți cu părul roșcat prezintă irisul de tip intermediar.

La femei, maximum de frecvență revine combinațiilor păr brun — iris închis și păr brun — iris intermediar (cu frecvențe aproape egale), întrunind împreună 72,72% din subiecți. Dintre celelalte combinații întîlnite în acest eșantion, cea cu părul brun — iris deschis, precum și cea cu părul castaniu — iris intermediar sînt reprezentate prin procente ce pot fi luate în considerație, celelalte combinații oferind doar frecvențe minime.

De notat absența la ambele sexe a combinațiilor armonice deschise.

## STATURA

Cu toate că acest caracter va fi studiat în mod aprofundat în cadrul unei lucrări consacrate conformației corporale, totuși trebuie să analizăm aici unele caracteristici.

Astfel, media staturii masculine (169,06 cm) se înscrie în categoria supramijlocie la limita cu categoria mare. La femei corespunde aceleiași categorii din scara dimorfică, situîndu-se însă mai aproape de limita inferioară a acesteia (157,96 cm).

Repartiția acestei dimensiuni este din cele mai răspîndite, neîntîlnindu-se aici decît categoriile foarte mici și gigantice. Totuși trebuie notat că frecvențele maxime (puțin peste 40%) aparțin categoriei taliilor mari atît la femei cît și la bărbați.

## CARACTERISTICILE GENERALE ȘI TIPOLOGICE

În ansamblu, cele două eșantioane ale satului Săpînța caracterizează populația respectivă ca fiind în medie de statură supramijlocie, ușor hiperbrahicefală, cu o calotă înaltă (hypsicefală) în raport cu lungimea neurocraniului, dar mijlociu de înaltă (metriocefală) în raport cu lărgimea acestuia, cu fruntea largă (atît din punctul de vedere absolut, cît și relativ), cu occipitalul fie moderat bombat, fie ușor aplatisat. Fața este în medie mezoprosopă destul de înaltă, dar totodată și destul de largă, cu masivul facial mezen prezentînd de obicei malare mai mult sau mai puțin frontalizate și mai rar dispuse temporal. Forma conturului facial este cel mai frecvent oval alungită dreptunghiulară atenuată sau tinzînd spre un triunghi și mai rar rotundă sau pentagonală. Nasul este în medie de tip mezin și tendințe spre leptorinie, cu spinarea dreaptă sau ușor convexă și foarte rar concavă. Pigmentația cel mai frecvent întilnită la bărbați este cea armonică brună, urmată de cea disarmonică (păr brun — ochi intermediari), la femei aceste două combinații mergînd aproape la paritate.




Această caracterizare de ordin populaționist, completată cu analiza frecvențelor procentuale ale diferitelor categorii la caracterele studiate (prezentate mai sus), precum și cu diagnozele individuale (după metoda lui E. von Eickstedt), ne permite să conchidem că structura antropologică a populației de la Săpînța se integrează în marea rasă europoidă și numai 8 subiecți din cei aproape 300 studiați oferă slabe elemente mongoloide, grefate pe fondul europoid.


Aprofundînd analiza tipologică pînă la nivelul tipurilor secundare, constatăm că elementele caracteristice fiecărui dintre acestea se află de cele mai multe ori dispersate și combinate pe plan individual cu elemente proprii altor tipuri. Totuși trebuie să subliniem că elementele unora din aceste variante ale rasei europoide se află mai puternic concentrate la unii subiecți, conferindu-le un facies predominant, cel puțin la nivel de fenotip. Astfel este cazul tipului *dinaric*, care constituie adeseori elementul dominant al unor subiecți, chiar dacă este asociat cu cîteva trăsături nordice, mediteranide, alpine sau esteuropide. Din aceste asociații, cel mai frecvent întilnite sînt, în ordinea enumerării, asociațiile dinaro-nordică, dinaro-mediteranidă, dinaro-alpină, dinaro-esteuropidă, dinaro-nordico-mediteranidă, dinaro-nordico-alpină, dinaro-nordico-esteuropidă.



Apreciînd cantitativ aportul fiecărei variante europoide la structura acestei populații, așa cum aceasta apare fenotipic, putem conchide că sîntem în prezența unui fond principal dinaro-nordico-alpin, cu importante influențe mediteranide, cu unele adaosuri esteuropide și foarte rare elemente dalice. Prin aceste caracteristici de ordin tipologic, ca și prin caracteristicile de ordin biometric considerate pe plan populaționist, populația din Săpînța se integrează în limitele de variabilitate a celorlalte unități demografice din Maramureșul istoric<sup>1</sup>, studiate de noi pînă în prezent.


<sup>1</sup> M. Cristescu și colab., *Studiul antropologic complex al populațiilor de pe Valea Cosăului* (jud. Maramureș), Iași, 1972.











# LA CONFORMATION CÉPHALO-FACIALE, LA PIGMENTATION ET LE TYPE ANTHROPOLOGIQUE DE LA POPULATION DE SĂPÎNȚA

## RÉSUMÉ

Le travail est consacré à l'étude de la variabilité des dimensions et des indices principaux du neurocrâne et de la face, de la pigmentation ainsi que de la structure typologique de la population de Săpînța, réalisée au moyen d'un échantillon de 147 hommes et d'un échantillon de 143 femmes (âgés de 20—60 ans).

Le tableau 1 comprend les principaux paramètres statistiques, le tableau 2 présente la répartition selon les catégories des principaux caractères, les tableaux 3, 4 et 5 contiennent les données concernant les caractères pigmentaires.

Toutes ces données, ainsi que l'analyse des caractéristiques individuelles de chaque sujet du point de vue typologique permettent de caractériser la structure anthropologique de la population respective comme appartenant au complexe dinaro-alpino-nordique, à puissante influence méditerranéenne, auquel viennent se joindre quelques éléments est-européens ainsi que de très rares éléments daliques et mongoloïdes.

## BIBLIOGRAFIE

1. CRISTESCU M., BOTEZATU D., GRAMATOPOL-ROȘCA M.-E., FEDOROVICI C., *Studiul morfologic și tipologic al populației din satul Giulești (jud. Maramureș) cu o privire specială asupra evoluției diacronice a unor caractere*, St. cerc. antropol., 1971, **8**, 1, 99.
2. CRISTESCU M., BOTEZATU D., TUDOSE O., *Variabilitatea caracterelor cefalo-faciale și tipul antropologic al populației din Săliștea de Sus (jud. Maramureș)*, St. cerc. antropol., 1972, **9**, 2, 177.
3. NECRASOV O., CRISTESCU M., BOTEZATU D., FEDOROVICI C., *Studiul regiunii cefalo-faciale, al pigmenției și al tipului antropologic din satele Cuhea, Ieud și Dragomirești (jud. Maramureș)*, St. cerc. antropol., 1968, **5**, 2, 188.
4. NECRASOV O., CRISTESCU M., BOTEZATU D., FEDOROVICI C., *Studiul morfologic și tipologic al populației din satul Mara (jud. Maramureș)*, St. cerc. antropol., 1971, **8**, 2, 183.
5. NECRASOV O., *Les caractéristiques morphologiques et sérologiques de la population roumaine* Rivista di Antropologia, 1970—1971, **LVII**, 5.

Centrul de cercetări biologice Iași,  
Sectorul de ecologie umană și paleoantropologie



# STUDIUL FRECVENȚEI GRUPELOR SANGUINE DIN SISTEMUL 0 AB ȘI A FACTORILOR LOR EREDITARI LA POPULAȚIA DIN SĂPÎNȚA

DE

CEZARINA-ANA BĂLTEANU ȘI MARIA-ELENA GRAMATOPOL-ROȘCA

612.118.221.2 :575.1

Cercetările antropologice complexe asupra populației din Maramureș, realizate de mai mulți ani de colectivul ieșean, au inclus și studiul frecvenței principalelor grupe sanguine. Pe linia acestor cercetări se înscrie și lucrarea de față.

## MATERIAL ȘI METODĂ DE LUCRU

Studiul nostru este realizat pe o serie de 385 de indivizi originari din satul Săpînța. Datele obținute de noi sînt comparate cu cele obținute la trei serii sintetice : populația din valea râului Iza (eșantioane de populație din satele Ieud, Bogdan Vodă, Dragomirești (1), Săliște (4)), populația din valea râului Mara (eșantioane din satele Mara (10), Giulești (9), Berbești, Desești, Hărniciești (date inedite)), precum și seria sintetică a ansamblului de populație din județul Maramureș (7).

## REZULTATE

În tabelul nr. 1 este dată frecvența grupelor sanguine din sistemul 0 AB, a factorilor ereditari și a indicelui biochimic în satul Săpînța, precum și în eșantioanele de comparație considerate.

Din datele obținute pentru satul Săpînța, frecvența grupelor sanguine are următoarea eșalonare : grupa A 37,41%, grupa 0 27,53%, grupa B 26,23%, grupa AB 8,83%. Valoarea indicelui biochimic este de 1,31. Valorile factorilor genetici sînt :  $r = 0,5172$ ,  $p = 0,2771$  și  $q = 0,2055$ .

Tabelul nr. 1

Frecvența grupelor sanguine din sistemul OAB, a factorilor ereditari și a indicelui biochimic

Localitatea	Nr. indiv.	0	A	B	AB	$\chi^2$	Indice biochimic	r	p	q
Săpînța (Bălceanu și Roșca, 1973)	385	106 27,53 $\pm 2,23$	144 37,41 $\pm 2,44$	101 26,23 $\pm 2,23$	34 8,83 $\pm 1,41$	33,36	1,31	0,5172	0,2771	0,2055
Valea Izei (Botezatu și colab., 1968; Neamțu și Bălceanu, 1971)	1402	430 30,67 $\pm 1,00$	674 48,07 $\pm 1,00$	210 14,98 $\pm 0,94$	88 6,27 $\pm 0,64$		2,56	0,5487	0,3305	0,1207
Valea Marei (Bălceanu și Radu, 1970-1971)	2074	557 26,85 $\pm 0,96$	1015 48,93 $\pm 1,00$	359 17,31 $\pm 0,82$	143 6,89 $\pm 0,54$	24,74	2,30	0,5096	0,3464	0,1439
Jud. Maramureș (O. Necrasov și colab., 1967)	1497	516 34,53 $\pm 1,28$	616 41,01 $\pm 1,40$	255 17,01 $\pm 0,96$	110 7,34 $\pm 0,13$	20,10	1,97	0,5887	0,2820	0,1310

În scopul de a stabili dacă frecvențele observate sînt în conformitate cu frecvențele teoretice corespunzătoare existenței echilibrului Hardy-Weinberg într-o populație, a fost calculat testul  $\chi^2$  după următoarea formulă, utilizată de Kherumian (2):

$$\frac{1}{N} \chi^2 = \frac{(0 - r^2)^2}{-r^2} + \frac{[A - (p^2 + 2pr)]^2}{p^2 + 2pr} + \frac{[B - (q^2 + 2qr)]^2}{q^2 + 2qr} + \frac{(AB - 2pq)^2}{2pq}$$

Aplicînd această formulă de calcul, testul  $\chi^2$  dă o valoare de 2,46 (pentru 1 grad de libertate), care corespunde unui  $0,20 > P > 0,10$ , deci superior lui  $P = 0,05$ , limita de justețe a ipotezei. Întrucît testul  $\chi^2$  arată că frecvențele observate sînt în conformitate cu cele teoretice, rezultă că frecvențele genice ale sistemului OAB în populația studiată de noi se află în echilibrul Hardy-Weinberg.

Comparîndu-se datele noastre cu cele obținute pentru satele din valea Izei, se constată în general frecvențe deosebite. Astfel se remarcă o frecvență mai mare a grupelor B și AB la prima serie, pe cînd grupele A și 0 se prezintă cu o frecvență mai scăzută.

În ceea ce privește frecvența grupelor sanguine la populația noastră comparativ cu fiecare din satele componente ale seriei sintetice, se remarcă o diferențiere în același sens.

Valoarea testului  $\chi^2$  de 33,36 (pentru 3 grade de libertate), care corespunde unui  $P < 0,001$ , indică o diferențiere foarte semnificativă a celor două serii.

Valoarea indicelui biochimic obținut la Săpînța este inferioară celei obținute pe eșantionul de comparație, datorită frecvenței mai scăzute a grupei A și mai ridicate a grupei B în primul caz față de al doilea. De asemenea, valorile factorilor genetici r și p sînt inferioare celor



obținute la eșantionul de comparație, pe cînd valoarea factorului  $q$  este superioară.

Analizînd comparativ frecvența grupelor sanguine la populația din Săpînța față de seria sintetică a populației de pe valea Marei, se constată valori mai ridicate pentru grupele B și AB și valori mai scăzute pentru grupele A și 0 la prima populație față de ultima. Menționăm că diferențele semnificative din punct de vedere statistic ( $\chi^2 = 24,74$ , pentru 3 grade de libertate  $P < 0,001$ ) sînt mai mici decît cele obținute la comparația cu populația de pe valea Izei.

De asemenea, sensul diferențierii se menține și față de majoritatea satelor din seria sintetică a populației de pe valea Marei, exceptînd satul Desești, la care grupele sanguine au o frecvență asemănătoare cu cea a populației noastre (grupa 0 30,59%, grupa A 38,80%, grupa B 23,88%, grupa AB 6,71%). În acest caz, valoarea lui  $\chi^2 = 1,82$ , pentru 3 grade de libertate  $0,70 > P > 0,50$ , este inferioară celei înregistrate la seria sintetică.

Valoarea indicelui biochimic la populația noastră este tot inferioară celei obținute la seria sintetică de pe valea Marei.

În ceea ce privește frecvența factorilor genetici, diferențierea se face în același sens cu cea rezultată din comparația cu populația de pe valea Izei pentru  $p$  și  $q$ . În schimb, factorul  $r$  prezintă o valoare puțin mai ridicată la populația noastră față de cea de pe valea Marei.

Frecvența grupelor sanguine la populația din Săpînța este diferită și față de seria sintetică obținută pe ansamblul populației din județul Maramureș (studiată de Olga Necrasov și colab., 1967). Astfel, valoarea lui  $\chi^2$  este de 20,10 (pentru 3 grade de libertate corespunzător unui  $P < 0,001$ ), mai mică decît cele obținute comparativ cu celelalte două serii sintetice. Această diferențiere se datorează și în acest caz frecvenței mai mari a grupelor B și AB, asociată cu o frecvență mai scăzută a grupelor A și 0 la populația noastră.

Deoarece diferențele în repartitia grupelor sanguine la populația din Săpînța față de populația din județul Maramureș sînt mai mici decît cele rezultate din comparația cu celelalte două serii, valoarea indicelui biochimic este și ea mai puțin diferită, rămîinînd însă tot scăzută la populația noastră.

Din analiza comparativă a celor două serii considerate reiese că frecvența factorilor genetici  $r$  și  $p$  este mai mică la populația din Săpînța, în timp ce frecvența factorului genetic  $q$  este mai crescută.

În concluzie, populația din satul Săpînța prezintă în ceea ce privește frecvența grupelor sanguine din sistemul 0 AB diferențe semnificative atît față de seria sintetică a populației de pe valea Izei și valea Marei, cît și față de ansamblul populației din județul Maramureș. Această diferență se manifestă în frecvența crescută a grupelor B și AB și mai coborîtă a grupei A. Menționăm că frecvențe asemănătoare prezintă și populația studiată de noi din satul Desești, situat pe valea riului Mara. Frecvența mică a grupei A (36,95%) s-a mai înregistrat și la populația din satele Costești și Ludești din Transilvania, populație studiată de Rîmneanțu în 1938 (citată după (7)), iar frecvența mare a grupei B (23,57%) a fost notată în satul Dumbrăveni-Suceava, cercetat de O. Necrasov și colab. în 1964.

# SUR LA FRÉQUENCE DES GROUPES SANGUINS DU SYSTÈME OAB ET DE LEURS FACTEURS HÉRÉDITAIRES DANS LA POPULATION DE SĂPÎNȚA

## RÉSUMÉ

Les auteurs analysent les fréquences des groupes sanguins et de leurs facteurs héréditaires ainsi que l'indice biochimique de la population étudiée. Les résultats sont comparés avec ceux qui furent obtenus pour les mêmes caractères dans d'autres villages du même département. Du point de vue de la fréquence assez élevée du groupe B, de la fréquence assez basse du groupe A, ainsi que de la valeur de l'indice biochimique, la population de Săpînța se rapproche le plus du village de Desești (du même département), ainsi que de quelques autres localités de notre pays.

## BIBLIOGRAFIE

1. BOTEZATU D., GHEORGHIU G., KLÜGER R., *Frecvența proprietăților grupale din sistemul OAB în satele Cuhea, Ieud și Dragomirești*, St. cerc. antropol., 1968, 5, 2, 215.
2. KHERUMIAN R., *Génétiqne et anthropologie des groupes sanguins*, Paris, 1951.
3. MOURANT A. E., KOPÈC ADA, SOB CZAK KAZIMIERA-DOMANIEWSKA, *The ABO blood groups*, Oxford, 1958.
4. NEAMȚU C., TEODORESCU-BĂLTEANU CEZARINA-ANA, *Repartiția grupelor sanguine din sistemul OAB și MN și a factorilor ereditari în satul Săliște*, St. cerc. antropol., 1972, 9, 2, 201.
5. NECRASOV OLGA, *Recherches anthropologiques dans le N-E de la Roumanie*, Anal. științ. Univ. Iași, 1940.
6. NECRASOV OLGA, *Recherches séro-anthropologiques dans les Carpates roumaines*, Acta Facultatis rerum naturalium, Comeniana, Anthropol., 1966, XI.
7. NECRASOV OLGA, BOTEZATU D., IACOB M., *Considération sur la répartition des groupes sanguins du système OAB et leurs facteurs héréditaires en Roumanie*, Ann. roum. Anthropol., 1967, 4, 17.
8. RACE R. R., SANGER RUTH, *Blood groups in man*, Oxford, 1958.
9. TEODORESCU-BĂLTEANU A. C., RADU D., *Studiul frecvenței grupelor sanguine din sistemele OAB și MN în satul Giulești*, St. cerc. antropol., 1971, 8, 129.
10. TEODORESCU-BĂLTEANU A. C., RADU D., *Studiul frecvenței grupelor sanguine din sistemele OAB și MN în satul Mara*, St. cerc. antropol., 1971, 8, 209.

*Centrul de cercetări biologice Iași,  
Sectorul de ecologie umană și paleoantropologie*

# VARIABILITATEA UNOR CARACTERE FIZIOMETRICE LA POPULAȚIA DIN SĂPÎNȚA

de

C. NEAMȚU și D. BOTEZATU

572.541.3

În această lucrare ne propunem să abordăm studiul variației unor caractere fiziometrice la etape diferite de vîrstă (între 20 și 79 de ani) pe un eșantion din populația localității Săpînța din județul Maramureș.

Am considerat utilă investigarea acestor aspecte avînd în vedere importanța manifestărilor funcționale ale organismului pentru viață și muncă, ca și frecvența redusă a cercetărilor de acest gen la nivel populaționist.

## METODĂ ȘI MATERIAL DE LUCRU

S-au calculat valorile medii pentru următoarele caractere :

— presiunea arterială sistolică și diastolică (determinarea presiunii s-a făcut cu ajutorul aparatului Vaquez-Laubry);

— capacitatea vitală (determinată cu ajutorul spirometrului uscat tip H. Dette);

— ritmul cardiac (măsurarea pulsului radial — frecvență/minut);

— ritmul respirator (numărul de respirații/minut);

— acuitatea vizuală (recoltarea datelor s-a realizat cu ajutorul optotipului; rîndurile acestuia au fost numerotate (codificate) progresiv de la 1 la 10 (cifra 1 desemnînd rîndul cu caractere mici, iar cifra 10 rîndul cu caractere mari), operațiunile pentru calcularea lui  $M$ ,  $m$  și  $\sigma$  făcîndu-se cu cifrele de codificare corespunzătoare rîndului vizualizat; s-a considerat normală vizualizarea rîndului cu caracterele cele mai mici de la distanța de 5 m);

— acuitatea tactilă (mediile reprezintă distanța cutanată cea mai mică (în mm), în toate zonele, la care este sesizată existența celor două vîrfuri tocite ale unui compas adaptat; testul s-a efectuat cutanat în

regiunea vârfului indexului, fața posterioară a mîinii și fața anterioară a antebrațului drept);

— forța musculară (determinată cu dinamometru (tip Collin) prin mai multe încercări la același individ (mîna dreaptă), luîndu-se în considerație cifra cea mai mare obținută).

Materialul de studiu este reprezentat de un eșantion din populația satului Săpînța, și anume de 201 bărbați și 190 de femei, repartizați pe indicatorii fiziometrici studiați după cum urmează: capacitate vitală și talie — 191 bărbați și 190 femei; dinamometrie — 201 bărbați și 183 femei; presiune arterială, ritm respirator și cardiac, acuitate tactilă și vizuală — 123 bărbați și 121 femei. Analiza indicatorilor fiziometrici s-a făcut decadal, pe etape de vîrstă și pe sexe.

Au fost eliminate la examinare persoanele ce prezentau afectări ale aparatelor studiate.

Subiecții au fost examinați în vara anului 1973.

## REZULTATE

Urmărind indicatorul presiune arterială sistolică, se observă (tabelul nr. 1) creșterea presiunii sistolice progresiv cu vîrsta, de la 12,99 la 15,05 cm Hg la bărbați și de la 12,67 la 15,85 cm Hg la femei (excepție face clasa de vîrstă 70—79 ani bărbați, care prezintă valori mai mici decît clasa de vîrstă 60—69 ani). Creșteri mai accentuate se produc după vîrsta de 50 ani, atingînd uneori cifra de 100 mm Hg pe decada de vîrstă la femei.

Valoarea medie a presiunii sistolice la bărbați (serie sintetică) este mai ridicată decît la femei (14,35 față de 13,37 cm Hg), dar, analizînd acest aspect pe etape de vîrstă, constatăm că sexul feminin în primele decade de vîrstă (20—40 ani) are presiunea mai coborîtă decît sexul masculin. La femei, după menopauză valorile tind să depășească pe cele ale sexului masculin, confirmînd datele lui Hunter obținute prin studierea valorilor medii la americanii sănătoși (6).

În ceea ce privește presiunea arterială diastolică (tabelul nr. 1), se constată creșterea valorilor medii cu vîrsta, mai constant la sexul feminin.

Cercetări similare efectuate de Löwenstein în regiuni izolate ale Braziliei au constatat de asemenea valori ale presiunii sistolice mai mari la bărbați decît la femei pînă la vîrsta de 35—40 de ani, pentru ca după această etapă valorile presiunii sistolice să fie mai mici la bărbați. Presiunea diastolică a prezentat variații mici (3).

Se pare că în timpul perioadei reproductive femeia este relativ mai ferită decît bărbatul de riscul aterosclerozei și al sechelelor grave ale acesteia; de asemenea este mai protejată pînă la menopauză față de mecanismele care cresc presiunea.

Se acreditează ideea că creșterea tensiunii arteriale este o consecință a civilizației. În scopul confirmării acestei ipoteze este necesar să se studieze mai multe grupuri de populații trăind sub influența a divers factori ecologici. Din cauza schimbării rapide a naturii și intensității

Tabelul nr. 1

## Valorile medii comparative ale tensiunii arteriale sistolice

Clasa de vîrstă (ani)	Seria Neamțu C., Botezatu D. (1972)										Seria Löwenstein (1961)			
	B ă r b a ți					F e m e i					Bărbați		Femei	
	Nr.	Min – Max	M	m	σ	Nr.	Min – Max	M	m	σ	Nr.	M	Nr.	M
20–29	11	11–14	12,99	0,18	0,90	25	10–15	12,67	0,44	3,27	10	11,72	15	10,43
30–39	25	10–15	13,17	0,14	1,31	20	9–16	12,90	0,25	1,71	13	10,89	10	10,90
40–49	36	10–17	13,18	0,19	1,70	23	10–16	13,28	0,18	1,34	8	11,55	6	11,17
50–59	26	11–18	13,49	0,20	1,52	22	11–17	14,49	0,24	1,69	5	13,28	3	10,67
60–69	15	10–21	15,05	0,54	3,11	18	12–19	15,53	0,47	2,97	–	–	–	–
70–79	10	12–16	14,42	0,28	1,34	5	12–20	15,85	0,44	1,49	–	–	–	–
Serie sintetică	123	10–21	14,35	0,16	2,77	121	9–10	13,37	0,20	3,42	–	–	–	–

## Valorile medii comparative ale tensiunii arteriale diastolice

20–29	11	7–9	8,45	0,12	0,67	25	6–10	7,87	0,13	1,00	10	7,14	15	6,48
30–39	25	6–8	8,13	0,18	1,36	20	6–12	8,55	0,23	1,54	13	7,34	10	7,28
40–49	36	6–11	8,28	0,13	1,28	23	6–11	8,24	0,17	1,22	8	7,33	6	7,07
50–59	26	7–13	8,37	0,17	1,32	22	7–10	8,82	0,15	1,11	5	7,72	3	7,00
60–69	15	6–11	8,92	0,28	1,50	18	8–12	9,98	0,17	1,09	–	–	–	–
70–79	10	6–10	8,68	0,30	1,36	5	7–11	8,45	0,52	1,73	–	–	–	–
Serie sintetică	123	6–11	8,36	0,06	1,03	121	6–12	8,61	0,08	1,33	–	–	–	–

acestor factori, achiziția unor astfel de date este de mare urgență (3).

Aparatul respirator este unul din primele aparate la care se constată semne de involuție. Acestea pot fi datorate alterării cutiei toracice (Kountz și Alexander, Zagra), tulburării dinamicii bronhiale (Mellie) sau modificării țesutului elastic pulmonar (Pierce, Aslan, toți citați după (2)).

Prezentăm în tabelul nr. 2 valorile medii ale frecvenței ritmului respirator. Selecția cazurilor s-a făcut pe baza eliminării persoanelor cu date anamnestice ale unei afecțiuni acute sau cronice pulmonare.

Tabelul nr. 2

Valorile medii ale frecvenței ritmului respirator (nr. de respirații/minut)

Clasa de vîrstă (ani)	B ă r b a ți					F e m e i				
	Nr.	Min— Max	M	m	$\sigma$	Nr.	Min— Max	M	m	$\sigma$
20—29	10	16—24	20,05	0,53	2,49	24	14—30	17,12	0,24	1,80
30—39	27	14—22	18,82	0,34	2,66	20	14—26	18,85	0,36	2,43
40—49	39	14—26	19,07	0,31	2,96	23	16—26	19,67	0,36	2,62
50—59	24	14—28	20,29	0,56	4,12	17	14—28	20,28	0,23	1,46
60—69	14	16—28	20,73	0,67	3,74	23	14—24	20,76	0,45	2,93
70—79	9	16—22	19,34	0,52	2,33	—	—	—	—	—
Serie sintetică	123	14—28	19,70	0,20	3,31	107	14—28	19,70	0,21	3,26

Începînd cu etapa de vîrstă 60—70 de ani, am întîlnit mai frecvent torace lărgit la bază (în sens antero-posterior) și lărgirea unghiului epigastric. De asemenea crește frecvența deformărilor cutiei toracice (scolioză, cifoză).

Urmărind variațiile frecvenței ritmului respirator, se constată o discretă creștere a acestuia odată cu înaintarea în vîrstă la bărbați și o creștere evidentă la femei. Cercetările efectuate de Hartia și Nicolaescu (2) evidențiază de asemenea creșterea frecvenței ritmului respirator cu vîrsta. Autorii menționați găsesc 15 respirații pe minut în decada a IV-a de vîrstă; apoi frecvența crește, ajungînd la 20 respirații/minut în decada a X-a. Creșterea frecvenței respiratorii se corelează de altfel radiologic cu jocul diafragmului, care suplinește deficiențele cutiei toracice, și cu dependența complianței de frecvență (2).

Pentru a analiza variațiile amplitudinii capacității vitale la populația din satul Săpînța, s-au calculat mediile acestui caracter pe decade de vîrstă, pe sexe și pe serii sintetice cuprinzînd indivizi între 20 și 59 de ani într-o serie (folosită ca material de comparație) și între 20 și 79 de ani în altă serie, mai extinsă.

Din tabelul nr. 3 se constată, în primul rînd, că seria masculină pe decade de vîrstă oferă valori medii mai mari decît cea feminină, diferențele cele mai importante fiind înregistrate în special la clasele de vîrstă 20—50 de ani.

În al doilea rînd, se observă o creștere ușoară a mediei capacității vitale între decadele a III-a și a IV-a (de la 4681 la 4759 cm<sup>3</sup> la bărbați și de la 3479 la 3557 cm<sup>3</sup> la femei); urmează apoi o scădere pro-

Tabelul nr. 3

Valorile medii ale capacității vitale și indicele capacității vitale/talie

Clase de vîrstă (ani)	N	Min	Max	M	m	$\sigma$	Talie	Ind. $\frac{\text{cap. vit.}}{\text{talie}}$
<b>B ă r b a ți</b>								
20-29	11	3500	5700	4681	120	591	170,7	27,42
30-39	27	3100	6000	4759	113	871	170,9	27,84
40-49	61	2600	6500	4324	86	989	169,1	25,57
50-59	41	2000	5000	3541	75	721	167,8	21,10
60-69	37	2000	4500	3086	73	665	165,6	18,63
70-79	11	1800	4000	3023	115	640	165,1	18,31
Serie sintetică 20-59	140	2000	6500	4402	54	923	169,06	26,03
Serie sintetică totală	191	1800	6500	3847	48	1004	168,10	22,88

## F e m e i

20-29	29	2500	4600	3479	57	460	160,7	21,64
30-39	24	2700	4200	3557	61	444	159,7	22,27
40-49	53	2200	4800	3438	41	452	157,0	21,89
50-59	43	1500	4500	2922	59	576	156,1	18,71
60-69	34	1500	3500	2475	62	338	155,4	15,92
70-79	7	1400	3100	1945	20	1292	154,0	12,62
Serie sintetică 20-59	149	1500	4800	3263	31	577	157,95	20,65
Serie sintetică totală	190	1400	4800	3075	33	685	157,36	19,54

gresivă cu vîrsta, devenind mai marcantă după 50 de ani (de la 4324 la 3023 cm<sup>3</sup> la bărbați și de la 3438 la 1945 cm<sup>3</sup> la femei).

O situație asemănătoare prezintă și indicele capacității vitale/talie. Valorile sale cresc de la decada a III-a la a IV-a, apoi scad odată cu înaintarea indivizilor în vîrstă, această scădere corelîndu-se și cu scăderea progresivă a taliei. Același fenomen se observă și la seriile de comparație (tabelul nr. 4), provenite din județul Iași, din comuna Ilișești — județul Suceava, din regiunea Dornei (5) și din Valea Cosăului — județul Maramureș<sup>1</sup>.

Dacă analizăm comparativ valorile medii ale capacității vitale a seriilor noastre masculine și feminine cu seriile citate (4), cuprinzînd indivizi între 20 și 59 de ani (tabelul nr. 5), constatăm că bărbații din Săpînța prezintă valorile medii cele mai reduse dintre toate seriile comparate (4402 cm<sup>3</sup>), ei asemănîndu-se din acest punct de vedere cu seria de agricultori din județul Iași (4453 cm<sup>3</sup>). Același lucru se poate spune și despre indicele capacității vitale/talie (26,04 la bărbații din Săpînța și 26,75 la cei din județul Iași).

Seria feminină prezintă o capacități vitală medie (3262 cm<sup>3</sup>) și un indice capacități vitală/talie (20,65) mai mare decît la seriile din

<sup>1</sup> M. Cristescu și colab., *Studiul antropologic complex al unor populații rurale din Valea Cosăului — jud. Maramureș, Iași, 1972.*

Tabelul nr. 4

Valorile medii comparative ale indicelui capacității vitale/talie

Clasa de vîrstă (ani)	Seria Vatra Dornei		Seria Ilișești		Seria județul Iași		Seria Săpînța	
	Nr.	M	Nr.	M	Nr.	M	Nr.	M
<b>B ă r b a Ț i</b>								
20-29	60	28,45	28	30,84	58	27,70	11	27,42
30-39	55	27,78	30	27,98	71	27,09	27	27,84
40-49	31	26,39	35	26,62	51	25,22	61	25,57
50-59	9	24,12	24	22,87	18	24,12	41	21,10
Serie totală	155	27,90	117	27,21	198	26,75	140	26,03

## F e m e i

20-29	57	23,02	26	22,38	57	21,92	29	21,64
30-39	72	23,77	39	20,83	53	23,50	24	22,27
40-49	59	21,46	36	18,23	50	21,35	53	21,89
50-59	21	18,64	26	16,79	25	17,53	34	18,71
Serie totală	209	22,70	127	19,55	199	21,85	149	20,65

Valea Cosăului (2844 cm<sup>3</sup> - 18,36) și comuna Ilișești (3117 cm<sup>3</sup> - 19,55), dar în același timp mai mici decît seriile din județul Iași (3421 cm<sup>3</sup> - 21,85) și regiunea Dornei (3638 cm<sup>3</sup> - 22,70).

Faptul că seria masculină din satul Săpînța înregistrează valorile cele mai mici dintre seriile comparate din punctul de vedere al capacității vitale s-ar putea explica printr-o frecvență destul de mare în cadrul eșantionului a unor persoane care au profesat mineritul un timp variabil (între 2 și 10 ani).

Studiul ritmului cardiac (tabelul nr. 6) ne-a arătat scăderea frecvenței acestuia la sexul masculin progresiv cu vîrsta în sens liniar, de la 79,00 la 68,45 bătăi/minut (valori medii). La sexul feminin valorile prezintă variații de la o decadă de vîrstă la alta, ceea ce sugerează un fond neurovegetativ mai labil la acest grup. Pe de altă parte, media ritmului cardiac la sexul masculin este mai coborîtă (73,69 bătăi/minut) decît la sexul feminin (80,59 bătăi/minut), ceea ce se corelează cu prima constatare expusă.

În ceea ce privește acuitatea vizuală (tabelul nr. 7), am constatat scăderea acesteia odată cu înaintarea în vîrstă mai ales după decada a V-a atît la sexul masculin, cît și la cel feminin (date identice raportate și de Duane, citat după (6)), datorită pierderii plasticității cristalinelor, care are drept consecință tulburări de acomodare. Acuitatea vizuală prezintă valori medii mai scăzute la femei decît la bărbați atît pentru ochiul stîng, cît și pentru ochiul drept, probabil datorită și unor solicitări mai intense.

Referindu-ne la acuitatea tactilă, se știe că capacitatea pielii de a descompune două contacte separate la distanța cea mai mică este de numai 1/3000 din cea a ochiului (6). Diferențele regionale sînt pronunțate și în general prezintă un paralelism față de precizia localizării. Totuși, ele nu prezintă acest paralelism față de variațiile regionale ale pragului intensității.



Tabelul nr. 5

## Valorile medii comparative ale capacității vitale

Seria	N	Min	Max	M	m	$\sigma$	Statura	Ind. <u>cap. vitală</u> talie
<i>Bărbați</i>								
Iași (agricultori) 1966	200	2500	6200	4453	30,99	650	166,46	26,75
Reg. Dorne (agricultori) 1966	155	3000	6200	4770	36,40	672	170,27	27,90
Com. Ilișești (agricultori) 1968	117	2000	6900	4621	56,04	934	167,33	27,21
Valea Cosăului (jud. Maramureș) 1972	385	—	—	4619	—	—	167,59	27,50
Săpînța 1973	140	2000	6500	4402	54,2	923	169,0	26,04
<i>Femei</i>								
Iași (agricultoare) 1968	199	800	4900	3421	28,72	718	154,84	21,85
Reg. Dorne (agricultoare) 1968	231	1500	5900	3638	24,32	608	157,95	22,70
Com. Ilișești (agricultoare) 1968	127	1500	5000	3117	32,00	640	155,82	19,55
Valea Cosăului (jud. Maramureș) 1972	451	—	—	2844	—	—	154,86	18,36
Săpînța 1973	149	1500	4800	3262	31,0	577	157,90	20,65

Tabelul nr. 6

Valori medii ale frecvenței cardiace (nr. bătăi/minut)

Clasa de vîrstă (ani)	B ă r b a ți					F e m e i				
	Nr.	Min-Max	M	m	$\sigma$	Nr.	Min-Max	M	m	$\sigma$
20—29	11	60—92	79,00	2,21	10,90	25	60—104	83,33	1,32	9,80
30—39	24	56—96	74,45	1,67	12,20	19	60—96	78,98	1,68	10,87
40—49	39	56—92	73,12	0,98	9,16	23	64—96	78,11	1,30	9,31
50—59	23	56—96	73,24	1,62	11,53	21	61—100	77,69	1,50	10,24
60—69	14	60—92	73,03	1,52	8,48	23	72—106	84,23	1,89	12,23
70—79	10	52—92	68,45	2,40	11,26	—	—	—	—	—
Serie sintetică	121	52—96	73,69	0,67	10,95	111	60—106	80,59	0,59	9,97

În tabelele nr. 8 și 9 este redată capacitatea de discriminare tactilă la eșantionul studiat, investigată în trei zone: pulpa indexului, fața posterioară a mîinii și fața anterioară a antebrațului drept.

Se observă că capacitatea maximă de discriminare este la nivelul pulpei indexului, această capacitate descrescînd la indivizii din aceeași decadă de vîrstă progresiv, la nivelul mîinii și antebrațului drept. În ceea ce privește relația cu vîrsta, am constatat în zona pulpei indexului drept scăderea capacității de discriminare între 20 și 60 de ani la bărbați, pentru ca decadele următoare de vîrstă să prezinte o capacitate mai bună decît cele anterioare, dar tot cu tendință spre scădere cu vîrsta. La femei, scăderea capacității de discriminare tactilă în această zonă este mai constantă (excepție face etapa de vîrstă 50—59 ani, care prezintă un indicator mai crescut față de etapa de vîrstă 40—49 ani).

În zona feței posterioare a mîinii drepte se constată la bărbați o scădere a capacității de discriminare între 20 și 50 de ani, apoi o creștere a ei între 50 și 60 de ani și din nou o scădere la etapele de vîrstă 60—80 de ani. La femei, cu excepția clasei de vîrstă 30—40 de ani, la care se constată o capacitate de discriminare mai scăzută decît la clasele 40—50 și 50—60 de ani, fenomenul prezintă o scădere a indicatorului cu vîrsta.

În zona feței anterioare a antebrațului drept, capacitatea de discriminare tactilă la bărbați scade cu vîrsta, cu excepția clasei de vîrstă 50—60 de ani, care prezintă o capacitate mai bună decît clasa de vîrstă 40—50 de ani. La femei, în această zonă nu se observă o corelare între capacitatea de discriminare și succesivitatea etapelor de vîrstă.

Cu toate variațiile neuniforme din interiorul claselor de vîrstă (ținînd seama și de aprecierile subiective ale persoanelor examinate, de grosimea diferită a cutanței la persoanele lucrative etc.), se constată totuși la fiecare zonă eșantinată examinată o scădere a capacității de discriminare la ambele sexe între clasa de vîrstă tînăra (20—30 ani) și clasa de vîrstă înaintată (70—80 ani), mai discretă pentru zona pulpei indexului și mai evidentă pentru zona feței dorsale a mîinii și a feței anterioare a antebrațului. În ceea ce privește diferențele pe sexe, cu excepția pulpei indexului, capacitatea de discriminare tactilă este evident superioară la sexul feminin față de sexul masculin.

Tabelul nr. 7

Valorile medii ale acuității vizuale (ochiul stîng)

Clasa de vîrstă (ani)	B ă r b a ți					F e m e i				
	Nr.	Min-Max	M	m	$\sigma$	Nr.	Min-Max	M	m	$\sigma$
20-29	11	1-3	1,82	0,65	3,24	24	1-8	3,16	0,29	2,12
30-39	26	1-6	2,80	0,17	1,33	20	1-7	3,90	0,23	1,58
40-49	39	1-9	3,38	0,17	1,64	22	1-7	3,91	0,23	1,65
50-59	24	1-9	4,79	0,22	1,67	22	1-8	5,00	0,24	1,72
60-69	14	1-6	4,60	0,27	1,50	23	1-9	6,60	0,25	1,67
70-79	9	1-8	6,11	0,43	1,94	—	—	—	—	—
Serie sintetică	123	1-9	3,73	0,14	1,96	111	1-9	4,43	0,13	2,09

Valorile medii ale acuității vizuale (ochiul drept)

20-29	11	1-3	2,09	0,08	0,42	24	1-6	3,33	0,20	1,48
30-39	26	1-6	2,72	0,17	1,34	20	1-5	3,70	0,18	1,22
40-49	37	1-9	3,73	0,19	1,79	23	1-7	4,02	0,27	1,95
50-59	24	2-9	5,00	0,24	1,75	22	2-9	5,76	0,23	1,66
60-69	14	1-7	5,03	0,33	1,88	23	1-9	6,23	0,25	1,67
70-79	9	1-9	5,77	0,57	2,57	—	—	—	—	—
Serie sintetică	121	1-9	3,91	0,12	2,03	112	1-9	4,44	0,11	1,89

Tabelul nr. 8

Valorile medii ale acuității tactile în zona palpei indexului drept (mm)

Clasa de vîrstă (ani)	Bă r b a ț i					F e m e i				
	Nr.	Min-Max	M	m	$\sigma$	Nr.	Min-Max	M	m	$\sigma$
20-29	—	—	—	—	—	24	4-11	4,95	0,08	0,6
30-39	27	4-10	5,60	0,15	1,18	20	3-11	5,80	0,20	1,34
40-49	36	2-21	5,87	0,22	1,99	23	4-10	6,54	0,19	1,41
50-59	24	3-10	6,25	0,28	2,06	21	4-10	6,07	0,12	0,83
60-69	12	3-12	5,54	0,40	2,08	22	4-12	6,58	0,27	1,89
70-79	9	3-25	5,70	0,43	1,70	—	—	—	—	—
Serie sintetică	108	2-25	5,86	0,15	2,32	110	3-12	5,96	0,10	1,50

Valorile medii ale acuității tactile în zona feței posterioare a mîinii drepte (mm)

20-29	11	8-54	27,37	2,72	13,40	25	8-46	26,89	1,29	9,58
30-39	25	14-56	30,53	1,47	10,94	19	8-60	32,77	1,50	13,56
40-49	39	10-60	33,53	1,55	14,42	24	8-48	27,45	1,50	10,94
50-59	23	8-60	29,77	2,17	15,40	21	6-52	28,77	1,88	12,80
60-69	13	4-46	31,05	2,21	11,82	18	10-60	34,21	2,03	12,80
70-79	9	18-56	36,12	2,87	12,80	—	—	—	—	—
Serie sintetică	120	4-60	33,59	1,12	18,32	107	6-60	30,85	0,71	10,94

Tabelul nr. 9

Valorile medii ale acuității tactile în zona feței anterioare a antebrațului drept (mm)

Clasa de vîrstă (ani)	B ă r b a ț i					F e m e i				
	Nr.	Min-Max	M	m	$\sigma$	Nr.	Min-Max	M	m	$\sigma$
20-29	10	20-95	53,45	3,83	18,00	24	10-80	52,70	1,52	11,10
30-39	26	15-100	55,95	3,23	24,45	20	20-90	56,20	2,82	18,70
40-49	39	30-105	67,35	1,94	18,00	23	20-90	53,80	2,62	18,70
50-59	23	30-100	62,70	2,62	18,70	22	20-80	50,90	2,68	18,70
60-69	22	40-115	90,25	2,78	19,35	23	25-115	60,95	2,68	19,35
Serie sintetică	120	15-115	66,04	1,26	20,60	112	10-115	55,50	1,28	20,00

Tabelul nr. 10

Valorile medii ale forței de presiune a mușchilor flexori ai degetelor mîinii drepte (kgf)

Clasa de vîrstă (ani)	B ă r b a ț i					F e m e i				
	Nr.	Min-Max	M	m	$\sigma$	Nr.	Min-Max	M	m	$\sigma$
20-29	11	33-55	50,35	1,30	6,40	29	14-45	29,00	0,97	7,75
30-39	27	11-55	44,15	1,81	13,95	23	20-42	30,10	0,85	6,06
40-49	65	14-58	40,60	1,11	13,25	51	10-37	23,20	0,57	6,05
50-59	44	9-55	32,85	1,27	12,55	43	7-37	21,00	0,73	7,16
60-69	43	13-54	32,15	0,96	9,35	32	10-31	20,10	0,64	5,45
70-79	11	11-49	28,45	1,68	8,31	5	12-33	22,15	2,12	7,05
Serie sintetică	201	9-58	37,50	0,64	13,50	183	7-45	23,50	0,38	7,70

În tabelul nr. 10 prezentăm datele obținute la cercetarea forței musculare. Am constatat astfel diminuarea progresivă cu vârsta a eficienței aparatului muscular mai ales după decada a V-a de vîrstă. Sexul feminin prezintă valori mai scăzute, dar viteza de scădere este mai puțin liniară și mai lentă decît la sexul masculin.

### CONCLUZII

1. Există o stare de involuție funcțională a organelor, progresivă cu vârsta, care se relevă cu ajutorul unor indicatori fiziometricei.

2. Se constată în acest sens creșterea presiunii arteriale sistolice și diastolice odată cu înaintarea în vîrstă, mai accentuată la femei după decada a V-a.

3. Involuția aparatului respirator se traduce la ambele sexe prin prezența toracelui mai larg (antero-posterior) începînd din decada 60—70 ani, prin creșterea frecvenței respiratorii din decada a IV-a și prin scăderea indicelui capacitate vitală/talie din decada a IV-a.

4. Odată cu înaintarea în vîrstă are loc o scădere a frecvenței ritmului cardiac, mai constantă la sexul masculin.

5. Se observă de asemenea scăderea acuității vizuale, mai accentuată la sexul feminin, ca și a forței musculare.

6. Capacitatea de discriminare tactilă scade paralel cu vârsta, sexul feminin păstrînd și în decada a VII-a o capacitate superioară sexului masculin.

### VARIABILITÄT EINIGER PHYSIOMETRISCHEN CHARAKTERE BEI DER BEVÖLKERUNG AUS SÄPÎNȚA

#### ZUSAMMENFASSUNG

Das Studium stellt fest, daß es progressiv mit dem Alter gehend, einen rückbildenden Zustand des Organismus gibt, der sich durch einige physiometrische Wertmeßziffern hervorheben läßt.

Auf diese Weise wird eine Steigerung des systolischen und diastolischen Arterialdrucks mit zunehmendem Alter sichtbar, die betonter bei Frauen ist, überhaupt nach der V-ten Dekade.

Die Rückbildung des Atmungsapparats äußert sich bei beiden Geschlechtern, durch Erhöhung der Atmungsfrequenz und Senkung der Vitalkapazität. Außerdem erfolgt auch eine Verminderung der Sehschärfe (akzentuiert bei Frauen), Herzfrequenz, Muskelkraft und eine Herabsetzung der Unterscheidungskraft des Tastsinnes.

## BIBLIOGRAFIE

1. BACIU I., *Fiziologie*, Edit. didactică și pedagogică, București, 1970.
2. HARTIA L., NICOLAESCU N., *Cercetări privind unii indicatori de vîrstă biologică la nivelul aparatului respirator*, Fiziol. norm. patol., 1968, XIV, 3.
3. LOWENSTEIN F. W., *Blood pressure in relation to age and sex in the Tropics and Subtropics*, Lancet, 1961.
4. NECRASOV O., BOTEZATU D., GHEORGHIU G., IACOB M., COTUNA D., FEODOROVICI C., *Date antropologice noi asupra Țării Dornelor*, St. cerc. antropol., 1965, 2, 2.
5. NECRASOV O., BOTEZATU D., ȘTIRBU M., KLÜGER R., ROȘCA M., COTUNA D., *Sur la variabilité de la capacité vitale et les facteurs qui la déterminent*, Ann. roum. Anthrop., 1966, 3.
6. RUCH T., FULTON J., *Fiziologie medicală și biofizică*, trad. din limba engleză, Edit. medicală, București, 1963.

*Centrul de cercetări biologice Iași,  
Sectorul de ecologie umană și paleoantropologie*





# CERCETĂRI COMPARATIVE ASUPRA VITEZEI DE VORBIRE

DE

I. OPRESCU și V. SĂHLEANU

016.89 – 008.434.31

Scopul inițial al unei astfel de cercetări constă în a stabili diferențe sau asemănări între diverse culturi sau subculturi, eventual între diferite „tipuri umane”. Semnificația biologică a unei viteze de vorbire mai mari pare a fi multiplă. Ea constă, după Jean Kamé, în aceea că debitul mare de vorbire favorizează circulația sanguină, contribuind la creșterea longevității. Este o opinie unilaterală, dar care, oricum, poate fi înscrisă ca ipoteză a unor viitoare cercetări. Evident că efortul de a vorbi mai repede are o serie de consecințe imediate și că obișnuința de a vorbi mereu repede duce la niște caracteristici fiziologice deosebite la cei care vorbesc repede în comparație cu cei care vorbesc rar. Pe de altă parte, tempoul vorbirii exprimă temperamentul. Investigații interdisciplinare vor putea arăta care sînt caracteristicile corelate cu acest tempo. Pe linia unor asemenea investigații, s-ar putea stabili, de exemplu, și dacă există o corelație între grupele sanguine și viteza de vorbire; mai curînd ar fi de așteptat o legătură cu tipurile constituționale.

Există o *semnificație psihologică* a vitezei de vorbire. Ideea rapidă sau ideea lentă se materializează în expresia comunicațională, în cazul nostru în fluxul verbal. Mai ușor de urmărit s-ar părea că sînt *semnificațiile culturale* și *cele sociale*. Se admite „impresionist” debitul verbal mare al populațiilor latine sau meridionale, dar totodată și configurația culturală și socială specifică a acestora, deosebită de cea a populațiilor din nord.

Cercetarea minuțioasă a „subculturilor” unei culturi, despre care știm (sau presupunem) că excelează printr-o viteză mare sau mică de vorbire, ne poate duce însă la evidențierea unor aspecte inedite: este ceea ce s-a întîmplat în cercetarea noastră.

## MATERIAL ȘI METODĂ

Materialul pe care se bazează studiul nostru a fost furnizat de 8 eșantioane, bărbați și femei, din mediul urban-industrial, rural-agricol și sportiv. De la acești 230 de subiecți am cules 2760 de probe de limbă

română, totalizînd 58 272 de cuvinte, care au fost pronunțate cu viteze diferite în 673 de minute și 32 de secunde. Tehnica noastră a constatat în a număra cuvintele fiecărei probe în parte și a cronometra separat durata tuturor probelor, însumînd apoi după diverse criterii, așa cum vom vedea în continuare, rezultatele și comparîndu-le.

Iată lista celor 8 eșantioane :

- Uzinele mecanice Muscel, Cîmpulung-Muscel, prescurtat *UMM* ;
- comuna Lerești-Albești, jud. Argeș, prescurtat *L—A* ;
- comuna Sohodol, jud. Brașov, prescurtat *Soho* ;
- comuna Geomal, jud. Alba, prescurtat *Geo* ;
- Institutul de cercetări tehnologice pentru construcții de mașini din București, prescurtat *ICTCM* ;
- Uzinele „23 August” din București, prescurtat *23 A* ;
- Clubul „Steaua”, sporturi de performanță colectivă, prescurtat *S. cl.* ;
- Clubul „Steaua”, sporturi de performanță individuală, prescurtat *S. ind.*

Spațiul restrîns nu ne permite să facem, așa cum ar fi necesar, cîte o scurtă caracterizare a celor 8 eșantioane și implicit a culturilor și „sub-culturilor” pe care ele le reprezintă.

## REZULTATE

Un calcul *global* pe toți cei 230 de subiecți de la cele 8 eșantioane arată că viteza de vorbire este în medie de 86 de cuvinte pe minut atît la bărbați, cît și la femei, adică după viteza de vorbire există o diferență foarte mică între sexe (tabelul nr. 1, viteza de vorbire pe secundă). Este interesant de semnalat că o cercetare făcută în Marea Britanie în 1972 arată o medie de 90 de cuvinte pe minut dacă nu ținem seama de sex, iar diferențiată pe sexe de 76 de cuvinte pe minut la bărbați și de 105 cuvinte pe minut la femei.

Cînd am calculat însă viteza de vorbire separat pentru mediul urban-industrial și pentru mediul rural-agricol, lăsînd deoparte eșantionul de sportivi, au apărut mari deosebiri. În mediul rural-agricol se vorbește mai repede decît în mediul urban-industrial: 94 și, respectiv, 81 de cuvinte pe minut. Prin urmare, eșantioanele urbane se detașează de cele rurale și, după cum se va vedea, și de cele sportive.

Se pare că practicarea sportului, atît de performanță colectivă cît și de performanță individuală, induce modificări importante ale comportamentului, poate chiar o restructurare a personalității, datele fiind dacă nu demonstrative, cel puțin sugestive (tabelul nr. 2).

Trecînd la compararea vitezei de vorbire pe sexe, observăm că bărbații din mediul rural vorbesc mai repede decît cei din mediul urban (92 față de 82 de cuvinte pe minut) și că femeile din mediul rural vorbesc mai repede decît cele din mediul urban (98 față de 78 de cuvinte pe minut).

Mai departe, bărbații din mediul urban, precum și cei din mediul rural vorbesc mai repede decît femeile din mediul urban (tabelul nr. 3).

Tabelul nr. 1  
Rezultate globale pe eşantioane

Eşantion	REZULTATE GLOBALE				REZULTATE DIFERENȚIATE DUPĂ SEX*				
	cuvinte	secunde și minute	viteza cuvinte pe		cuvinte	secunde	minute	viteza cuvinte pe	
			sec.	minut				secundă	minut
UMM	11 969	8 423''	1,420	85	10 500	7 249	120'49''	1,448	86
		140'23''			1 469	1 174	19'34''	1,251	74
L-A	9 724	6 843''	1,421	85	7 786	5 320	88'40''	1,463	87
		114'3''			1 938	1 523	25'23''	1,272	78
Soho	8 295	5 252''	1,579	95	5 969	3 884	64'44''	1,536	93
		87'32''			2 326	1 368	22'48''	1,700	101
Geo	9 386	5 286''	1,775	105	6 927	4 046	67'26''	1,712	103
		88'6''			2 459	1 240	20'40''	1,983	122
ICTCM	5 393	4 080''	1,321	79	3 343	2 650	44'10''	1,261	75
		68'			2 050	1 430	23'50''	1,433	85
23 A	3 948	3 223''	1,224	74	3 135	2 499	41'39''	1,254	74
		53'43''			813	724	12'4''	1,122	67
S. cl.	5 928	4 369''	1,356	82	5 928	4 369	72'49''	1,356	82
		72'49''			—	—	—	—	—
S. ind.	3 629	2 935''	1,236	75	2 825	2 179	36'19''	1,296	78
		48'55''			804	756	12'36''	1,063	67
Total	58 272	40 111''	1,441	86	46 413	32 196	536'36''	1,441	86
		673'31''			11 859	8 215	136'55''	1,443	86

\* Coloana de sus redă rezultatele obținute la bărbați, iar coloana de jos la femei

Apar câteva întrebări: Vorbesc „mai repede” femeile de „la țară” sau „prea rar” cele de „la oraș”? Ce statut psihosocial au femeile de la oraș care compun eşantionul studiat?

Analiza succintă a rezultatelor eşantionului sportiv începe să sugereze unele răspunsuri. Viteza de vorbire surprinzător de mică a femeilor sportive arată că s-ar putea ca mediul urban, și îndeosebi profesarea unor ocupații nu neapărat specific bărbătești, dar care sînt împlinite în egală măsură atît de bărbați cît și de femei, să influențeze comportamentul comunicațional — pe care-l cercetăm noi —, femeile vădind o apropiere a parametrilor lor de parametrii masculini. Dealtfel unele rezultate ale cercetărilor de antropologie fizică (antropometrie) arată o tendință la ștergerea unor diferențe sexuale și la nivel somatic pentru unele categorii de subiecți.

Tabelul nr. 2

Rezultate globale pe categorii de eșantioane

Eșantionul	Sexul	Cuvinte	Secunde	Minute	Viteza pe	
					secundă	minut
URBAN (UMM + ICTCM + 23 A)	bărbați	16 978	12 398	206	1,369	82
	femei	4 332	3 328	55	1,301	78
	total	21 310	15 726	262	1,355	81
RURAL (L - A + Soho + Geo)	bărbați	20 409	13 250	220	1,540	92
	femei	6 723	4 131	68	1,627	98
	total	27 405	17 381	289	1,576	94
SPORTIV (S. cl. + S. ind.)	bărbați	8 753	6 548	109	1,336	80
	femei	804	756	12	1,063	67
	total	9 557	7 304	121	1,308	78

Tabelul nr. 3

Clasamentul separat pe sexe al vitezei de vorbire

Bărbați				Femei			
rangul	eșantionul	viteza pe		rangul	eșantionul	viteza pe	
		secundă	minut			secundă	minut
I	Geo	1,712	103	I	Geo	1,983	122
II	Soho	1,536	93	II	Soho	1,700	101
III	L-A	1,463	87	III	ICTCM	1,433	85
IV	UMM	1,448	86	IV	L-A	1,272	78
V	S. cl.	1,356	82	V	UMM	1,251	74
VI	S. ind.	1,296	78	VI	23 A	1,122	67
VII	ICTCM	1,261	75	VII	S. ind.	1,063	67
VIII	23 A	1,254	74				

Cercetarea poate fi adincită prin investigarea *variațiilor individuale* în cadrul aceluiași eșantioane. Analiza variațiilor individuale pune în evidență *omogenitatea* sau *neomogenitatea comunicatională*. Într-un grup în care diferența de vorbire este mare, adică avem vorbitori care pronunță un cuvânt la două secunde (sau mai puțin) și totodată unii care pronunță două cuvinte (sau mai mult) pe secundă, condițiile de comunicare vor fi diferite față de cele dintr-un grup în care nu există o mare variație a vitezei de vorbire. Din punct de vedere statistic, un indice de omogenitate poate fi coeficientul de variabilitate (tabelul nr. 4).

Pentru a aprecia valorile din tabelul nr. 4 ne-am impus sarcina de a calcula și *variabilitatea intraindividuală* a vitezei de vorbire. Pentru aceasta ne-am referit la 12 înregistrări pe bandă de magnetofon ale unor expuneri libere sau luări de cuvânt ale unuia dintre noi (V.S.). Pe un total de 1890 de cuvinte, media globală a fost de 103 cuvinte pe minut, cu o durată medie de 1,718 cuvinte/secundă. Dar calculul mediei, por-

Tabelul nr. 4

Variabilitatea individuală în interiorul eşanţionelor\*

Eşanţion	Sex	N	$\bar{X}$	$\pm \sigma$	$\pm m$	CV/%
UMM	bărbaţi	30	1,333	0,377	0,070	28,28
	femei	10	1,250	0,254	0,085	20,32
L - A	bărbaţi	27	1,454	0,380	0,075	26,13
	femei	13	1,273	0,344	0,099	27,02
Soho	bărbaţi	28	1,543	0,379	0,073	24,56
	femei	11	1,504	0,429	0,136	28,52
Geo	bărbaţi	22	1,659	0,319	0,070	19,23
	femei	8	1,763	0,538	0,203	30,52
ICTCM	bărbaţi	12	1,250	0,234	0,071	18,72
	femei	8	1,475	0,515	0,195	34,91
23 A	bărbaţi	14	1,314	0,370	0,103	28,16
	femei	6	1,167	0,300	0,134	25,70
S. cl.	bărbaţi	20	1,325	0,259	0,059	19,55
S. ind.	bărbaţi	15	1,290	0,348	0,093	26,98
	femei	5	1,090	0,092	0,046	8,44

\* Media se referă la viteză: cuvinte/secundă.

nind de la mediile eşanţionelor, a dus la cifrele de  $2,233 \pm 0,8615$  cu un CV = 38,5%.

Cîteva observaţii sînt necesare. Viteza de vorbire pare să fie un indicator preţios în studiile de antropologie cultural-lingvistică. Din observaţiile noastre rezultă că şi femeile, şi bărbaţii vorbesc mai repede la ţară decît la oraş. Aceste date sînt oare suficiente pentru a detaşa zona rurală de cea urbană? Un rezultat neaşteptat îl reprezintă viteza mai mare de vorbire a bărbaţilor din mediul industrial. Mai trebuie notată, fără a analiza fenomenul, diferenţa foarte mare dintre viteza de vorbire a femeilor de la Geomal şi a celor de la Uzinele „23 August” din Bucureşti. Oare o altă zonă geografică, un alt mediu de muncă şi de viaţă, alte condiţii generale duc la sporirea sau la reducerea vitezei de vorbire?

Cercetările asupra vitezei de vorbire (care, după cîte ştim, nu s-au mai făcut în ţara noastră pînă acum) vor trebui continuate cel puţin în următoarele direcţii: 1) Vorbesc oamenii repede, dar vorbesc mult? 2) Care este raportul dintre densitatea semantică şi viteza de vorbire? Totuşi, chiar dacă un flux verbal bogat nu are o mare densitate semantică, el semnifică însă o dorinţă de a comunica, de a păstra un canal deschis între un individ şi altul. Acest canal de comunicare este legătura

dintre oameni. Canalele formează o țesătură socială, care poate fi mai deasă sau mai rară. Din această perspectivă, indicatorul prezentat în lucrarea de față (viteza de vorbire) poate completa cu date obiective cercetările multidisciplinare de antropologie.

## INVESTIGACIONES COMPARATIVAS SOBRE LA VELOCIDAD DEL HABLA

### RESUMEN

El trabajo presenta unos resultados de la investigación de la velocidad del habla sobre ocho grupos, hombres y mujeres totalizando 230 sujetos procedentes del ambiente urbano-industrial, rural-agrícola y deportivo. (Total 58.272 palabras). El análisis de los datos obtenidos, muestran, entre otros, una mayor diferencia entre hombres y mujeres en el ambiente rural-agrícola, y una velocidad del habla mayor de los hombres del ambiente urbano-industrial. La investigación de las variaciones individuales pone de relieve diferencias de homogeneidad comunicacional entre los grupos. Por término medio hemos establecido una velocidad del habla de 1,1 – 1,8 palabras/segundo, con un coeficiente de variabilidad (c.v.) (dentro de los grupos) de 8–35 %. La variabilidad intraindividual puede llegar hasta la cifra de c.v. = 38 %.

### BIBLIOGRAFIE

1. SĂHLEANU V., OPRESCU I., *Antropologia cultural-lingvistică (I). Principii. Metode. Probleme*, în St. cerc. antropol., 1972, 9, 1.
2. SĂHLEANU V., OPRESCU I., *Antropologia cultural-lingvistică (II). Proba de limbă. Aspecte de conținut. Componente formale*, în St. cerc. antropol., 1973, 10, 1.
3. SĂHLEANU V., OPRESCU I., *Unele aspecte de principiu și probleme ale antropologiei culturale lingvistice*, în *Varia anthropol.*, 1973, 3.
4. SĂHLEANU V., OPRESCU I., *Premises and concrete researches in cultural linguistic anthropology*, în *Ann. roum. Anthropol.*, 1973, 10.

Centrul de cercetări antropologice  
București

# NUMELE DE FAMILIE DIN LOCUIREA PEȘTERA (zona Bran)

DE

LUCIA MĂRCUȘ

579.4

În continuarea studiilor antroponimice privitoare la zona Bran, materialul de față prezintă unele considerații asupra numelor de familie existente în uz în locuirea Peștera (zona Bran).

Numele de familie, în actuala accepție a termenului, apare pe teren european destul de recent; limba română urmează și ea această cale. Deși sînt de formație recentă (sau poate tocmai prin aceasta), încărcătura semantică a unor nume de familie vine nu o dată cu precizări social-istorice care nu sînt neglijabile într-o cercetare antropolingvistică, întrucît este știut că la originea numelor contemporane de familie românești se situează patronimele, matronimele, adelfonimele, etnonimele, porecele etc.

## MATERIAL ȘI METODĂ

Am stabilit pentru locuirea Peștera <sup>1</sup> următoarele date (care acoperă situația existentă în fapt în octombrie 1972):

- din cîte familii ( $F$ ) este alcătuită;
- cîți indivizi ( $N$ ) există în locuire, cu precizarea dacă este vorba de bărbați ( $\mathcal{J}$ ), femei căsătorite ( $\mathcal{F}$ ) sau necăsătorite ( $f$ ) <sup>2</sup>;
- unitățile antroponimice ( $U$ ) nume de familie cuprinse în inventarul antroponimic;

<sup>1</sup> Materialul de lucru, recoltat în formă primară, ne-a fost pus la dispoziție prin bunăvoința Sectorului de antropologie contemporană, care lucrează de mai mulți ani în zona Bran.

<sup>2</sup> Considerînd — metodologic — că circulația în timp a unităților antroponimice nume de familie, adică scăderea unor frecvențe, dispariția unor unități antroponimice, creșterea unor frecvențe, apariția unor unități antroponimice este în strîns raport cu evoluția demografică, am seriat datele noastre și după aceste categorii.

— numărul mediu al membrilor de familie  $\left(\frac{N}{F}\right)$ ;

— raportul ( $R$ ) dintre numărul familiilor și totalul inventarului antroponimic  $\left(\frac{F}{U}\right)$ .

Rezultatele obținute din prelucrarea acestor date sînt cuprinse în tabelul nr. 1.

Tabelul nr. 1

Valorile lui  $F$ ,  $N$ ,  $U$  și  $R$  în locuirea Peștera

$F$	$N = 1071$			$U$	$\frac{N}{F}$	$R = \frac{F}{U}$
	♂	♀	$f$			
264	533	264	274	64	4,05	4,12

Inventarul unităților antroponimice nume de familie din Peștera se repartizează pe familii și indivizi după cum reiese din tabelul nr. 2.

## REZULTATE

Maxima putere circulatorie în locuirea Peștera este redată în tabelul nr. 3 (serierea s-a făcut în funcție de valorile seriei ♂; seria ♀, pentru marea majoritate a cazurilor, a primit numele prin căsătorie, iar seria  $f$ , în foarte puține cazuri, își va păstra numele).

Deci, din totalul de 64 de nume de familie, cele 7 unități de rang I—V cuprind 107 familii (40,53%) cu 417 indivizi (38,94%), din care ♂ = 205 (38,46%), ♀ = 105 (40%),  $f$  = 107 (39,04%).

Din seria ♀, 206 au purtat înainte de căsătorie 57 de nume de familie, adică atunci cînd puteau fi incluse în seria  $f$  (tabelul nr. 4).

Reținem că 5 unități sînt comune cu cele prezentate în tabelul nr. 3.

Comparînd inventarul antroponimic al locuirii Peștera cu inventarul antroponimic al seriei ♀ cînd se afla în situația de serie  $f$ , reținem:

— sînt *comune* celor două loturi următoarele unități: Benga, Blaj, Boboc, Brezeanu, Bucșoiu, Chițu, Ciurea, Cojanu, Cocă, Colțea, Conea, Corboș, Coriiu, Cotinghi, Dobrin, Duicu, Enescu, Florescu, Folea, Gîrbacea, Iaru, Jinga, Moșoiu, Moșu, Nan, Olteanu, Pepene, Perja, Perșoiu, Petrașcu, Plumbătă, Porancea, Răduțoiu, Runceanu, Scinteie, Secărea, Spătaru, Sumedrea, Surdu, Tăriță, Terci, Zară;

— sînt *distincte*, deci ieșite din inventarul actual: Arișanu, Berbec, Codreanu, Damaschim, Dobre, Giurgiu, Iancu, Ludu, Munteanu, Preda, Pinte, Țapu, Vălimăreanu, Zăbavă, Zichil.

Am comparat datele oferite de locuirea Peștera cu cele din Măgura, unde  $U = 56$ ,  $F = 224$ ,  $N = 967$ , ♂ = 507, ♀ = 212,  $f = 248$ . Maxima putere circulatorie a unităților antroponimice nume de familie în locuirea Măgura, este redată în tabelul nr. 5.



Tabelul nr. 2

## Repartizarea numerelor de familie

Nr. crt.	Unitate	F	♂	♀	f	Total indivizi
1	Albușoiu	1	1	2		3
2	Aneu	1	4	1	1	6
3	Băsa	2	5	2	2	9
4	Benga	3	4	2	3	9
5	Blaj	12	22	12	12	46
6	Boboc	2	6	2	4	12
7	Botorog	2	5	2	4	11
8	Brezeanu	1	1	1		2
9	Bucșoiu	7	16	6	13	35
10	Buzalu	2	1	3	1	5
11	Cențu	1	3	1	1	5
12	Chițu	5	15	5	12	32
13	Ciurea	1	1	1	1	3
14	Cocă	3	6	3	2	11
15	Cojanu	10	17	9	6	32
16	Cojenel	1	2	1	2	5
17	Colțea	23	48	22	22	92
18	Conea	3	6	3	1	10
19	Corboș	16	26	17	10	53
20	Coriiu	1	2	1	2	5
21	Cotlinghi	11	23	11	15	49
22	Dobrin	3	5	3	1	9
23	Duicu	4	11	3	4	18
24	Enescu	3	6	3	1	10
25	Florescu	1	3	1	1	5
26	Folea	15	26	15	13	54
27	Fotă	1		1		1
28	Giurgi	1		1		1
29	Girbacea	2	3	1	2	6
30	Iaru	2	1	2		3
31	Jinga	13	27	10	12	49
32	Mărtoiu	1		1		1
33	Miclea	1		1	1	2
34	Mihăilă	1	6	1		7
35	Mitrea	2	10	2	5	17
36	Moșoiu	14	17	13	11	41
37	Moșu	3	2	3		5
38	Moșoc	1	2	1	3	6
39	Mureșan	1	4	1	2	7
40	Nan	5	6	4	4	14
41	Negulescu	1	3	1	1	5
42	Obilîșteanu	1		3		3
43	Olteanu	5	8	5	4	17
44	Pepene	1	6	1	3	10
45	Perja	4	10	4	8	22
46	Perșoiu	2	1	2	1	4
47	Petrașcu	1	1	1	3	10
48	Plumbătă	3	11	3	5	19
49	Porancea	10	19	10	7	36
50	Rădușoiu	5	4	5	4	13
51	Ripea	2	5	2	4	11
52	Runceanu	7	10	4	3	17
53	Scînteie	3	9	3	4	16
54	Secărea	14	26	15	14	55
55	Spătaru	1	1			1
56	Stemate	1	1	1		2

Tabelul nr. 2 (continuare)

Nr. crt.	Unitate	F	♂	♀	f	Total indivizi
57	Sumedrea	1	2	1	3	6
58	Surdu	4	8	4	4	16
59	Târîță	4	11	4	4	22
60	Terci	15	29	15	21	65
61	Țeposu	1	5	1	2	8
62	Vlad	1	1	1		2
63	Voinescu	2	5	2	4	11
64	Zară	3	9	3	1	13

Tabelul nr. 3

## Unitățile antroponimice cu maximă putere circulatorie în locuirea Peștera

Nr. crt.	Rang	Unitate	♂	♀	f	F	Total indivizi
1	I	Colțea	48	22	22	23	92
2	II	Terci	29	15	21	15	65
3	III	Jinga	27	10	12	13	49
4	IV	Corboș	26	17	10	16	53
5	IV	Folea	26	15	13	15	51
6	IV	Secărea	26	15	14	14	55
7	V	Cotlinghi	23	11	15	11	49

Tabelul nr. 4

## Maxima putere circulatorie pentru lotul F înainte de căsătorie

Nr. crt.	Rang	Unitate	Frecvență absolută
1	I	Colțea	16
2	II	Cojanu	14
3	II	Terci	14
4	III	Cotlinghi	12
5	IV	Chițu	10
6	IV	Secărea	10
7	V	Corboș	9

Tabelul nr. 5

## Maxima putere circulatorie a numelor de familie din comuna Măgura

Nr. crt.	Rang	Unitate	♂	♀	f	F	Total indivizi
1	I	Cotlinghi	54	24	25	23	103
2	II	Blaj	47	20	34	20	101
3	III	Runceanu	40	20	13	20	73
4	IV	Cojanu	30	10	12	10	52
5	V	Colțea	29	12	11	12	52

Deci, din 56 de unități care formează inventarul antroponimic nume de familie al locuirii Măgura, cele cinci unități de rang I—V prind 85 de familii (38,00 %) cu 381 de indivizi (39,40), din care ♂ = 200 (39,44 %), ♀ = 86 (42 %) și f = 95 (38,30 %), două unități (Cotinghi și Colțea) fiind comune cu locuirea Peștera.

Comparând inventarul numelor de familie existente în uz în Peștera și Măgura, constatăm că :

— sint *comune* : Benga, Blaj, Boboc, Botorog, Bucșoiu, Ciurea, Cojanu, Cojenel, Colțea, Cotinghi, Folea, Gîrbacea, Jînga, Moșu, Pepene, Porancca, Răduțoiu, Rîpea, Runceanu, Scînteie, Surdu, Terci, Țeposu, Voinescu, Zară ;

— sint *proprii pentru Peștera* : Albușoiu, Ancu, Băsa, Buzatu, Cențu, Chițu, Cocă, Conea, Corboș, Corîiu, Dobrin, Duicu, Enescu, Florescu, Fotă, Giurgi, Iaru, Mărtoiu, Miclea, Mihăilă, Mitrea, Moșoiu, Moțoc, Mureșan, Nan, Negulescu, Obilișteanu, Olteanu, Perja, Perșoiu, Petrașcu, Plumbătă, Secărea, Spătaru, Stemate, Sumedrea, Tăriță, Vlad ;

— sint *proprii pentru Măgura* : Baiu, Barbu, Băncilă, Berbece, Berindei, Biță, Cercei, Codrea, Dobre, Drăgușan, Dulcinatu, Enaru, Fleșeru, Funaru, Gîrlici, Gîrniță, Lăzescu, Luță, Manea, Milu, Munteanu, Negritu, Oncioiu, Oratic, Pălici, Preda, Rășină, Tișcă, Torcea, Trufășilă, Zărnescu.

Trebuie să precizăm că această situație (asemănările și deosebirile) este valabilă numai pentru secvența temporală din care provin datele.

Evoluția demografică ulterioară va aduce schimbări atît în inventarul numelor de familie, cît și în repartitia și circulația unităților distincte.

În stadiul actual, în locuirea Peștera sint pe cale de dispariție următoarele nume de familie : Brezeanu, Ciurea, Fotă, Iaru, Mărtoiu, Miclea, Obilișteanu, Petrașcu, Vlad.



Într-o încercare de **clasificare după sens** a numelor de familie din Peștera, s-ar putea preciza următoarele grupări privind :

— *aspectul fizic* : Buzatu, Surdu, Țeposu ;

— *locul de proveniență sau de origine* : Brezeanu, Cojan<sup>3</sup>, Mureșan, Obilișteanu, Olteanu, Runceanu ;

— *porecle* : Benga, Boboc, Pepene, Perja, Scînteie, Secărea, Terci, Tărițe.

**Derivația** cu sufixe este destul de bogată :

-*ea* : Ciurea, Conea, Colțea, Mitrea ;

-*eanu*, cu derivatele, adăugat toponimelor, precizează apartenența locală : Brezeanu, Mureșan, Obilișteanu, Olteanu, Runceanu ;

-*escu*, unul din cele mai vechi sufixe patronimice românești, considerat de Al. Graur și Iorgu Iordan ca fiind de origine tracă : Enescu, Florescu, Negulescu, Voiculescu ;

-*ilă* : Mihăilă ;

-*in* : Dobrin, este vorba de sufixul de origine slavă ;

-*lea* : Miclea ;

<sup>3</sup> În graiul muntenilor, cojan = locuitor de la cîmp, în opoziție cu mocan.

-*oiu*, care formează matronimele : Albușoiu, Bucșoiu, Mărtoiu, Moșoiu, Perșoiu.

### CONCLUZII

Inventarul antroponimelor (nume de familie) din locuirea Peștera este destul de bogat atît sub aspectul semantic, cît și sub aspectul derivației. Fondul global al numelor de familie este mai redus numeric decît cel al prenumelor; în perspectivă istorică cunoaște o altă evoluție.

Spre deosebire de prenume, numele de familie trebuie studiat în strînsă legătură cu datele demografice, pentru că evoluția demografică are efecte mult mai puternice și imediate asupra fondului numelor de familie decît asupra fondului de prenume.

Studiul numelor de familie oferă posibilități largi de corelații cu biologia, genealogia, istoria și demografia.

### EL APELLIDO EN LA POBLACIÓN DE PEȘTERA (REGIÓN BRAN)

#### RESUMEN

El trabajo muestra la situación de los apellidos en la población de Peștera de la región Bran. Se presenta la circulación de los antroponimos, inventario de las familias y apellidos para las ambas series : masculina y femenina.

El cuadro antroponímico de Peștera está comparado con aquel de una población vecinal : Măgura. Se pone de relieve las unidades antroponímicas con el mayor poder circulatorio; se intenta una clasificación semántica y algunas consideraciones sobre el fenómeno de la derivación.

#### BIBLIOGRAFIE

1. CONSTANTINESCU N. A., *Dicționar onomastic românesc*, Edit. Acad. R.P.R., București, 1963.
2. FLEISCHER WOLFGANG, *Die deutschen Personennamen, Geschichte, Bildung und Bedeutung*, Akademie-Verlag, Berlin, 1968.
3. GRAUR AL., *Nume de persoane*, Edit. științifică, București, 1965.
4. MĂRCUȘ LUCIA, SĂHLEANU VICTOR, *Elemente de dinamică antroponimică în comunele Moeciu de Sus și Moeciu de Jos, zona Bran*, St. cerc. antropol., 1972, 9, 1.
5. MĂRCUȘ LUCIA, SĂHLEANU VICTOR, *Elemente de antroponimie dinamic-comparativă în satele Peștera și Măgura (zona Bran)*, St. cerc. antropol., 1972, 9, 2.
6. MĂRCUȘ LUCIA, SĂHLEANU VICTOR, *Atlasul antroponimic al zonei Bran*, Varia antropologica (București), 1973, 2.
7. PASCU G., *Sufixele românești*, București, 1916.
8. PAȘCA ȘTEFAN, *Nume de persoane și nume de animale în Țara Oltului*, București, 1936.
9. VULCĂNESCU R., *Etnologie juridică*, Edit. Academiei, București, 1970.

Primit în redacție la 15 iunie 1973

Centrul de cercelări antropologice  
București



I. P. Informația e. 1264



LUCRĂRI APĂRUTE ÎN EDITURA ACADEMIEI  
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

ȘT.-M. MILCU și H. DUMITRESCU, *Atlasul antropologic al Olteniei*, 1968,  
275 p., 6 pl., legat anvelopă, 36 lei.

MARIA CRISTESCU, *Aspecte ale creșterii și dezvoltării adolescenților din Repu-  
blica Socialistă România*, 1969, 285 p., legat, 16,50 lei.

OLGA NECRASOV, *Originea și evoluția omului*, 1971, 276 p., legat, 28 lei.

St. cerc. antropol., tomul 11, nr. 1, București, 1974



I. P. I. — Com. 1264

43 881

Lei 35