

STUDII ȘI CERCETĂRI DE ANTROPOLOGIE

TOMUL 14

1977

EDITURA ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

COMITETUL DE REDACȚIE

Redactor responsabil: prof. univ. dr. doc. OLGA NECRASOV,
membru corespondent al Academiei
Republicii Socialiste România

Redactor responsabil adjunet: dr. V.V. CAMELEA

Membri: { acad. ȘT.-M. MILCU
acad. V. PREDA
dr. SUZANA GRINȚESCU-POP
D. NICOLĂESCU-PLOȘOR
dr. MARIA CRISTESCU

Secretar de redacție: ELENA RADU

În țară, abonamentele se primesc la oficiile poștale, agențiile poștale, factorii poștali și difuzorii de presă din întreprinderi și instituții. Revistele se pot procura și prin PUNCTUL DE DESFĂCERE AL EDITURII ACADEMIEI (direct sau prin poștă), Calea Victoriei nr. 125, Sectorul 1, București.

Cititorii din străinătate se pot abona adresându-se la ILEXIM, Departamentul Export-Import Presă, P.O. Box 136—137, telex 11226, București, România, str. 13 Decembrie nr. 3, sau la reprezentanții săi din străinătate.

La revue „Studii și cercetări de antropologie” paraît une fois par an.

Toute commande de l'étranger sera adressée à ILEXIM, Département d'exportation-importation (Presse), P.O. Box 136—137, telex 11226, București, România, str. 13 Decembrie nr. 3, ou à ses représentants à l'étranger.

En Roumanie, vous pourrez vous abonner par les bureaux de poste ou chez votre facteur.

ADRESA REDACȚIEI:

BULEVARDUL DR. PETRU GROZA NR. 8
BUCUREȘTI 85, C.F. 4219

STUDII ȘI CERCETĂRI DE ANTROPOLOGIE

Tomul 14

1977

SUMAR

Antropologie istorică

- OLGA NECRASOV și D. BOTEZATU, Studiul antropologic al scheletelor proto-istorice din cimitirul de la Histria-Sat (Punctul Bent) 3
- OLGA NECRASOV, MARIA BULAI-ȘTIRBU și MARIA IACOB, Paleoafauna neolitică de la Liubcova (jud. Caraș-Severin) și unele aspecte ale ocupațiilor locuitorilor din Complexul cultural Vinca-Turdaș 11

Antropologie contemporană

- MARIA VLĂDESCU, Constituția morfologică a unor populații din Cîmpia Română în funcție de sex și vîrstă 19
- CRISTIANA GLAVCE, Cercetări mixt-longitudinale privind evoluția tipului constituțional al unui lot de băieți din zona de altitudine Bran 25
- HORST SCHMIDT, Antropologia populației din satul Eftimie Murgu 31
- CORNELIU VULPE și RODICA GAGHEȘ, Observații asupra dermatoglifelor la populația din Carașova (jud. Caraș-Severin) 39
- SIMONA BERONIADE, RODICA GAGHEȘ, TATIANA DRĂGHICESCU și A. GAGHEȘ, Cercetări hemotipologice în județul Caraș-Severin 45
- MARIA ISTRATE, GEORGETA MIU și ANA-CEZARINA BĂLTEANU, Noi contribuții privind variabilitatea lipidemiei și a colesterolemiei în două populații din Dobrogea 49
- P. SEVASTRU și SILVIA GHIGEA, Aspecte demografice privind două comunități din Dobrogea 57

Antropologie aplicată

- ELENA D. RADU, CAMELIA LUNGU, IONEL STĂNESCU și DAN CIOTARU, Cercetări de antropologie constituțională ocupațională în sectoare de muncă expuse temperaturilor ridicate 63

Antropologie socială și culturală

- V.V. CAMELEA și CEZARA MIHĂESCU, Structura ocupațională și mediu social-istoric în metodologia cercetării axiologice a culturii populațiilor din Berevoești și Cîmpulung (jud. Argeș) 69
- I. OPRESCU, Indicatori în dezvoltarea capacității de comunicare la copii . . . 73
- Dr. Suzana Grințescu-Pop 77

STUDIUL ANTROPOLOGIC AL SCHELETELOR PROTOISTORICE DIN CIMITIRUL DE LA HISTRIA-SAT (PUNCTUL BENT)

DE

OLGA NECRASOV și D. BOTEZATU

569.9

Descoperită întâmplător, cu ocazia unor lucrări edilitare, mica necropolă de la Histria-Sat (punctul Bent) a făcut obiectul unor săpături sistematice, conduse de arheologul Vl. Zirra de la Institutul de arheologie din București, care a efectuat toate observațiile necesare datării mormintelor, ceea ce i-a permis periodizarea lor.

Osemintele care ne-au parvenit (42 morminte) se repartizează în mod inegal pe o perioadă de cel puțin 7 secole (între secolul VI î.e.n. și secolul I e.n.). Dat fiind că Vl. Zirra opinează asupra apartenenței posibile a acestei populații la un fond local, am întreprins acest studiu pentru elucidarea apartenenței materialului și eventual pentru cunoașterea structurii populației autohtone, traco-getice, din Dobrogea mileniului I î.e.n. Menționăm că starea de conservare a materialului este în general foarte defectuoasă atât din cauza calităților solului, cât și datorită lucrărilor edilitare care au precedat săpăturile arheologice sistematice.

SITUAȚIA PALEODEMOGRAFICĂ

Precizăm că un număr de 10—15 schelete nu ne-au parvenit, fiind distruse complet în timpul lucrărilor edilitare, ceea ce face ca seria avută la dispoziție să nu poată oglindi complet situația paleodemografică a populației respective.

Apreciem a fi util să redăm repartiția după sex și vîrstă a celor 42 de schelete studiate (tabelul nr. 1).

Sînt de reținut cîteva fapte care se degajă din tabel: mortalitatea destul de ridicată a copiilor, mai ales a celor sub 7 ani; raritatea cazurilor de longevitate relativă pentru mileniul I î.e.n. (un singur bărbat a trăit peste 70 de ani, limita superioară a vieții pentru ceilalți subiecți din serie situîndu-se sub 50 de ani); mortalitate maximă la vîrsta de 30—40 de ani la bărbați și la 25—35 de ani la femei.

Tabelul nr. 1
 Repartiția după sex și vîrstă a scheletelor de la Histria-Bent

Sex	Vîrstă		Infans I		Infans II		Juvenis		Adultus		Maturus		Senilis		Indeterminabilă		Total	
			(0-7)		(7-14)		(14-20)		(20-30)		(30-60)		(60-x)					
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Masculin	—	—	—	—	—	—	1	2,38	14	33,33	1	2,38	—	—	16	38,09		
Feminin	—	—	—	—	—	—	4	9,52	5	11,91	—	—	—	—	9	21,43		
Indeterminabil	9	21,43	2	4,76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	14,29	17	40,48	
Total	9	21,43	2	4,76	—	—	5	11,90	19	45,24	1	2,38	6	14,29	42	100		

CARACTERIZAREA ANTROPOLOGICĂ

În ceea ce privește caracterizarea antropologică a populației studiate, tabelul nr. 2 prezintă principalele date individuale, iar tabelul nr. 3 cuprinde datele de ordin populațional (limitele de variabilitate și mediile), calculate separat pentru fiecare sex.

Așa cum se poate constata din tabelul nr. 2, din cele 25 de schelete aparținând subiecților care au depășit vîrsta de 20 de ani (al căror sex și vîrstă au putut fi stabilite) numai foarte puține prezintă un grad de conservare care poate permite un studiu complet.

Luînd în considerare datele biometrice obținute pe piesele mai mult sau mai puțin întregi, precum și observațiile morfologice făcute pe acestea și pe toate fragmentele care pot servi în acest scop, putem da o caracterizare succintă a populației reprezentate de seria osteologică de la Histria-Bent.

Neurocraniul acestei populații se caracterizează, în ansamblu, printr-un indice cranian în medie mezocran, mai accentuat la femei decît la bărbați. Distribuția acestui caracter pe categorii prezintă la bărbați o variabilitate continuă, mergînd de la un indice hiperdolicocran la un indice brahocran foarte moderat, pentru a se ridica apoi la un indice ultrabrahocran (90,59). La femei, puținele cazuri unde acest caracter a putut fi stabilit se încadrează toate în categoria mezocrană. Înălțimea calotei craniene (po-b), raportată la lungimea neurocraniului, se integrează prin mediile realizate în categoria ortocrană atît la bărbați, cît și la femei. Raportată la lărgime, ea oferă o medie metriocrană la primii și tapeinocrană la femei. Variabilitatea la bărbați este mai concentrată în cazul primului indice decît al celui de-al doilea. La femei, cele două cranii unde aceste caractere au fost stabilite se repartizează în categorii diferite. Dezvoltarea frunții se caracterizează printr-o medie eurimetopă la bărbați (situată în limita inferioară a acestei categorii) și o medie metriometopă la femei (situată la limita superioară a categoriei respective). Repartiția subiecților pe categoriile caracterului este marcată la bărbați printr-o frecvență mare a frunților eurimetoape, cele stenometope fiind rare, în timp ce la femei se remarcă o distribuție egală în categoria eurimetopă și în cea metriometopă. Occipitalul oferă o medie de tip larg la bărbați, cu o distribuție care cuprinde toate categoriile, în afară de cea îngustă. La femei media aparține tipului mijlociu, subiecții repartizîndu-se atît în această categorie, cît și în cea largă. Forma occipita-

lului este totdeauna mai mult sau mai puțin bombată. Relieful neurocraniului este mijlociu sau slab la bărbați și foarte slab la femei.

Masivul facial, prezent la numai 4 schelete, este fie lepten, fie mezen. Profilul său vertical este în general ortognat. Orbitele sînt mai frecvent mezoconce și hipsiconce, mai rar cameconce. Toate cele trei categorii de indici nazali sînt prezente, dar frecvența cea mai mare aparține celei camerine. Oasele nazale formează o carenă pronunțată. Din punctul de vedere al formei, malarele prezintă două variante: largi și relativ frontalizate, pe de o parte, și înguste, dispuse intermediar, pe de altă parte.

Mandibula este de cele mai multe ori de gracilitate mijlocie. În cîteva cazuri se observă impresii puternice la locul de inserție a maseterilor și a pterigoizilor. Apofiza mentonieră este totdeauna bine conturată.

Dențiția este de tip progresiv atît din punct de vedere morfologic cît și dimensional. Abraziunea coroanei este fie moderată, fie mijlocie.

Oasele lungi sînt în general de structură gracilă (cu excepția unui singur caz, al unui schelet masculin) și prezintă cîteva caracteristici interesante. Femurul este totdeauna platimer sau hiperplatimer, dar pilastrul nu este în toate cazurile prezent și nici relieful subtrohanterian nu este totdeauna dezvoltat. Tibia nu este însă totdeauna platicemică, întîlnindu-se și numeroase forme euricnemice, dar „fațeta orientală” este totdeauna prezentă pe marginea infero-anterioară a osului. După cum se știe, această fațetă articulară, suplimentară pentru astragal, se formează la populațiile care obișnuiesc să stea jos în poziție „ciucită”, apărînd și la multe populații preistorice sau protoistorice din Europa.

*Statura*¹, stabilită pentru 9 schelete masculine, prezintă o medie de 163,1 cm și o repartitie în care majoritatea se situează în categoriile mijlocii (supra- și submijlocie), urmate de cea joasă, un singur subiect fiind de statură înaltă (170 cm). Cele 6 schelete feminine pentru care statura a putut fi calculată oferă o medie de 153,3 cm și o repartitie paritară în cele două categorii mijlocii.

Tipul antropologic. Studiul biometric și morfosopic nu numai al pieselor osoase întregi, dar și al celor fragmentare ne permite să identificăm prezența a două tipuri mai frecvent întîlnite: cel protoeuropoid mai mult sau mai puțin gracilizat și cel mediteranoid, reprezentat atît prin varianta sa protomediterranoidă, cît și prin varianta sa mediteranoidă evoluată. La aceste două tipuri mari, reprezentate paritar, trebuie să mai adăugăm un tip alpinoid, reprezentat printr-un singur subiect (nr. 30, datat din secolele VI—V i.e.n.).

OSTEOPATHI, ODONTOPATHI ȘI PRACTICI DE ORDIN MEDICAL

Osteopatiile cel mai frecvent întîlnite sînt cele vertebrale. Astfel, 4 subiecți maturi (de 40—45 de ani, dintre care 3 bărbați și o femeie) prezintă osteofite mici sau mijlocii pe vertebrele cervicale (un subiect), dorsale (un subiect) și lombare (2 subiecți), indicînd un început de spondiloză. Dintre acești subiecți, 2 prezintă în plus și urme de noduli

¹ A fost calculată după mai multe metode: metoda Manouvrier, metoda Trotter-Gleser, metoda Breitinger (numai pentru bărbați), completată cu metoda Bach (numai pentru femei), din rezultatele obținute făcîndu-se o medie.

Tabelul

Principalele caractere individuale ale

Nr. Martin	Denumirea caracterului și a indicelui	Sec. VI l.e.n.		Sec. VI-V l.e.n.	Sec. IV l.e.n.			Sec.
		M 3 ♀ 25-30	M 48 ♂ 40	M 30 ♂ 70	M 22 ♂	M 10 ♀	M 8 ♂	M 19 ♂
1	g - op	—	—	170	213	187	—	182
8	eu - eu	—	—	154	143	142	—	142
9	ft - ft	—	—	101	—	—	—	100
10	co - co	—	—	119	—	—	—	121
12	ast - ast	—	—	—	—	100	—	111
17	ba - b	—	—	—	—	—	—	—
20	po - b	—	—	113	—	120	—	113
40	ba - pr	—	—	—	—	—	—	—
45	zy - zy	—	—	—	—	—	—	—
46	zm - zm	—	—	—	—	—	—	—
48	n - pr	—	—	—	—	—	—	65
51	mf - ek	—	—	—	—	—	—	40
52	Înălțimea orbitei	—	—	—	—	—	—	31
54	al - al	22	28	—	—	—	—	28
55	n - ns	—	—	—	—	—	—	54
65	kdl - kdl	—	—	—	124	—	—	—
66	go - go	—	98	—	93	100	96	—
68	Adâncimea mandibulei	71	72	—	71	70	72	—
8/1	Ind. cefalic	—	—	90,59	67,14	75,93	—	78,02
17/1	Ind. bazilo-bregm. long.	—	—	—	—	—	—	—
17/8	Ind. bazilo-bregm. transv.	—	—	—	—	—	—	—
20/1	Ind. porio-bregm. long.	—	—	66,47	—	63,42	—	62,09
20/8	Ind. porio-bregm. transv.	—	—	73,38	—	84,50	—	79,58
9/10	Ind. front. transv.	—	—	84,47	—	—	—	82,64
9/8	Ind. fronto-parietal	—	—	65,58	—	—	—	70,42
12/8	Ind. occipital	—	—	—	—	—	—	78,17
48/45	Ind. facial sup.	—	—	—	—	—	—	—
52/51	Ind. orbital	—	—	—	—	—	—	77,50
54/55	Ind. nazal	—	—	—	—	—	—	51,85
45/8	Ind. parieto-jugal	—	—	—	—	—	—	—
	Statura (după Manouvrier)	147	—	—	—	151	—	163
	Statura (după Trotter-Gleser)	153	—	—	—	159	—	170
	Statura (după Breitinger-Bach)	157	—	—	—	160	—	169
	Statura individ. medie	152	—	—	—	157	—	167
	Tipul antropologic	—	—	alpi- noid	proto- euro- poid	medi- tera- noid	—	proto- europo- id + nor- dic

cartilaginoși pe corpul vertebral (într-un caz pe o vertebră cervicală, în alt caz pe una lombară). În plus, 2 dintre ei mai prezintă și o deformare asimetrică a corpului vertebral. Trebuie să subliniem frecvența grupare a osteopatiilor vertebrale la același subiect.

De asemenea, semnalăm un caz de osteoporoză (la craniul nr. 23), bine vizibilă pe parietale și pe frontal, în special în regiunea supraglabelară a acestuia.

nr. 2

scheletelor de la Histril-Bent

IV - III i.e.n.		Sec. III i.e.n.	Sec. II i.e.n.	Sec. I i.e.n. - sec. I e.n.	Datare neprecisă, dar anterior sec. III-II					
M 44 ♀	M 45 ♀	M 54 ♀?	M 9 ♀	M 33 ♂?	M 15 ♂	M 23 ♂	M 28 ♂	M 26 ♂	M 13 ♂	M 36 ♂
—	189	—	185	—	181	197	192	185	190	173
—	146	—	143	—	143	146	133	127	141	140
—	103	—	96	—	—	103	—	94	99	—
—	123	—	126	—	—	124	124	115	123	119
—	113	—	115	—	—	127	124	118	113	—
—	—	—	—	—	—	143	—	—	127	—
—	109	—	119	—	121	120	—	111	113	—
—	—	—	—	—	—	92	—	—	—	—
—	—	—	131	—	—	135	—	126	132	—
—	—	—	98	—	—	104	—	—	97	—
—	—	—	67	—	—	77	—	68	75	—
—	—	—	42	—	—	40	—	43	41	—
—	—	—	30	—	—	33	—	37	38	—
—	—	—	25	—	—	24	—	27	25	—
—	—	—	50	—	—	45	—	47	56	—
—	—	—	—	—	—	125	—	107	—	—
—	—	—	—	—	—	109	—	91	98	—
—	—	—	—	—	—	70	—	73	67	—
—	79,78	—	77,30	—	79,01	74,11	69,27	66,49	74,21	80,92
—	—	—	—	—	—	72,59	—	—	66,84	—
—	—	—	—	—	—	97,95	—	—	90,07	—
—	57,67	—	64,32	—	66,85	60,91	—	60,00	59,47	—
—	74,66	—	83,22	—	84,62	82,19	—	87,40	80,14	—
—	83,74	—	76,19	—	—	83,06	—	81,74	80,49	—
—	70,55	—	67,13	—	—	70,55	—	74,02	70,21	—
—	77,40	—	80,42	—	—	77,40	—	92,91	80,14	—
—	—	—	51,15	—	—	57,04	—	53,96	56,82	—
—	—	—	71,43	—	—	82,50	—	86,05	92,68	—
—	—	—	50,00	—	—	53,83	—	57,45	44,64	—
—	—	—	91,61	—	—	92,47	—	99,21	93,68	—
151	146	148	156	159	161	167	163	165	149	—
154	150	155	159	165	163	171	168	170	152	—
156	149	156	160	164	161	172	167	169	153	—
154	148	154	158	162	162	170	166	167	151	—
—	medite- ranoid	—	protoeu- ropoid gracilizat	—	—	protoeu- ropoid	—	proto- medi- teranoid	proto- medi- teranoid	—

Un singur caz de traumatism a putut fi identificat: o fractură oblică a jumătății inferioare a diafizei humerale, consolidată defectuos, cu formarea unui calus deformant pe o lungime de 125 mm, o lărgime de 31 mm și o grosime de 29 mm (în comparație cu lărgimea de 17 mm și diametrul de 19 mm al osului simetric).

Odontopatiile sint foarte frecvente. Din 17 subiecți la care prezența dinților a permis acest studiu, la 12 s-au constatat pierderi de dinți în

Tabelul nr. 3

Mediile și variabilitatea principalelor caractere cefalo-faciale și ale staturii seriei de la Hlăstria-Bent

Nr. Martin	Denumirea caracterului și a indicelui	Bărbați			Femei		
		N	min.—max.	M	N	min.—max.	M
1	g ~ op	9	170—213	187,0	2	185—187	186,0
8	eu — eu	9	127—154	137,6	2	142—143	142,5
9	ft — ft	5	94—103	99,4	2	96—103	99,5
10	co — co	7	115—123	120,8	2	123—126	124,5
17	ba — b	2	127—143	135,0	—	—	—
20	po — b	6	111—120	115,7	2	119—120	119,5
45	zy — zy	3	126—135	131,0	1	—	131,0
48	n — pr	4	65—77	71,3	1	—	67,0
51	mf — ek	4	40—43	41,0	1	—	42,0
52	Înălțimea orbitei	4	31—38	34,8	1	—	30,0
54	al — al	5	24—28	26,4	2	22—25	23,5
55	n — ns	4	45—56	50,5	1	—	50,0
8 : 1	Ind. cefalic	9	66,5—90,6	74,7	3	75,9—79,7	76,6
17 : 1	Ind. bazilo-bregm. long.	2	66,8—72,5	69,7	—	—	—
17 : 8	Ind. bazilo-bregm. transv.	2	90,0—97,9	94,0	—	—	—
20 : 1	Ind. porio-bregm. long.	6	59,4—66,8	62,6	2	57,6—64,3	60,9
20 : 8	Ind. porio-bregm. transv.	6	73,3—87,4	81,2	2	74,6—83,2	78,9
9 : 10	Ind. front. transv.	5	80,4—84,4	82,5	2	76,2—83,7	79,9
9 : 8	Ind. fronto-parietal	5	65,5—74,0	70,2	2	67,1—70,5	68,8
12 : 8	Ind. occipito-parietal	5	77,4—92,9	82,2	2	77,4—80,4	78,9
48 : 45	Ind. facial superior	3	51,9—57,0	55,9	1	—	51,1
52 : 51	Ind. orbital	4	77,5—92,6	81,7	1	—	71,4
54 : 55	Ind. nazal	4	44,6—53,8	51,9	1	—	50,0
45 : 8	Ind. parieto-jugal	3	92,4—103,1	95,1	1	—	91,6
	Statura (după Manouvrier)	6	149—167	158	5	146—156	151
	Statura (după Trotter-Gleser)	6	152—171	164	5	150—159	157
	Statura (după Breitinger-Bach)	6	153—172	164	5	149—160	159
	Statura medie	6	151—170	163	5	148—158	154

țimpul vieții, urme de granulom și carii dentare. Repartiția pe intervale de vîrstă a subiecților cu odontopatii este următoarea : 30—35 ani : 2 ; 35—40 ani : 3 ; 40—45 ani : 3 ; 45—50 ani : 4. Unii dintre acești subiecți au suferit pierderi severe de dinți (urmate de închiderea alveolelor respective), ceea ce ar putea indica o parodontoză accentuată.

Practici medicale (sau paramedicale). Trepanația craniană a fost identificată la subiectul nr. 23, la care bolta craniană prezintă un orificiu aproape circular (11/12 mm), situat în zona suturii sagitale (sectorul 2 al acesteia : „pars verticis”).

Orificiul este înconjurat de un țesut de reparare, formînd o pantă circulară, înclinată spre orificiu, totul avînd un aspect crateriform. Panta formată de țesutul de reparare este largă de 13 mm în partea sa superioară și de 11 mm în cea anterioară, ceea ce atestă că procesul de reparare a fost aici mai puțin intens. Se poate conchide astfel că inițial orificiul practicat fusese mult mai mare, avînd un diametru aproximativ de 36 mm.

Prezența țesutului de reparare arată că procesul de vindecare a fost destul de energetic și că între momentul intervenției „chirurgicale” și moartea subiectului s-a scurs un timp destul de îndelungat. Este greu să precizăm cauzele care au determinat practicarea trepanației. Dat fiind că

atît pe endocraniu, cît și pe exocraniu nu există nici un indiciu de traumatism sau, în general, de proces necrotic, trebuie să admitem că operația nu a fost făcută în scopul regularizării unei răni și al scoaterii unor așchii osoase produse în urma unei lovituri puternice, așa cum a fost cazul altor trepanații (de exemplu, scheletul nr. 22 de la Holboca-Iași din perioada de tranziție de la neolitic la bronz prezintă o trepanație mult mai veche și nevindecată). Putem admite astfel că intervenția a fost efectuată pentru a ușura alte fenomene morbide sau că este vorba de o operație de ordin ritual. Cert este că operatorul a avut destulă dibăcie și experiență, realizînd în condiții bune, de supraviețuire destul de îndelungată a pacientului, o operație dificilă.

Consolidarea fracturii oblice de la humerusul drept al subiectului nr. 26 (deja descrisă), chiar defectuoasă în sensul formării unui calus lung și gros, dar fără încălecare a marginilor fracturii, atestă că în populația respectivă practicarea imobilizării membrului, probabil cu ajutorul unor atele, era bine cunoscută.

REZULTATE ȘI CONCLUZII

În legătură cu populația care în mileniul I î.e.n. și-a îngropat morții la punctul Bent din Histria-Sat, se ridică întrebarea dacă era o populație traco-gețică, autohtonă, sau sîntem în prezența unor elemente venite aici din altă parte, fie sciți, fie coloniștii greci? Ce ne poate spune în acest sens structura antropologică a unei mici serii de schelete, în bună parte destul de deteriorate?

Existența unor schelete prezentînd elemente ale tipului proto-europoid, mai mult sau mai puțin gracilizate, ar putea fi atribuită atît sciților, cît și traco-geților sau grecilor, acest tip fiind destul de larg răspîndit în Europa preistorică și protoistorică. Caracterul mai degrabă gracil al scheletelor, relieful cranian atenuat, statura în medie submijlocie ne fac însă să renunțăm la ipoteza că aceste schelete aparțin unei populații scitice sau unui amestec important cu sciții, aceasta cu atît mai mult cu cît întîlnim în populația respectivă tot atît de frecvent și reprezentanți ai tipului mediteranoid. Ne rămîne deci să analizăm întreaga situație din punctul de vedere al apartenenței populației respective la traco-geți sau la greci.

Datele antropologice care pot fi invocate în favoarea apartenenței populației vechi de la Histria-Bent la traco-geți ar fi tocmai prezența, la paritate cu tipul mediteranoid, a reprezentanților mai mult sau mai puțin gracilizați ai protoeuropeoizilor. Dacă aceștia se întîlnesc și în populațiile vechi grecești, prezența lor nu atinge niciodată în mileniul I î.e.n. o pondere asemănătoare cu cea a mediteranoizilor (1).

Iată de ce ni se impune concluzia că sîntem aici în prezența unui fond local dobrogean traco-gețic, fără a exclude complet un oarecare amestec cu coloniștii greci vecini. Prezența unui tip ultrabrahicran nu contrazice cu nimic acest punct de vedere, dat fiind că o formă brahicrană accentuată (hiperbrahicrană) a fost deja identificată în neoliticul dobrogean (necropola de la Cernavodă—Columbia D).

Studiul nostru vine astfel în sprijinul datelor arheologice conform cărora mormintele de la Histria-Bent aparțin unor autohtoni (sau cel mult

unor mixeleni) (5). De asemenea aduce o completare a cunoștințelor noastre privind structura antropologică a populației vechi din Dobrogea, despre care nu avem pînă în prezent decît informații mai mult sau mai puțin ample asupra antropologiei neoliticului (cultura Hamangia) (3), a eneoliticului, a perioadei de tranziție spre bronz (cultura Cernavodă) (4), precum și asupra primei vîrste a fierului (mica serie „scitică” de la Cavaclar) (2).

ÉTUDE ANTHROPOLOGIQUE DES SQUELETTES PROTO-HISTORIQUES PROVENANT D'UNE NÉCROPOLE SITUÉE SUR LE TERRITOIRE DU VILLAGE HISTRIA (LIEU DIT «BENT »)

RÉSUMÉ

Les 42 squelettes (ou restes des squelettes) étudiés dans ce travail proviennent d'une petite nécropole découverte sur le territoire du village Histria (lieu dit «Bent »), situé à 6 km de l'antique cité Histria. Ils furent datés, selon le cas, du VI^e s. av. n. è. au I^{er} s.n.è. par l'archéologue Vl. Zirra.

Les données paléodémographiques concernant cette série sont présentées dans le Tableau 1, les données anthropologiques individuelles des squelettes (situés selon la datation de chacun d'eux) dans le Tableau 2, les moyennes des caractères anthropométriques et les limites de leur variabilité dans le Tableau 3.




L'analyse des données (anthropométriques, morphoscopiques et typologiques) permet de conclure à leur appartenance à l'ancien fonds thrace-gète de Dobrogea (avec, peut-être, un certain mélange grec).

Dans la partie consacrée aux ostéopathies (en premier lieu des vertèbres), odontopathies et pratiques médicales, les auteurs décrivent un cas de trépanation guérie.

BIBLIOGRAFIE

1. BOEV P., *Die Rassentypen der Balkanhalbinsel und der Ostägäischen Inselwelt und deren Bedeutung für die Herkunft ihrer Bevölkerung*, Sofia, 1972.
2. MAXIMILIAN C., *Contribuție la studiul antropologic al craniilor din curganele de la Cavaclar*, Probl. antropol., 1959, **IV**, 47—64.
3. NECRASOV O., CRISTESCU MARIA, MAXIMILIAN C., PLOȘOR D.N., *Studiul antropologic al scheletelor neolitice descoperite în cimitirul preistoric de la Cernavodă*, Probl. antropol., 1959, **IV**, 21—45.
4. NECRASOV O., KLÜGER RACHEL, ROȘCA MARILENA, *Studiul antropologic al scheletelor eneolitice de la Dealul Sofia (Cernavodă)*, St. cerc. antropol., 1965, **2**, 2, 163—173.
5. ZIRRA VL., *Punctul Histria-Sat*, în *Șantierul Histria*, sub red. E. CONDURACHE, *Materiale și cercetări de arheologie*, 1970, **IX**, 213—220.

*Centrul de cercetări biologice Iași,
Colectivul de ecologie umană și paleantropologie*



PLANȘA I. — Craniul nr. 23 — Histria.

PALEOFAUNA NEOLITICĂ DE LA LIUBCOVA (JUD. CARAȘ-SEVERIN) ȘI UNELE ASPECTE ALE OCUPAȚIILOR LOCUITORILOR DIN COMPLEXUL CULTURAL VINCA—TURDAȘ

DE

OLGA NECRASOV, MARIA BULAI-ȘTIRBU și MARIA IACOB

569.9

COMPONENȚA MATERIALULUI PALEOFAUNISTIC DE LA LIUBCOVA

Materialul paleofaunistic descoperit în cursul săpăturilor efectuate de E. Comșa în așezarea neolitică de la Liubcova datînd din perioada mijlocie a complexului cultural Vinca—Turdaș este foarte abundent, ceea ce ne permite cîteva concluzii valabile asupra unor aspecte ale economiei primitive a populației respective.

Acest material numără 18 193 de piese, dintre care 12 616 sînt așchii sau fragmente atît de ne semnificative încît nu se poate preciza decît apartenența a 12 594 dintre ele la mamifere și a 22 la păsări. Numai 5 577 de piese, în majoritate tot fragmentare, pot fi determinate pînă la gen și chiar pînă la specie. Dintre acestea, 5 122 aparțin vertebratelor (4 779 mamiferelor și 343 peștilor) și 455 nevertebratelor (moluște).

În ansamblu, întregul material, prin gradul de fragmentare, atestă că sîntem în prezența unor resturi menajere, care se repartizează în modul următor :

Nevertebratele sînt reprezentate numai prin moluște (scoici sau fragmente ale acestora). Majoritatea (418 piese) sînt fragmente de valve ale scoicii de riu (*Unio*), cu următoarele specii : *Unio pictorum*, *U. crassus batavus* și *U. crassus decurvatus*. Restul de 37 de piese aparțin melcului comun (*Helix pomatia*).

Vertebratele sînt reprezentate prin pești osoși, păsări și mamifere. Resturile de pești (fragmente de cranii, opercule, coaste, vertebre) aparțin unor exemplare foarte mari de crap (*Cyprinus carpio* L.) și de somn (*Silurus glanis* L.). Pentru păsări nu se poate preciza nici genul, nici specia, fragmentele fiind, așa cum am văzut, cu totul ne semnificative din acest punct de vedere, ci doar originea lor aviană, dată fiind structura caracteristică, pneumatică, a osului. Materialul care corespunde mamiferelor provine în cea mai mare parte de la mamiferele domestice (bovine, ovicaprine, porcine și cîini), constituind 71,97% din totalul pieselor

determinabile pînă la specie sau gen, în timp ce resturile animalelor sălbatice nu întrunesc decît 28,02 % din acesta.

Dăm în tabelul nr. 1 repartitia materialului provenit de la mamifere.

Tabelul nr. 1

Frecvența absolută (N) și relativă (%) a speciilor sau a grupelor de mamifere domestice și sălbatice întîlnite în materialul de la Liubcova

Specia sau grupa	N	%
<i>Bos taurus</i>	2 017	42,25
<i>Ovicaprinae</i>	692	14,49
<i>Sus scrofa domesticus</i>	644	13,49
<i>Canis familiaris</i>	83	1,74
Total mamifere domestice	3 436	71,97
<i>Lepus europaeus</i> L.	15	0,32
<i>Castor fiber</i> L.	6	0,12
<i>Meles meles</i> L.	71	1,49
<i>Martes martes</i> L.	73	1,53
<i>Lutra lutra</i> L.	8	0,16
<i>Felis silvestris</i> Schreb.	15	0,32
<i>Felis lynx</i> L.	6	0,12
<i>Canis lupus</i> L.	26	0,54
<i>Canis vulpes</i> L.	18	0,37
<i>Ursus arctos</i> L.	16	0,33
<i>Sus scrofa ferus</i> L.	206	4,32
<i>Cervus elaphus</i> L.	705	14,77
<i>Capreolus capreolus</i> L.	135	2,83
<i>Alces alces</i> L.	2	0,04
<i>Bos primigenius</i> Boj. și <i>Bison bonassus</i> L.	36	0,76
Total mamifere sălbatice	1 338	28,02
Total mamifere determinabile	4 774	99,99

Dintre speciile domestice, la Liubcova primul loc îl ocupă bovinele, urmînd apoi ovicaprinele (mai mult oaia decît capra) și porcinele. Resturi de cîine sînt mult mai rar întîlnite în acest material, care reprezintă în principal deșeuri de bucătărie, ceea ce ar putea constitui un indiciu că în mod obișnuit carnea acestuia nu era întrebuintată ca hrană, cîinele fiind un animal de pază și un auxiliar pentru vînătoare.

Numărul speciilor sălbatice identificate este relativ mare (16). Cel mai des întîlnit este cerbul, ceea ce atestă marea lui frecvență în regiune, caracterul împădurit al acesteia (cerbul fiind un locuitor al pădurilor prin excelență), precum și faptul că această specie era deosebit de căutată nu

numai pentru carne și blană, dar și pentru coarnele sale, care serveau la confecționarea săpăligilor, necesare cultivării pământului. Al doilea loc îl ocupă mistrețul, urmat de căprior. Destul de frecvent erau vinați bursucul și jderul, urmați apoi de bovideele sălbatice (bizonul și bourul), de lup, vulpe, urs, pisica sălbatică și iepure. Risul, castorul, vidra și elanul erau vinați mult mai rar. Interesantă este absența resturilor provenind de la ecvidee, care figurează aproape în toate materialele paleofaunistice datate din neoliticul din țara noastră, chiar în cele mai puțin abundente decât materialul de la Liubcova (fără însă ca în neoliticul timpuriu și mijlociu să existe până în prezent indicii sigure despre starea domestică a unora dintre ele).

UNELE CARACTERISTICI ALE ANIMALELOR DOMESTICE

În vederea stabilirii caracteristicilor animalelor domestice, am realizat un studiu biometric al pieselor osoase mai frecvent întâlnite (după metoda Duerst), în special la acele dimensiuni pentru care dispunem de material comparativ destul de amplu.

Bovinele. În tabelul nr. 2 am înscris unele date biometrice obținute pentru bovinele din neoliticul de la Liubcova în comparație cu cele ale bovinelor din alte culturi neolitice din țara noastră.

Tabelul nr. 2

Dimensiunile unor piese osoase ale bovinelor adulte din cultura Vinca-Turdaș (așezarea Liubcova) în comparație cu cele din alte culturi neolitice din țară (Criș, Boian, Precucuteni)

Cultura		Dimensiunile					
		epifiza inferioară					
		radius		metacarp		tibia	
		lărgimea	diam. a-p	lărgimea	diam. a-p	lărgimea	diam. a-p
Vinca — Turdaș (Liubcova)	Var.	62,0—79,0	45,5—54,0	43,0—70,0	30,0—42,0	53,0—73,0	38,5—55,0
	M	71,25	50,50	57,00	34,60	62,13	46,06
Criș, seria sintetică	Var.	76,0—88,0	48,0—52,0	57,0—73,0	30,0—38,0	63,0—75,0	49,0—56,0
	M	80,00	50,00	64,75	35,00	68,20	51,60
Boian, seria sintetică	Var.	66,0—94,0	43,0—64,0	54,0—74,0	28,0—41,0	54,0—72,0	40,0—57,0
	M	72,92	50,50	61,92	32,96	63,60	47,80
Precucu- teni, seria sintetică	Var.	62,0—95,0	41,0—73,0	53,0—77,0	28,0—40,0	58,0—82,0	40,0—64,0
	M	77,57	52,19	64,57	34,91	67,20	49,36

Din considerarea cifrelor înscrise în tabelul nr. 2 rezultă că bovinele din așezarea Liubcova erau mai puternic gracilizate, în comparație cu strămoșul lor sălbatic (*Bos primigenius*), decât bovinele din alte așezări neolitice din țara noastră. Din acest punct de vedere, bovinele din așezările cul-

turii Boian se apropie cel mai mult de cele de la Liubcova, cu toate că și ele sînt în general mai puțin gracile decît acestea din urmă. Dacă gradul de gracilizare poată fi socotit — numai pentru neolitic — drept un indiciu al vechimii procesului de domesticire, atunci s-ar putea conchide că triburile care au locuit aproape de malul bănățean al Dunării au cunoscut mai demult creșterea vitelor. Tot atît de bine însă putem explica acest fapt și pe baza altor considerente. Astfel, se știe că crescătorii de vite primitivi obișnuiau să-și îmbogățească „septelul” cu viței de *Bos primigenius* și că adeseori aveau loc încrucișări, întîmplătoare sau nu, între bovinele domestice și reprezentanții speciei ancestrale, ceea ce avea drept consecință apariția unor descendenți oferind dimensiuni mai apropiate de cele ale acestora din urmă. În fine, nu este exclus ca bourul neolitic din zonele vecine Dunării să fi aparținut unei varietăți mai mici decît bourul din zona precarpatică a Moldovei. Credem că trebuie să recurgem la această din urmă ipoteză pentru a explica gradul mai mic de gracilizare a vitelor din cultura Precucuteni, mai tardivă decît cultura Vinca—Turdaș. Criteriul vechimii procesului domesticirii ar putea fi aplicat aici doar pentru a explica de ce vitele din cultura Criș sînt mai puțin gracilizate decît cele din cultura Vinca—Turdaș, prima fiind mai veche și deci mai apropiată în timp de începutul creșterii vitelor.

Ovicaprinele. Judecînd după resturile de coarne (piese care, împreună cu unele părți ale neurocraniului, pot fi cel mai ușor diferențiate față de cele ale ovinelor), majoritatea caprinelor (*Capra hircus*) din stațiunea studiată au aparținut tipului „prisca”. Am găsit însă și cîteva reprezentanți ai tipului „aegagrus”.

Piesele de ovine (*Ovis aries*), care au putut fi precis diferențiate de cele ale caprinelor, ne pun în fața unor exemplare foarte gracile, care se înscriu în aceeași variabilitate ca și ovinele din celelalte așezări neolitice din țara noastră. Strămoșul lor sălbatic, identificat recent și în depozitele mezolitice din peștera „La Adam” de către speologii C. Rădulescu și P. Samson, se caracteriza și el printr-o oarecare gracilitate.

Tabelul nr. 3

Dimensiunile unor pelse osoase ale ovinelor adulte din cultura Vinca - Turdaș (așezarea Liubcova) în comparație cu cele ale altor culturi neolitice din țara noastră

Cultura		Vinca—Turdaș (Liubcova)		Criș, seria sintetică		Boian, seria sintetică	
		variabilitatea	media	variabilitatea	media	variabilitatea	media
Radius, epifiza inf.	lărgimea	26,0—28,0	26,66	25,0—28,0	26,41	25,0—28,0	26,33
	diam. a—p	16,0—22,5	19,25	18,0—19,0	18,33	17,0—19,0	17,66
Metacarp, epifiza inf.	lărgimea	20,0—25,0	21,36	22,0—28,0	25,42	21,0—23,0	22,00
	diam. a—p	13,0—16,0	14,40	12,0—15,0	14,00	13,5—15,0	14,25
Tibia, epifiza inf.	lărgimea	20,0—28,0	23,32	23,0—28,0	25,00	—	—
	diam. a—p	16,0—21,5	17,91	17,5—22,0	19,00	—	—

Porcinele. Jucând după puținele resturi de exemplare mature (majoritatea resturilor provenind de la exemplare tinere și foarte tinere), porcinele din așezarea studiată prezintă o foarte puternică mărunțire în comparație cu mistrețul subfossil din aceeași regiune, ale cărui resturi au fost descoperite în același material. Acest fenomen de gracilizare se observă și la porcinele găsite în alte stațiuni neolitice din țara noastră.

Ciinii. Studiul morfologic al resturilor de ciine atestă apartenența acestui animal la varietatea „palustris”, larg răspândită în neoliticul întregii Europe.

CONCLUZII ASUPRA OCUPAȚIILOR ȘI ECONOMIEI PRIMITIVE A TRIBURILOR CARE AU TRĂIT ÎN NEOLITIC ÎN ZONA LIUBCOVA

Prevalența resturilor animalelor domestice de mare valoare alimentară (bovine, ovicaprine și porcine) atestă că, alături de cultivarea primitivă a plantelor, **creșterea vitelor** constituia o ocupație deosebit de importantă. Locuitorii neoliticului de la Liubcova erau în primul rînd crescători de vite mari (bovine), a căror domesticire era aici cunoscută de demult, ca de altfel pe întregul nostru teritoriu locuit de triburile neolitice. Creșterea ovicaprinelor, în primul rînd a ovinelor, reprezenta și ea o pondere importantă în economia acestor triburi, fără însă a atinge importanța pe care o avea creșterea bovinelor. Creșterea porcinelor avea o pondere foarte apropiată de cea a ovicaprinelor.

Este deosebit de interesant că cea mai mare parte a resturilor de porcine provin de la animale tinere și mult mai puține de la indivizi maturi, în timp ce inversul este valabil pentru bovine și ovicaprine. Această particularitate ar putea fi pusă în legătură cu faptul că, în timp ce porci furnizau numai carne și grăsime (poate și piele), bovinele și ovicaprinele erau și furnizoare de lapte, de la ultimele putîndu-se folosi și lina.

Extinderea luată de creșterea vitelor în neoliticul de pe teritoriul nostru a fost favorizată, cel puțin la latitudinile la care se afla așezat acest teritoriu, de „optimum climateric postglaciar”, bine atestat și pentru țara noastră și care a instaurat în neolitic o climă mai dulce decît cea actuală, cu ierni mai puțin reci, ceea ce a ușurat hrănirea animalelor domestice în acest anotimp.

Vînătoarea, care jucase un rol primordial în paleolitic și mezolitic, nu mai reprezenta decît o ocupație secundară în comparație cu creșterea animalelor domestice, care constituiau o adevărată „cămară vie”. Totuși, locuitorii neoliticului de la Liubcova erau vînători iscusiți, care au utilizat din plin pentru nevoile lor resursele oferite de fauna naturală. Ei dispuneau de mijloace cu care să prindă nu numai vînatul mare, obișnuit pentru populațiile neolitice și care reclama operarea în echipe, dar și vînatul mic (*Martes martes*, *Felis silvestris*, *Meles meles*), în care scop utilizau cu multă probabilitate capcane speciale. Menționăm că în nici una din zecile de stațiuni neolitice ale căror resturi ne-au fost trimise pentru studiu nu am constatat o frecvență atît de mare a resturilor mamiferelor mici. În această ordine de idei, subliniem numărul mare de resturi de jder (*Martes martes*) și bursuc (*Meles meles*), fiecare intrînd peste 70 de

piese, care pot fi atribuite la nu mai puțin de 25—30 de exemplare. Deosebit de interesant este că majoritatea pieselor sînt jumătăți de mandibulă.

Totuși, obiectul principal al vîntorii, ca și în celelalte stațiuni neolitice, era cerbul, care furniza cele mai multe materii prime : carnea, blana și mai ales coarnele, întrebunțate la confecționarea uneltelor, în special a săpăligilor. Din acest punct de vedere, neoliticul de pe teritoriul țării noastre, ca și cel din Europa centrală și de vest, poate fi denumit „vîrsta cerbului”.

Ciinele era cu siguranță un ajutor activ al vîntorilor din epoca neolitică, ca și al celor din zilele noastre.

Și **pescuitul** era practicat destul de intens, fapt atestat de numărul relativ ridicat de resturi osoase provenite de la pești. Cifra atinsă de aceste resturi (343 piese) este cu atît mai importantă cu cît oasele peștilor se distrug mai repede în pămînt decît cele ale mamiferelor.

Dacă absența resturilor de exemplare mici de teleosteeni nu a fost provocată de ușurința cu care oasele peștilor sînt distruse în sol, atunci putem conchide că pescuitul era practicat cu mijloace asemănătoare celor din paleoliticul superior, adică cu harponul, eficace mai ales la pescuitul peștilor mari. În această ordine de idei trebuie să subliniem că majoritatea resturilor aparținînd peștilor provin de la exemplare mari și foarte mari de somn și crap.

În fine, **culesul scoicilor** de riu ca sursă de procurare a hranei nu era deloc neglijat, ceea ce atestă cele 418 valve sau fragmente de valve aparținînd la trei specii citate ale genului *Unio*.

LA PALÉOFAUNE NÉOLITHIQUE DE LIUBCOVA (DÉP. DE CARAȘ-SEVERIN) ET QUELQUES ASPECTS CONCERNANT LES OCCUPATIONS DES HABITANTS DU COMPLEXE CULTUREL DE VINCA—TURDAȘ

RÉSUMÉ

Le matériel paléofaunique découvert au cours des fouilles dans la station néolithique de Liubcova (plus de 18 000 fragments osseux représentant des « débris de cuisine ») provient en premier lieu des mammifères, dont les animaux domestiques forment la majeure partie (71,97 % en comparaison de 28,02 % qui revient aux mammifères sauvages, représentés par 16 espèces ; voir Tableau 1). Il faut citer en plus la présence d'assez nombreux restes (343 fragments) provenant des poissons osseux (grands exemplaires de Silure et de Carpe), ainsi que des valves d'*Unio* (418 pièces).

Tout cela signifie que les habitants néolithiques de Liubcova utilisaient toutes les ressources offertes par la faune d'une région boisée et à réseau hydrographique abondant, pratiquant la chasse aux grands mammifères dont en premier lieu le cerf, sans toutefois négliger le menu gibier, et spécialement les petits carnivores et rongeurs (martre, blaireau, renard, chat sauvage, lièvre, castor), ce qui pourrait prouver l'emploi de pièges. Le pêche aux mulettes (différentes espèces d'*Unio*)




Fig. 1. — a, *Bos primigenius* și b, *Bos taurus*: fragmente de humerus.




Fig. 2. — a, *Ovis arles* și b, *Capra hircus*: fragmente de coarne.



a



b

Fig. 3. — a, *Sus scrofa ferus* și b, *Sus scrofa domestica*: fragmente de mandibulă.

autant qu'aux poissons osseux y était également pratiquée. Si l'absence de restes appartenant aux petites espèces de téléostéens n'est point le résultat de la destruction de leurs squelettes au cours du séjour dans le sol, la présence d'ossements appartenant à de très grands exemplaires de Carpe et de Silure pourrait signifier que le poisson était attrapé au moyen de harpons.

L'élevage y avait pris un très important essor, à la faveur de « l'optimum climatique postglaciaire ». La première place était occupée par les bovins (42,25 %), suivis de loin par les ovicaprins (14,49 %, surtout les ovins) et les porcins (13,49 %). La présence de ces derniers, à presque égalité avec les précédents, pourrait attester le caractère plutôt stable de l'habitation. À en juger d'après les restes du chien (4,74), cet animal y était assez rare, mais cela peut tenir à ce que n'étant pas habituellement consommé, ceux-ci ne pouvaient pas se trouver parmi les débris de cuisine. Les données biométriques qui purent être obtenues pour les bovins et les ovins (Tableaux 2 et 3, sur un matériel fort fragmentaire) indiquent que les bovins étaient fortement gracilisés, ce qui témoigne de l'ancienneté de leur domestication. Pour ce qui est des ovins, il faut souligner leur appartenance à une forme gracile, assez proche du mouton mésolithique de la grotte « La Adam ».

BIBLIOGRAFIE

1. COMȘA E., *Données concernant la civilisation Vinca du Sud-Ouest de la Roumanie*, Dacia, N.S., 1969, **XIII**, 11—44.
2. NECRASOV OLGA, *Sur les restes des faunes subfossiles datant de la culture Starcevo-Criș et le problème de la domestication*, An. șt. Univ. „Al. I. Cuza”, Iași, Sect. II, 1964, **X**, fasc. 1, 167—181.
3. NECRASOV OLGA, *Studiul resturilor de faună din așezarea neolitică de la Radovanu, județul Ilfov*, Materiale și cercetări de arheologie, 1973, **X**, 39—45.
4. NECRASOV OLGA, BULAI-ȘTIRBU MARIA, *Unele aspecte ale vieții triburilor neolitice din zona Subcarpașilor Orientali*, St. cerc. antropol., 1965, **II**, 19—28.
5. NECRASOV OLGA, BULAI-ȘTIRBU MARIA, *L'élevage et la chasse chez les tribus de la culture de la Céramique peinte Cuculeni-Ariuşd*, Actes du VII^e Congr. Intern. des Sciences Préhist. et Protohist., Prague, 1966, 1304—1310.
6. NECRASOV OLGA, BULAI-ȘTIRBU MARIA, *L'élevage, la chasse et la pêche durant le Néolithique roumain*, Trudi VII Mejdunarodn. Kongr. Antrop. i Etnog. Nauk, Moscova, 1970, **5**, 544—556.
7. NECRASOV OLGA, HAIMOVICI S., *Sur la présence de la dorade (Auratus auratus L.) dans les eaux du littoral roumain de la mer Noire pendant le Néolithique*, Lucr. Ses. șt. Staț. Zool. marine Agigea, 1959, 563—566.
8. RĂDULESCU C., SAMSON P., *Sur un centre de domestication du mouton dans le Mésolithique de la grotte « La Adam » en Dobrogea*, Zeitschrift für Tierzüchtung und Züchtungsbiologie, 1962, **76**, 2/3, 282—320.

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași,
Laboratorul de morfologie animală și antropologie

CONSTITUȚIA MORFOLOGICĂ A UNOR POPULAȚII DIN CÎMPIA ROMÂNĂ ÎN FUNCȚIE DE SEX ȘI VÎRSTĂ

DE

MARIA VLĂDESCU

572.511.3/4

Cu acest studiu încheiem un ciclu de cercetări tipologice și constituționale în 16 așezări submontane și de cîmpie din Muntenia de vest (2), (3), (4), (5),

Cu toate că aspectele de ordin metodologic au fost comentate în lucrările anterioare, subliniem totuși că în studiul constituției am aplicat metoda Viola-Barbara, după ce am verificat-o factorial (1), (4). Constituțiile individuale au fost diagnosticate prin raportarea datelor la tipurile regionale, masculin și feminin, construite pe baza valorilor modale ale dimensiunilor și indicilor din sistemul constituțional al acestor autori. Datele însumează 506 femei și 501 bărbați, repartizați pe două clase de vîrstă, din așezările Suhaia, Recea, Tătărăștii de Jos, Bragadiru, Lunca și Călinești, situate în Cîmpia Română dintre Olt și Argeș, în județul Teleorman.

REZULTATE

Constituția masculină. Comparația dintre valorile modale de la munte (5) și de la cîmpie (tabelul nr. 1) evidențiază diferențe regionale mici. Astfel, la bărbați 5 caractere (d. t. tor., d.a.p. tor., ic-ic, sy-mal, xy-sy) au valori practic egale. Diferențele de la nivelul abdomenului superior — mai lung, mai lat și concomitent mai puțin profund — se concretizează într-un trunchi ceva mai voluminos și o statură mai înaltă la bărbații de la cîmpie. În schimb, trunchiul mai voluminos și statura mai mică a femeilor de la cîmpie sînt caractere ale unei constituții mai puțin zvelte față de femeile montane.

Ca și populația din zona depresionară, populația din zona de cîmpie nu este conformată preferențial după un anume model constituțional. Analiza datelor din tabelul nr. 2 evidențiază formația general longilină a bărbaților de la Recea (88%), dominant longilină a celor de la Tătărăștii de Jos (64%) sau Lunca (50%), dominant brevilină a celor de la Suhaia și un echilibru între cele două fizionomii bipolare la Călinești. În tabelul nr. 3 se observă preferința formei breviline pentru varianta excedentară și a celei longiline pentru varianta deficitară. Excepțiile care trebuie totuși

Tabelul nr. 1

Valorile modale ale caracterelor dimensionale și conformativ caracteristice populației de la cîmpie din vestul Munteniei în funcție de sex și mediul geografic

Nr. crt.	Caractere	Bărbați N = 205		Femei N = 230	
		Mod	σ	Mod	σ
1	sst - xy	15,9	1,32	13,9	1,32
2	d.t. tor.	27,5	1,85	24,9	1,82
3	d.a.p. tor.	20,9	1,66	18,3	1,44
4	xy - ep.	16,5	1,81	15,4	1,86
5	d.t. abd.	26,5	2,04	23,2	1,67
6	d.a.p. abd.	19,5	2,17	17,5	2,35
7	ep. - sy	18,6	2,10	18,2	2,20
8	ic - ic	27,4	1,98	26,8	2,03
9	ac - sty	55,5	2,20	51,8	2,61
10	sy-mal	77,7	3,10	72,0	3,48
11	Statura	169,5	7,05	154,5	5,12
Indici					
1	Ind. trunchi	27,7	4,56	23,0	3,76
2	Ind. membre	134,1	6,51	122,0	5,24

Tabelul nr. 2

Frecvența tipurilor constituționale breviline, medli și longiline în cadrul populației de la cîmpie din vestul Munteniei Bărbați

Nr. crt.	Localitatea	Vîrsta	N	Brevitip		Armonic		Longitip	
				N	%	N	%	N	%
1	Suhăia	25-35	55	33	60,0	1	1,8	21	38,2
		36-50	41	25	61,0	1	2,4	15	36,6
2	Recea	25-35	33	3	9,1	1	3,0	29	87,9
		36-50	35	9	27,7	2	5,7	24	68,6
3	Tătărăștii de Jos	25-35	33	8	24,2	4	12,1	21	63,7
		36-50	45	26	57,8	2	4,4	17	37,8
4	Bragadiru	25-35	41	22	53,7	1	2,4	18	43,9
		36-50	63	36	57,1	5	7,9	22	34,9
5	Lunca	25-35	22	8	36,4	3	13,6	11	50,0
		36-50	63	46	73,0	1	1,6	16	25,4
6	Călinești	25-35	21	10	47,6	1	4,8	10	47,6
		36-50	49	34	69,4	1	2,0	14	28,6
Femei									
1	Suhăia	20-35	50	19	38,0	—	—	31	62,0
		36-50	40	19	47,5	1	2,5	20	50,0
2	Recea	20-35	48	7	14,6	—	—	41	25,4
		36-50	36	8	22,2	1	2,8	27	75,0
3	Tătărăștii de Jos	20-35	27	3	11,1	1	3,7	23	85,2
		36-50	41	12	29,3	—	—	29	70,7
4	Bragadiru	20-35	52	22	42,3	1	1,9	29	55,8
		36-50	64	35	54,7	3	4,7	26	40,6
5	Lunca	20-35	28	13	46,4	—	—	15	33,6
		36-50	57	25	43,9	1	1,8	31	54,4
6	Călinești	20-35	27	14	51,9	2	7,4	11	40,7
		36-50	36	11	30,6	1	2,8	24	66,7

Tăbelul nr. 3

Frecvența variantelor constituționale breviline, medii și longiline în cadrul populației masculine de la cîmpe din vestul Munteniei

Nr. crt.	Localitatea	Vîrsta	N	Brevitip						Armonic						Longitip					
				exced.		antag.		deficit.		macro		mediu		micro		exced.		antag.		deficit.	
				N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1	Suhaiia	25-35	55	24	43,6	8	14,5	1	1,8	-	-	-	-	1	1,8	3	5,6	8	11,5	10	18,2
		36-50	41	9	22,0	14	34,1	2	4,9	1	2,4	-	-	-	-	5	12,2	5	12,2	5	12,2
2	Recca	25-35	33	2	6,1	-	-	1	3,0	-	-	-	-	1	3,0	1	3,0	18	54,5	10	30,3
		36-50	35	6	17,0	1	2,9	2	5,7	1	2,9	-	-	1	2,9	2	5,7	9	25,7	13	37,1
3	Tătărăștii de Jos	25-35	33	4	12,1	1	3,0	3	9,1	-	-	-	-	4	12,1	1	3,0	8	24,2	12	36,4
		36-50	45	13	28,9	10	22,2	3	6,7	-	-	1	2,2	1	2,2	-	-	4	8,9	13	28,9
4	Bragadiru	25-35	41	13	31,7	6	14,6	3	7,3	1	2,4	-	-	-	-	14	34,2	1	2,4	3	7,3
		36-50	63	13	20,6	20	31,7	3	4,8	-	-	-	-	5	7,9	3	4,8	4	6,3	15	23,8
5	Lunca	25-35	22	4	18,2	3	13,6	1	4,5	2	9,1	1	4,5	-	-	1	4,5	2	9,1	8	36,4
		36-50	63	20	31,7	22	34,9	4	6,3	-	-	1	1,6	-	-	2	3,2	4	6,3	10	15,9
6	Călinești	25-35	21	5	23,8	3	14,3	2	9,5	1	4,8	-	-	-	-	2	9,5	2	9,5	6	28,6
		36-50	49	9	18,4	16	32,7	9	18,4	-	-	1	2,0	-	-	-	-	5	10,2	9	18,4

Tabelul nr. 4

Frecvența variantelor constituționale breviline, medii și longiline în cadrul populației feminine de la cîmpele din vestul Munteniei

Nr. crt.	Localitatea	Vîrsta	N	Brevitip						Armonic						Longitip						
				exced.		antag.		deficit.		macro		mediu		micro		exced.		antag.		deficit.		
				N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
1	Suhaia	20-35	50	15	30,0	4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		36-50	40	12	30,0	6	15,2	1	2,5	—	—	—	—	1	2,5	3	7,5	9	22,5	8	20,0	
2	Recea	20-35	48	6	12,5	1	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		36-50	36	7	19,4	1	2,8	—	—	—	—	—	—	1	2,8	1	2,8	14	38,9	12	33,3	
3	Tătăraștii de Jos	20-35	27	2	7,4	—	—	1	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		36-50	41	7	17,1	5	12,2	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	3	7,3	10	37,0	13	48,1
4	Bragadiru	20-35	52	15	28,8	5	9,6	2	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		36-50	64	18	28,1	14	21,9	3	4,7	1	1,6	2	3,1	1	1,9	3	5,8	8	15,4	18	34,6	
5	Lunca	20-35	28	8	28,6	2	7,1	3	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		36-50	57	15	22,8	10	17,5	2	3,5	—	—	1	1,8	—	—	1	1,8	10	17,5	20	35,1	
6	Călinești	20-35	27	8	29,6	5	18,5	1	3,7	—	—	1	3,7	1	3,7	1	3,7	3	11,1	7	25,9	—
		36-50	36	8	22,2	2	5,6	1	2,8	1	2,8	—	—	—	—	3	8,3	9	25,0	12	33,3	

subliniate sînt cele de la Bragadiru, unde 34 % din bărbați sînt longilini excedentari, și de la Recea, unde 54,5 % sînt longilini cu antagonism.

Deformarea constituțională în sens orizontal, care se observă în general cu vîrsta, apare și la populațiile de la cîmpie pe care le-am cercetat. Intensitatea cu care se desfășoară procesul se poate aprecia după dublarea (Tătărăștii de Jos, Lunca) sau chiar triplarea (Recea) frecvențelor procentuale breviline în cea de-a doua clasă de vîrstă.

Studiul taxonomic al populației masculine din vestul Munteniei (2) a evidențiat o mai mare variabilitate antropologică pentru eșantioanele de la cîmpie comparativ cu cele submontane. Urmărindu-se, în cadrul acestei diversități, relația dintre tipul antropologic de fond al așezărilor de la cîmpie și fizionomia lor constituțională, frecvențele procentuale scot în evidență date concordante : a) la populația dinaro-nordică de la Recea tipul longilin însumează, în cadrul primei clase de vîrstă, frecvențe majoritare (88 %) ; b) tot dominant longilină este și populația gracilă mediteranoidă de la Lunca ; c) în schimb, la Bragadiru și îndeosebi la Suhaia, unde întîlnim caractere alpine, și virajul spre conformația mai frecvent brevilină este evident.

Aspecte de dimorfism sexual. La Recea și la Tătărăștii de Jos nu apar diferențe sexuale intrucit și femeile se grupează majoritar tot în conformația longilină.

Dimorfismul sexual este bine exprimat la populația de la Suhaia și Bragadiru, unde constituția longilină este mai puțin frecventă printre femei.

Procesul de modificare în sens brevilin, cu vîrsta, la femei nu are caracter general. Dacă în 4 așezări femeile se modifică în același sens cu bărbații, la Lunca și Călinești, dincolo de vîrsta de 35 de ani, proporția constituțiilor longiline este cea care crește și chiar marcant (tabelele nr. 2 și 4). Sigur că acest ultim aspect nu elucidează problema, dat fiind că limita maximă de vîrstă la care ne-am oprit în aceste cercetări este de numai 50 de ani.

THE MORPHOLOGIC CONSTITUTION OF SOME POPULATIONS IN THE ROMANIAN PLAIN DEPENDING ON SEX AND AGE

SUMMARY

This study deals with the constitutional physiognomy of populations living in six villages of the Romanian Plain, between the Olt and the Argeș (Teleorman county).

It describes more than 1,000 individuals, men and women, between 20 and 50.

We have applied the Barbara-Viola method [1] checked by us in a previous study by means of factorial analysis [4].

Table 1 ranks the characteristic modal values for the man and the woman in this area. The data provided in tables 2—4 point out the incidence of the brevilinear, the average, and the longilinear constitutions. An aspect worth mentioning is the relatively greater frequency of longilinear body constitutions for both men and women within the first age class.

BIBLIOGRAFIE

1. BARBARA M., *État actuel des études italiennes sur les constitutions humaines*, III^e Congrès du Bureau international d'anthropologie différentielle, Mayence, 1954.
2. VLĂDESCU MARIA, RUSU GEORGETA, MACARIE ELENA, PĂLDESCU SANDA, SAVU SILVIA, DAMȘA T., *L'analyse statistique multivariée dans l'étude anthropologique comparée de quelques populations de Muntenie-Roumanie*, Ann. roum. Anthropol., 1974, **11**.
3. VLĂDESCU MARIA, MACARIE ELENA, RUSU GEORGETA, *Determinismul factorial al unor tipuri antropologice din Muntenia (România)*, St. cerc. antropol., 1975, **12**.
4. VLĂDESCU MARIA, RUSU GEORGETA, *Factorial study of the constitutional types characteristic of the population living in the western part of Muntenia, Romania*, Ann. roum. Anthropol., 1975, **12**.
5. VLĂDESCU MARIA, *Studiul variabilității constituționale a populației unor așezări situate în zona submontană din vestul Munteniei*, St. cerc. antropol., 1976, **13**.

*Institutul „Dr. V. Babeș”
Laboratorul de antropologie București*

CERCETĂRI MIXT-LONGITUDINALE PRIVIND EVOLUȚIA TIPULUI CONSTITUȚIONAL AL UNUI LOT DE BĂIEȚI DIN ZONA DE ALTITUDINE BRAN

prin metoda antropometrică Luigi Brian

DE

CRISTIANA GLAVCE

572.512.2

În cadrul cercetărilor complexe din Culoarul Bran, împreună cu populația adultă au fost luați în studiu și copiii. În această lucrare ne ocupăm de definirea fizionomiei constituționale a unor băieți de vîrstă preșcolară și școlară mică.

MATERIAL ȘI METODĂ

Dintre parametrii antropometrici prin care poate fi definit fiecare copil, am urmărit în această fază numai setul de zece măsurători de la baza sistemului constituțional Brian. În vederea precizării tipului conformativ al fiecărei perioade de vîrstă și a modificărilor de etapă, au fost urmăriți mixt-longitudinal semestrial 360 de băieți între 5 și 8 $\frac{1}{2}$ ani din următoarele sate de altitudine ale Culoarului Bran: Măgura, Peștera, Șirnea, Fundata și Moieciu de Sus (800—1 000 m altitudine).

Ne-am oprit asupra metodei Brian nu numai pentru caracterul său operativ, ci și pentru faptul că a fost aplicată în studiul constituției populației băștinașe adulte a trei din cele cinci sate menționate (3), (4), (5). În publicațiile semnalate au fost expuse pe larg și principiile de bază ale metodologiei de lucru.

Copiii cercetați de noi fac parte din fondul populațional autohton al așezărilor, provenind din familii care timp de cel puțin trei generații au trăit acolo.

În figura 1 am construit graficul general pe baza valorilor medii ale dimensiunilor eșantionului băieților de 4,6—5,5 ani (tabelul nr. 1),

Tabelul nr. 1
Valorile statistice ale parametrilor corporali
(seria 4,6—5,5 ani)

Para- metrii	Statura	IcTr	IcTo	IcAb	IMi	DAPTO	DtTo	DtAb	PmTo	PmAb
Nr.	55	55	53	53	55	55	54	55	55	55
\bar{X}	1056,8	363,6	90,2	247,1	456,9	128,1	234,2	169,8	548,8	512,2
σ	42,3	19,1	7,4	18,6	22,5	8,6	8,9	8,0	22,4	25,8

Serie 5 ani $\bar{X}_{SY} = 1057$

$\sigma_{SY} = 4225$

$Rf = \frac{1184}{1057} = 112$




Fig. 1. — Antropometrograma creșterii diferențiate a băieților din Culoarul Bran.

comparativ cu statura, prin intermediul raportului fundamental. Am obținut astfel tipul mediu (BB) caracteristic acestei vârste și o serie de tipuri teoretice pînă la extremele $+3\sigma$ și -3σ . La acest grafic general s-au raportat apoi succesiv tipurile BB specifice pentru etapele de vîrstă între 6 și $8\frac{1}{2}$ ani, obținîndu-se astfel cîte o antropometrogramă pentru fiecare vîrstă luată în considerație.

Studiul populației masculine, prin aceeași metodă, ne-a permis să determinăm, în partea a doua a lucrării (fig. 2), tipul constituțional al copilului în raport cu adultul.

REZULTATE

Față de vîrsta de 5 ani, cu fiecare etapă băieții cresc în dimensiuni și au o conformație longilină (megaparalongilini). În cadrul grupelor de dimensiuni, diagnozele parțiale (tabelul nr. 2) scot în evidență la 6 ani un echilibru statură—șezîndă și perimetrul toracic—perimetrul abdominal, relația dintre segmentele lungi și diametrele orizontale avînd caracter longilin. De la $6\frac{1}{2}$ ani, înălțimea convențională a abdomenului crește mai repede decît înălțimea convențională a toracelui, schimbînd astfel diagnoza parțială din longilină în brevilină. Tot acum, întrucît perimetrul toracic depășește ca valoare perimetrul abdominal, se modifică și acest raport, echilibrat la 6 ani, în sens longilin. Diferențele în sensul arătat sporesc de la o etapă de vîrstă la alta (fig. 1). De remarcat că pentru toată perioada urmărită raportul statură—înălțime convențională a trunchiului rămîne echilibrat (diagnoză parțială zero).

Tabelul nr. 2

Diagnozele constituționale parțiale în funcție de bazomorful de 5 ani

Vîrsta (ani)	A	B	C	D
6	0	Lo Lo	Lo Lo	0
$6\frac{1}{2}$	0	Br Lo	Lo Lo	0
7	0	Br Lo	Lo Lo	0
$7\frac{1}{2}$	0	Br Lo	Lo Lo	0
8	0	Br Lo	Lo Lo	0
$8\frac{1}{2}$	0	Br Lo	Lo Lo	0

Față de bazomorful seriei masculine adulte din același fond populațional, antropometrogramele copiilor realizează următoarele tipuri constituționale (fig. 2) : între 5 și $6\frac{1}{2}$ ani sînt micromorfi parabrevilini ; la 7 ani devin micromorfi paramediolini, deoarece nivelele atinse de diametrele antero-posterior toracic și transvers toracic se echilibrează, iar celelalte diagnoze parțiale nu se modifică (tabelul nr. 3). Acest tip constituțional se păstrează același și la $7\frac{1}{2}$ ani. La 8 ani, întrucît perimetrul toracic crește foarte mult față de perimetrul abdominal și diagnoza parțială respectivă devine dolicoică (dizarmonică), are loc transformarea tipului microparamediolin în microdolicoitip. La $8\frac{1}{2}$ ani, diametrul antero-

posterior toracic crescînd în continuare mai intens decît diametrul transvers toracic, iar diferența dintre nivelele atinse de perimetrele toracic și abdominal reducîndu-se, se schimbă din nou tipul constituțional, re-

Tabelul nr. 3

Diagnozele constituționale parțiale în funcție de bazomortul adult

Vîrsta (ani)	A	B	C	D
5	0	Bra Bra	Br Lo	Lo
5 ¹ / ₂	0	Bra Bra	Br Lo	Lo
6	0	Bra Bra	Br Lo	Lo
6 ¹ / ₂	0	Bra Bra	Br Lo	Lo
7	0	Bra Bra	O Lo	Lo
7 ¹ / ₂	0	Bra Bra	O Lo	Lo
8	0	Bra Bra	O Lo	Dol
8 ¹ / ₂	0	Bra Bra	Br Lo	Lo

devenind microparabrevilin. De subliniat pentru toată perioada urmărită caracterul brahitip al celor două diagnoze parțiale ce determină relația dintre segmentele lungi, ca urmare a înălțimii convenționale abdominale mari, și echilibrul dintre statură—înălțime convențională a trunchiului.

S-a încercat o determinare a realizării procentuale a copiilor la diferite vîrste față de adult (tabelul nr. 4). Se observă o realizare mai uniformă la vîrsta de 5 ani, amplitudinea realizărilor parțiale fiind mai scăzută. De la o

etapă la alta, această amplitudine are tendința de a se accentua pînă la sfîrșitul perioadei luate în studiu.

Tabelul nr. 4

Realizarea procentuală a băleșilor față de adult

Vîrsta (ani)	Statura	IcTr	IcTo	IcAb	IMI	DAP To	DtTo	DtAb	PmTo	PmAb	Amplitudine
5	62,1	63,0	54,0	66,4	56,6	63,2	59,4	59,8	61,8	66,5	12,5
5 ¹ / ₂	63,4	64,3	54,0	69,1	58,6	64,3	61,8	61,0	62,1	67,1	15,1
6	65,5	65,8	55,4	70,1	60,4	64,9	63,2	62,0	62,4	67,2	14,7
6 ¹ / ₂	66,9	67,6	55,8	72,3	62,1	66,4	64,7	63,5	63,8	68,2	16,5
7	68,5	69,2	56,1	73,8	64,2	67,1	66,2	64,7	64,6	68,5	17,7
7 ¹ / ₂	70,1	70,5	56,8	76,3	65,9	68,6	67,8	66,3	65,7	69,5	19,5
8	71,2	71,7	58,8	76,9	67,5	70,1	69,3	67,5	67,3	69,8	18,1
8 ¹ / ₂	73,7	73,6	59,0	79,3	70,5	72,1	70,0	69,7	68,4	71,4	20,0

CONCLUZII

Față de copilul de 5 ani, luat ca sistem de referință, în următoarele etape de vîrstă, pe eșantioanele de băieți urmărite mixt-longitudinal, se remarcă o dezvoltare a corpului în sens longilin, tendință ce se păstrează pînă la 8¹/₂ ani.

STATURA ADULT = 1673 G = 63,21 RP = 1,11




Fig. 2. — Antropometrograma diferențiată a băieților în sate de altitudine din Culoarul Bran în raport cu adultul.

Comparativ cu adultul, băieții se caracterizează printr-o constituție armonică de tip parabrevilin între 5 și $6\frac{1}{2}$ ani, armonică medie între 7 și $7\frac{1}{2}$ ani, dizarmonică medie la 8 ani, pentru ca la $8\frac{1}{2}$ ani tipul constituțional să redevină parabrevilin.

Se semnalează că între 7 și $7\frac{1}{2}$ ani băieții, realizând o tipologie medie, se apropie cel mai mult de caracteristicile adultului luat ca sistem de referință. De asemenea, trecându-se de la tipul brevilin la cel mediu, se poate afirma că este o etapă de longilinizare. Aceasta ar corespunde cu prima perioadă de alungire a lui Stratz, dar mai întârziată cronologic decât este indicată în literatură.

RECHERCHES MIXT-LONGITUDINALES CONCERNANT L'ÉVOLUTION DU TYPE CONSTITUTIONNEL D'UN LOT DES GARÇONS HABITANT LA ZONE D'ALTITUDE DE BRAN

À L'AIDE DE LA MÉTHODE ANTHROPOMÉTRIQUE

LUIGI BRIAN

RÉSUMÉ

Le présent travail porte sur l'évolution du type constitutionnel (méthode Luigi Brian), poursuivi sur un lot de garçons (série mixte-longitudinale) depuis l'âge de 5 ans jusqu'à $8\frac{1}{2}$ ans, appartenant à une population autochtone d'habitat d'altitude.

En partant du type constitutionnel obtenu pour l'enfant de 5 ans, on constate une évolution continue dans le sens longiligne.

Si c'est l'adulte de cet habitat qui est pris comme élément de référence, l'évolution des enfants est caractérisée par une constitution harmonique de type parabréviline pour les échantillons de 5, $5\frac{1}{2}$, 6 et $6\frac{1}{2}$ ans, harmonique moyenne pour 7 et $7\frac{1}{2}$ ans, dysharmonique moyenne à 8 ans. Enfin, à $8\frac{1}{2}$ ans, le type constitutionnel redevient parabréviline.

BIBLIOGRAFIE

1. BRIAN L., *Recherches sur la croissance différentielle des enfants liguriens en application de la méthode anthropométrique*, Bull. Mém., 1965, **XI**, 7, 487.
2. BRIAN L., *Construction immédiate des anthropométrogrammes et diagnostics constitutionnels d'orientation dans les recherches sur des échantillons très amples de populations humaines*, Anthropologie, 1966, **IV**, 3.
3. ENĂCHESCU T., POP S., *Studiul antropologic al populației din satul Măgura (Bran)*, St. cerc. antropol., 1972, **9**, 139—144.
4. POP S., VLĂDESCU M., ENĂCHESCU T., *Fizionomia constituțională a populației din satul Șirnea (Bran) prin tehnica și metoda antropometrică prof. Brian*, St. cerc. antropol., 1970, **7**, 193—205.
5. VLĂDESCU M., *Variabilitatea constituțională a populației masculine din satul Peștera (Bran)*, St. cerc. antropol., 1974, **11**, 11.

Institutul „Dr. V. Babeș”,
Laboratorul de antropologie București

ANTROPOLOGIA POPULAȚIEI DIN SATUL EFTIMIE MURGU

DE

H. SCHMIDT

572.5

Satul Eftimie Murgu, cunoscut pînă acum cîțiva ani sub numele de Rudăria, este unul din cele mai vechi sate din Țara Almăjului, fiind amintit în documente încă în anul 1241 sub numele Gîrliște și mai tîrziu, în 1410, într-un document al prefectului de Timiș. Comuna a aparținut districtului valah de Almăj.

După unele date monografice, aici s-ar fi stabilit la un moment dat și un carecare număr de „bufeni”, veniți din ținuturile Olteniei.

Satul se află localizat pe valea riului Rudăria, la ieșirea acestuia dintr-un pitoresc defileu montan, la 6 km lateral de șoseaua națională dintre Bozovici și Mehadia.

Populația se ocupă în special cu agricultura, predominînd în acest sens creșterea vitelor. În momentul studiului, satul cuprindea peste 2 200 de locuitori. Au fost studiați 118 bărbați și 120 de femei, între 20 și 45 de ani, originari de cel puțin trei generații din comună.

CARACTERIZARE ANTROPOLOGICĂ

Calotele cefalice au lungime medie, dar o lățime relativ mare; înălțimea este mijlocie; în schimb, distanța dintre frontale este largă. Indicele cefalic și vertico-longitudinal se plasează ambii la limita superioară a categoriei mari, ceea ce înseamnă că avem de-a face cu o brahicefalie spre hiperbrahicefalie și cu o hipsicefalie moderată spre medie. Media indicelui vertico-transversal se plasează, la femei, în categoria metriocefală, pe cînd la bărbați în cea tapeinocefală. În sfîrșit, indicele fronto-parietal se repartizează și el majoritar în grupa eurimetopă (tabelele nr. 1 și 2).

În ceea ce privește caracterele masivului facial, la bărbați întregul masiv se înscrie în limitele categoriei mari. Atît distanța dintre gonioane, cît și cea dintre zigome este incipient largă și este dominată de valoarea nazion-gnation, plasată în centrul categoriei. La femei, raportul dintre cele trei dimensiuni este foarte asemănător cu cel de la bărbați, însă pe lățimi mijlocii. Din cauza raporturilor amintite, indicele facial total este în general leptoprosop. Nasul se caracterizează printr-o lungime mare, alarele fiind mijlocii sau înguste; în consecință, și indicele nazal se încadrează în categoria îngustă.

Din punct de vedere somatoscopic, populația se caracterizează prin fețe în general dreptunghiulare, prin fante palpebrale mijlociu de

Variabilitatea dimensiunilor cefalo-faciale și corporale

Caracterul	♂					♀				
	Amplitudine	M	m	σ	CV	Amplitudine	M	m	σ	CV
g - op	172-204	185,0	0,62	6,77	3,66	162-192	176,4	0,60	6,33	3,59
eu - eu	144-178	158,3	0,59	6,45	4,08	139-163	151,5	0,43	4,58	3,01
ft - ft	97-129	113,1	0,59	6,44	5,70	99-120	108,6	0,50	5,26	4,84
zy - zy	134-161	144,5	0,48	5,31	3,67	126-147	135,6	0,47	5,00	3,69
go - go	97-129	111,4	0,56	6,17	5,54	91-116	103,0	0,51	5,32	5,17
n - gn	116-142	127,4	0,51	5,57	4,37	104-134	117,8	0,59	6,12	5,19
n - sto	71-91	80,4	0,38	4,10	5,10	64-91	74,6	0,46	4,78	6,41
n - sn	51-70	59,7	0,43	4,66	7,80	48-64	54,8	0,33	3,45	6,30
al - al	28-45	34,4	0,26	2,80	8,15	27-37	31,7	0,21	2,22	6,99
t - v	112-145	123,7	0,53	5,74	4,64	111-133	119,5	0,45	4,70	3,93
Lungime ureche	56-77	63,6	0,36	3,96	6,22	52-72	59,2	0,34	3,64	6,15
Lățime ureche	29-46	37,6	0,30	3,31	8,80	29-43	34,5	0,28	2,99	8,66
Statură	1546-1924	1689,1	5,78	63,11	3,74	1456-1710	1581,7	4,64	48,93	3,09
Înălțime șezindă	809-951	890,0	3,03	33,03	3,71	770-930	841,9	2,71	28,58	3,39
Greutate	49-96	67,2	0,91	9,90	14,73	40-90	61,3	1,06	11,13	18,15
a - a	354-456	390,4	1,69	18,39	4,71	311-385	355,9	1,33	14,02	3,94
h - h	379-496	432,3	2,19	23,65	5,47	352-457	399,7	2,12	22,32	5,58
ic - ic	246-324	276,9	1,63	17,77	6,37	231-355	278,1	2,21	23,19	8,34
tro - tro	288-367	325,7	1,49	16,22	4,98	249-391	329,8	1,96	20,43	6,19
Circumferință torace	802-1135	925,7	5,88	64,10	6,92	745-1040	867,2	6,53	68,76	7,93
Circumferință șold	810-1115	937,4	5,42	58,86	6,28	820-1130	981,6	6,97	72,76	7,41
Circumferință coapsă	415-635	514,4	4,24	46,11	8,96	440-690	549,6	5,20	54,29	9,88

Tabelul nr. 2
Variabilitatea indicilor cefalo-faciali și corporali

Caracterul	♂					♀				
	Amplitudine	M	m	σ	CV	Amplitudine	M	m	σ	CV
eu - eu/g - op	76,7-96,7	85,6	0,37	4,02	4,70	78,5-94,5	85,9	0,31	3,29	3,83
t - v/g - op	59,1-78,8	66,9	0,28	3,08	4,60	61,3-75,4	67,8	0,30	3,05	4,49
t - v/eu - eu	67,9-91,2	78,2	0,34	3,67	4,69	71,6-88,7	79,6	0,35	3,67	4,61
ft - ft/eu - eu	62,6-79,0	71,4	0,32	3,49	4,89	63,9-78,8	71,7	0,28	2,96	4,13
ft - ft/zy - zy	70,3-85,6	78,2	0,32	3,47	4,43	71,5-87,4	80,1	0,32	3,33	4,16
go - go/zy - zy	69,9-89,5	77,1	0,33	3,67	4,76	67,9-86,8	75,9	0,34	3,52	4,64
n - gn/zy - zy	78,5-99,9	88,0	0,40	4,35	4,95	74,7-99,2	86,9	0,48	5,03	5,78
n - sto/zy - zy	49,0-64,8	55,7	0,31	3,33	5,98	47,4-67,9	55,1	0,36	3,73	6,78
al - al/n - sn	40,9-69,8	57,9	0,57	6,19	10,69	45,8-70,8	58,0	0,49	5,10	8,78
Indice ureche	45,3-74,2	59,1	0,48	5,25	8,88	48,3-71,4	58,3	0,46	4,83	8,29
Indice cormic	48,8-55,7	52,7	0,12	1,32	2,50	49,8-56,4	53,2	0,12	1,31	2,45
Indice Rohrer	1,04-2,19	1,40	0,02	0,21	14,86	1,02-2,16	1,54	0,02	0,26	16,62
a - a/statură	21,1-25,9	23,1	0,09	0,98	4,24	19,5-23,9	22,5	0,08	0,87	3,88
ic - ic/statură	13,7-18,7	16,5	0,09	0,98	5,96	41,2-21,4	17,6	0,13	1,38	7,86
ic - ic/a - a	62,6-81,7	71,5	0,37	4,08	5,70	64,8-96,1	78,0	0,60	6,27	8,04
Circumferință torace/ statură	47,2-69,5	54,8	0,37	4,04	7,36	45,8-64,3	54,7	0,40	4,21	7,69
Circumferință șold/ statură	48,2-68,3	55,5	0,34	3,69	6,51	51,1-72,3	62,1	0,43	4,52	7,29
Circumferință coapsă/ statură	24,7-36,8	30,5	0,26	2,85	9,35	27,1-42,1	34,6	0,31	3,27	9,45

largi, uneori înguste, orientate intermediar, prin malare mediu dezvoltate, rareori proeminente la femei și șterse la bărbați. Buza dermică, văzută din ambele planuri, în majoritatea cazurilor este dreaptă; bărbia are o poziție intermediară; mentonul este conturat, arcu mandibular prezentînd o oblicitate medie. Regiunea nazală se caracterizează prin profiluri drepte, uneori convexe la bărbați și concave la femei; septumul este orizontal, rădăcina mijlocie, așezată înalt sau mijlociu față de frunte și față de unghiul intern al ochiului.

În ceea ce privește pigmentația (tabelul nr. 3), avem de-a face cu o populație avînd unele caracteristici mediteraneene. Astfel, irisul este în

Tabelul nr. 3

Repartiția procentuală a culorilor irisului și a părului

Caracterul	Culoarea	♂		♀	
		N	%	N	%
Irisul	deschisă (1a - 2b)	22	18,6	17	15,6
	intermediar				
	deschisă (3-6)	19	16,1	14	12,8
	intermediar				
	închisă (7-11)	56	47,5	50	45,9
	închisă (12-16)	21	17,8	28	25,7
Părul	blondă (M - O)	1	0,8	1	0,9
	castanie deschis (P - R)	—	—	2	1,8
	castanie închis (S - T)	6	5,0	7	6,3
	brună (U - V)	30	25,0	25	22,5
	brun-neagră (W - Y)	83	69,2	76	68,5
	roșcată (I - IV)	—	—	—	—

majoritatea cazurilor mijlociu de închis la culoare, iar părul de obicei brun închis sau negru, existînd o deplină concordanță între cele două sexe.

Caracteristicile corporale (tabelele nr. 1 și 2) ne indică la ambele sexe statură supramijlocii și mari, iar indicele Rohrer ne arată la bărbați o evidentă eutrofie și subeutrofie cu tendință spre hipotrofie, pe cînd la femei repartiția este mai echilibrată, totuși cu tendințe spre hipertrofie. Indicele cormic este metriocorm. Restul caracterelor nu prezintă dimorfism sexual. Astfel, la ambele sexe, umerii sînt relativ lați, șoldurile relativ înguste, toracele fiind mijlociu de dezvoltat.

CONCLUZII

Ținînd seama de datele expuse, putem susține că în cadrul populației satului Eftimie Murgu predomină, din punct de vedere antropologic, elementele alpino-dinarice. Caracterele alpine constau în lărgimea mare a calotei, slaba ei dezvoltare în înălțime, tapeinocefalie și statura supra-mijlocie. Dinarismul apare în structura masivului facial prin fețe lungi și



Fig. 1. — Cîteva tipuri de bărbați din comuna Eftimie Murgu.



Fig. 2. — Citeva tipuri de femei din comuna Eftimie Murgu.

late, ca și prin profiluri nazale convexe în procente apreciabile. Evidente sînt și unele caractere nordice (indice nazal, menton, pigmentația irisului) și mediteranide (pigmentație).

Încercînd să comparăm această populație cu alte populații din zonă, se observă o oarecare asemănare, la nivelul calotei, a masivului facial și a unor caracteristici corporale cu cele ale populației de la Cornereva și Bogîltin (2), ca și cu cele ale populației unor sate din clisura Dunării, cum ar fi Padina Matei și Pescari (3).

ANTHROPOLOGY OF THE POPULATION OF THE EFTIMIE MURGU VILLAGE

SUMMARY

The paper deals with the anthropological study of 118 men and 120 women living in the Eftimie Murgu village since several generations. This village is one of the oldest in the Țara Almăjului (Banat), being attested by documents as far back as 1241. The investigations bore on 40 measurements and cephalo-facial indices, 20 somatoscopic observations, as well as on the iris and hair pigmentation.

The population is characterized by large but not very high brain pans, long and wide faces, considerable percentages of convex nasal profiles, supramedian statures and a generally dark pigmentation.

From the anthropological point of view, this population may be related to those of the Clisura Dunării (Iron Gate area) and of the Cerna Mts.

BIBLIOGRAFIE

1. LOTREANU I., *Monografia Banatului*, Timișoara, 1935.
2. SCHMIDT H., *Antropologia unei populații românești din Munții Cernei*, St. cerc. antropol., 1975, **12**, 23—33.
3. * * * *Atlasul complex „Porțile de Fier”*, Edit. Academiei, București, 1972.

*Institutul „Dr. V. Babeș”,
Laboratorul de antropologie București*

OBSERVAȚII ASUPRA DERMATOGLIFELOR LA POPULAȚIA DIN CARAȘOVA (JUD. CARAȘ-SEVERIN)

DE

CORNELIU VULPE și RODICA GAGHEȘ *

572.524.12

Satul Carașova este situat de o parte și de alta a riului Caraș, într-un mic bazinet pe care acesta îl formează la ieșirea din chei. Spre sud, localitatea este dominată de prelungirile nordice ale Munților Aninei, în timp ce la nord zona capătă aspectul unei mici depresiuni.

Investigații cu caracter dermatoglific au fost efectuate pe locuitorii acestei așezări în toamna anului 1975. Eșantionul studiat este alcătuit din 313 subiecți (127 ♂ și 186 ♀), de la care s-au recoltat atît dermatoglifile digito-palmare, cît și cele plantare.

DERMATOGLIFELE DIGITALE

Distribuția dermatoglifelor digitale în funcție de latură arată pentru ambele sexe frecvențe mai ridicate de arcuri și de bucle la mîna stîngă, în timp ce virtejurile sînt mai frecvente la mîna dreaptă. Orientarea radială se întîlnește mai des la mîna dreaptă, iar cea simetrică și ulnară la mîna stîngă (tabelul nr. 1).

Tabelul nr. 1

Dermatoglifile digitale în funcție de mînă și sex

Mînă	Sex	A	Lr	Lu	ΣL	V	VS	ΣV	r	s	u	Nr. degete
Dreapta	♂	35 5,60	34 5,44	321 51,36	355 56,80	203 32,48	32 5,12	235 37,60	57 9,12	142 22,72	426 68,16	625
	♀	68 7,31	37 3,98	557 59,89	594 63,87	209 22,47	59 6,34	268 28,81	72 7,74	128 13,76	730 78,49	930
	♂+♀	103 6,62	71 4,57	878 56,46	949 61,03	412 26,50	91 5,85	503 32,35	129 8,30	270 17,36	1156 74,34	1555
Stînga	♂	53 8,48	23 3,68	377 60,32	400 64,00	123 19,68	49 7,84	172 27,52	35 5,60	132 21,12	458 73,28	625
	♀	86 9,25	32 3,44	557 59,89	589 63,33	188 20,22	67 7,20	255 27,42	65 6,99	143 15,38	722 77,63	930
	♂+♀	139 8,94	55 3,54	934 60,06	989 63,60	311 20,00	116 7,46	427 27,46	100 6,43	275 17,68	1180 75,88	1555

* Mulțumim și pe această cale lui H. Schmidt pentru contribuția adusă la realizarea materialului dermatoglific.

Tabelul nr. 1 (continuare)

Mână	Sex	A	Lr	Lu	ΣL	V	VS	ΣV	r	s	u	Nr. degete
St. + dr.	♂	88 7,04	57 4,56	698 55,84	755 60,40	326 26,08	81 6,48	407 32,56	92 7,36	274 21,92	884 70,72	1250
	♀	154 8,28	69 3,71	1114 59,89	1183 63,60	397 21,34	126 6,77	523 28,11	137 7,37	271 14,57	1452 78,06	1860
	♂ + ♀	242 7,78	126 4,05	1812 58,26	1938 62,31	723 23,25	207 6,65	930 29,90	229 7,36	545 17,52	2336 75,11	3110

Comparând cele două sexe, se constată procente mai crescute de arcuri și bucle la femei, iar opus acestora bărbații dețin un procent mai ridicat de verticile. De asemenea, diferențele dreapta-stînga sînt mai mici la femei decît la bărbați.

Repartiția globală a dermatoglifelor digitale la populația din Carașova (A = 7,8%; L = 62,3%; V = 29,9%) arată că ea se înscrie în limitele de variabilitate caracteristice locuitorilor europeni.

DERMATOGLIFELE PALMARE

Urmărind direcția principalelor creste papilare palmare după notația Wilder, se constată transversalitatea lor mai accentuată la mîna dreaptă, atît la bărbați cît și la femei, fapt evidențiat prin numărul mai mare de terminații ale liniei A în punctele 4 și 5' și ale liniei D în punctul 11 (tabelul nr. 2).

Transversalitatea mai accentuată a creștelor papilare palmare la mîna dreaptă este pusă în evidență și de formulele Wilder, prin procentul mai ridicat de formule 11-9-7 (tabelul nr. 3), precum și de valoarea mai crescută a main-line indexului la această mîna (♂ și ♀, tabelul nr. 4).

Repartiția dermatoglifelor palmare în funcție de latură indică pentru ambele sexe frecvențe mai crescute în regiunea hipotenară și în spațiile interdigitale II și III ale mîinii drepte, în timp ce pentru regiunea tenară + spațiu interdigital I, precum și spațiu interdigital IV procente sînt mai ridicate la mîna stîngă (tabelul nr. 5). Indiferent de mîna și sex, distribuția în suită pe regiuni arată, în general, astfel:

sp. IV > sp. III > reg. hipot. > reg. ten. + I > sp. II

Triradiusul axial prezintă următoarea repartiție în suită, la bărbați și la femei, atît la mîna stîngă cît și la cea dreaptă:

t comb. > t' > t''

DERMATOGLIFELE PLANTARE

Distribuția desenelor plantare în funcție de latură arată că arcurile și verticile sînt mai frecvente la piciorul stîng în timp ce lațurile distale sînt mai des întîlnite la piciorul drept, atît la bărbați cît și la femei. Lațurile

Tabelul nr. 3
Formulele Wilder

Mina	♂					♀				
	11-9-7 -x- -0-	9-7-5 -x- -0-	7-5-5 -x- -0-	alte formule	n	11-9-7 -x- -0-	9-7-5 -x- -0-	7-5-5 -x- -0-	alte for- mule	n
Dreapta	68 53,97	25 19,84	13 10,32	20 15,87	126	73 39,25	50 26,88	24 12,90	39 20,97	186
Stinga	29 23,02	40 31,75	18 14,28	39 30,95	126	45 24,19	68 36,56	32 17,20	41 22,04	186
Dr. + st.	97 38,49	65 25,79	31 12,30	59 23,42	252	118 31,72	118 31,72	56 15,05	80 21,51	372

Tabelul nr. 4
Main-line Index

Mina Sex	St.	Dr.	St. + dr.	n
♂	7,7	9,2	8,4	126
♀	7,1	8,7	7,9	186

Tabelul nr. 5
Dermatoglifele palmare și triradiusul axial

Sex	Mina	Regiunea		Spațiul			Triradiusul axial				N
		H	T+I	II	III	IV	t	t'	t''	tt', tt'', t' t'' etc.	
♂	dr.	58 46,03	16 12,70	13 10,32	81 64,29	51 40,48	42 33,33	20 15,87	5 3,97	59 46,83	126
	st.	45 35,71	30 23,81	3 2,38	44 34,92	77 61,11	52 41,27	22 17,46	6 4,76	46 36,51	126
	dr. + st.	103 40,87	46 18,25	16 6,35	125 49,60	128 50,79	94 37,30	42 16,67	11 4,36	105 41,67	252
♀	dr.	75 40,32	23 12,36	6 3,22	92 49,46	93 50,00	66 35,48	19 10,22	21 11,29	80 43,01	186
	st.	64 34,41	35 18,82	1 0,54	61 32,80	112 60,21	61 32,80	36 19,35	21 11,29	68 36,56	186
	dr. + st.	139 37,36	58 15,59	7 1,88	153 41,13	205 55,11	127 34,14	55 14,78	42 11,29	148 39,78	372
♂ + ♀	242 38,78	104 16,66	23 3,68	278 44,55	333 53,36	221 35,42	97 15,54	53 8,49	253 40,54	624	

peroneale sînt ceva mai frecvente la stîngul decît la dreptul, iar lațurile tibiale prezintă procente asemănătoare la ambele picioare (δ și η , tabelul nr. 6). Indiferent de picior și de sex, repartitia în suită a dermatoglifelelor plantare se prezintă astfel:

arcuri > lațuri distale > verticile > lațuri peroneale > lațuri tibiale

Tabelul nr. 6

Dermatoglifele plantare

Regiunea	Piciorul stîng			Piciorul drept			Piciorul st. + dr.		
	δ	η	$\delta + \eta$	δ	η	$\delta + \eta$	δ	η	$\delta + \eta$
O	316 49,76	536 57,63	852 54,44	303 47,72	522 53,13	825 52,72	619 48,74	1058 56,88	1677 53,58
D	156 24,57	218 23,44	374 23,90	188 29,61	239 25,70	427 27,28	344 27,09	457 24,57	801 25,60
P	54 8,50	53 5,70	107 6,84	50 7,84	50 5,38	100 6,39	104 8,19	103 5,54	207 6,61
T	23 3,62	31 3,33	54 3,45	22 3,46	36 3,87	58 3,71	45 3,54	67 3,60	112 3,58
F	— —	— —	— —	1 0,16	— —	1 0,06	1 0,08	— —	1 0,03
W	86 13,54	92 9,89	178 11,37	71 11,18	83 8,92	154 9,84	157 12,36	175 9,40	332 10,60
Nr. de regiuni	635	930	1565	635	930	1565	1270	1860	3130

În concluzie, se observă că dermatoglifele studiate se repartizează conform schemelor clasice, fără a se întîlni evidente abateri de la regulă. Pe baza datelor obținute se constată că eșantionul se încadrează în limitele de variabilitate caracteristice populațiilor europene.

**REMARQUES SUR LES DERMATOGLYPHES CHEZ LA
POPULATION DE CARAȘOVA (DÉP. DE CARAȘ-SEVERIN)**

RÉSUMÉ

Les auteurs ont effectué des investigations dermatoglyphiques sur un échantillon de 313 habitants de Carașova (dép. de Caraș-Severin).

La répartition des dermatoglyphes en fonction de la main et du sexe concorde en général avec les schémas classiques. Les données obtenues restent dans les limites de variation caractéristiques pour les populations européennes.

*Institutul „Dr. V. Babeș”,
Laboratorul de antropologie București*

CERCETĂRI HEMOTIPOLOGICE ÎN JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

DE

SIMONA BERONIADE, RODICA GAGHEȘ, TATIANA DRĂGHICESCU și A. GAGHEȘ *

572.5 : 616.15

În vederea elaborării „Atlasului antropologic al Republicii Socialiste România”, cercetările întreprinse de noi tind să acopere pe cât posibil întreg teritoriul țării. Subiecții testați au fost selecționați în așa fel încât să fie născuți de minimum trei generații în comuna sau satul respectiv.

Ne-am oprit asupra județului Caraș-Severin întrucât în ultimii ani, în cadrul cercetărilor hemotipologice, în această zonă a țării au fost introduse, pe lângă determinările curente (sistemele AB0, MN, Rh (D), statusul secretor salivar (ABH), testul la PTC, sistemul Hp), și studiul variabilității altor proteine serice (Tf), precum și al unor sisteme enzimactice (fosfataza alcalină serică și LDH).

MATERIAL ȘI METODĂ

Materialul prezentat în lucrarea de față nu va reflecta situația din fiecare localitate în parte. Prelucrarea statistică a datelor recoltate, utilizarea testului χ^2 de conformitate și comparație ne-au permis o grupare a acestora pe zone mai întinse. Au fost examinați subiecți de ambele sexe dintr-un număr de 20 de localități, grupate în trei zone : sate situate în zona Dunării¹, pe valea Cernei² și în zona Reșiței³.

O parte din date au fost deja publicate (1), (2), (5), (6), (7).

Pentru sistemele AB0, MN, Rh(D), testul PTC, statusul secretor salivar (ABH) și sistemul Hp au fost utilizate metodele curente de determinare. În ceea ce privește transferinele, am folosit electroforeza verticală în gel de poliacrilamidă (8), pentru LDH electroforeza orizontală în gel de amidon (3), iar pentru fosfatazele alcaline tot o migrare electroforetică în gel de amidon (4).

* Mulțumim și pe această cale cercetătorului științific Elena Radu pentru materialele puse la dispoziție.

¹ Berzasca, Bigăr, Girnic, Liubcova, Măcești, Padina Matei, Pescari, Pojejena, Ravensca, Sfânta Elena.

² Cornea, Cornereva, Mehadia, Plugova, Topleț.

³ Carașova, Cilnic, Lindenfeld, Văliug.

REZULTATE

Rezultatele cercetărilor noastre sînt prezentate în tabelele nr. 1 și 2. **Sistemul AB0.** Pentru toate grupele, valorile se înscriu în limitele normale întîlnite în țara noastră. Nu există diferențe statistice semnificative între cele trei zone cercetate.

Tabelul nr. 1

Frecvența fenotipică a sistemelor studiate

Sistem	Fenotip	Nr.	Total		Zona Dunăre		Zona V. Cernei		Zona Reșița	
			nr.	%	nr.	%	nr.	%	nr.	%
AB0	A	6040	2556	42,32	1668	41,77	392	43,46	496	43,32
	B		996	16,49	707	17,71	140	15,52	149	13,01
	0		2135	35,35	1382	34,61	325	36,03	428	37,38
	AB		353	5,84	236	5,91	45	4,99	72	6,29
MN	M	5118	1199	23,43	899	22,52	82	25,15	228	28,11
	MN		3116	60,88	2511	62,92	166	50,92	439	54,13
	N		803	15,69	581	14,56	78	23,93	144	17,76
Rh(D)	Rh	5594	4959	88,65	3616	91,06	406	84,94	937	81,83
	rh		635	11,35	355	8,94	72	15,06	208	18,17
ABH	Se	4859	2647	54,48	1777	47,42	258	79,14	612	77,86
	se		2212	45,52	1970	52,58	68	20,86	174	22,14
PTC	T	885	683	77,17	—	—	307	78,32	376	76,26
	t		202	22,83	—	—	85	21,68	117	23,74
Hp	Hp ₁	926	116	12,53	—	—	41	11,92	75	12,82
	Hp ₂₋₁		435	47,19	—	—	151	43,89	286	48,89
	Hp ₂		373	40,28	—	—	159	44,19	224	38,29
Tf	CC	717	651	90,79	—	—	366	95,06	285	85,84
	CB		50	6,97	—	—	10	2,60	40	12,05
	CD		12	1,67	—	—	7	1,84	5	1,51
	BB		4	0,57	—	—	2	0,50	2	0,60
Fosfataza alcalină	I	860	582	67,67	—	—	290	76,32	292	60,83
	II		278	32,33	—	—	90	23,68	188	39,17
LDH	LDH	200	200	100,00	—	—	200	100,00	—	—

Sistemul MN. Se remarcă o creștere accentuată a factorului heterozigot MN (68,92%) pentru zona Dunării, însoțită de o scădere proporțională a celorlalți doi factori, M și N (22,52 și, respectiv, 14,56%). În ceea ce privește satele din Valea Cernei, se constată un exces de subiecți N (23,93%), asociat cu o scădere relativă a valorilor obținute pentru M (22,15%).

Sistemul Rh(D). Se observă la acest sistem un număr relativ redus de cazuri rh (8,94%) pentru satele situate în zona Dunării.

Sistemul secretor salivar (ABH). De remarcat frecvența deosebit de crescută de nesecretori (52,58%!) pentru satele din zona Dunării.

Tabelul nr. 2

Frecvența genetică a sistemelor studiate

Sistem	Genă	Nr.	Total	Zona Dunăre	Zona V. Cernei	Zona Reșița
AB0	p	6040	0,2810	0,2780	0,2833	0,2898
	q		0,1192	0,1266	0,1090	0,1015
	r		0,5998	0,5954	0,6077	0,6087
MN	m	5118	0,5387	0,5398	0,5061	0,5518
	n		0,4613	0,4602	0,4939	0,4482
Rh(D)	R'	5594	0,6631	0,7010	0,6119	0,5737
	r'		0,3369	0,2990	0,3881	0,4263
ABH	S'	4859	0,3253	0,2749	0,5433	0,5295
	s'		0,6747	0,7251	0,4567	0,4705
PTC	T'	885	0,5222	—	0,5344	0,5128
	t'		0,4778	—	0,4656	0,4872
Hp	Hp ¹	926	0,3579	—	0,3387	0,3726
	Hp ²		0,6421	—	0,6613	0,6274
Tf	C	717	0,9511	—	0,9728	0,9262
	B		0,0405	—	0,0180	0,0663
	D		0,0084	—	0,0092	0,0075

Testul PTC. Valorile obținute pentru cele două zone se înscriu în limite normale.

Sistemul Hp. La ambele zone studiate, frecvențele fenotipice și genotipice se încadrează în limite normale pentru țara noastră (1). Se observă o creștere a valorii genei Hp¹ la populația din zona Reșiței (0,3726) față de cea din zona Cernei (0,3387).

Sistemul Tf. În ambele zone au fost depistate patru fenotipuri. Surprinzător de crescut ne apare fenotipul CB din zona Reșița (12,05%!).

Fosfataza alcalină serică. La grupa de pe valea Cernei, tipul II ne apare relativ scăzut (23,68%) față de valorile obișnuite pentru populația noastră (7).

LDH. Au fost efectuate determinări numai în zona valea Cernei. Nu a fost observată nici o variantă.

CONCLUZII

Din cercetarea de față, care a avut drept scop prezentarea sistematizată a datelor de hemotipologie din județul Caraș-Severin, se desprinde o încadrare în limite normale pentru țara noastră a valorilor obținute pentru sistemele AB0, MN, Rh(D), PTC, Hp și LDH. Micile variații în plus sau în minus se întâlnesc și în alte localități.

În ceea ce privește statusul secretor salivar (ABH), Tf și fosfataza alcalină serică, sînt necesare studii suplimentare pentru explicarea rezultatelor surprinzătoare obținute.

RECHERCHES ANTHROPOLOGIQUES DANS LE DÉPARTEMENT DE CARAȘ-SEVERIN

RÉSUMÉ

Les auteurs présentent les résultats systématisés des recherches hémotypologiques effectuées dans le département de Caraș-Severin (Roumanie).

En étudiant les systèmes AB0, MN, Rh(D), le test PTC, le système Hp et le LDH, on peut voir que leurs valeurs restent dans les limites habituelles pour notre pays.

En ce qui concerne le status sécréteur salivaire (ABH), le Tf et la phosphatase alcaline sérique, il sera nécessaire d'effectuer quelques études de plus, afin d'expliquer les résultats obtenus.

BIBLIOGRAFIE

1. BERONIADE SIMONA, DUMITRU MARIA, DRĂGHICESCU TATIANA, ALOMAN S., *Studiul actual al cercelărilor sistemului haplotobinic la români*, St. cerc. antropol., 1966, **3**, 2, 189.
2. BERONIADE SIMONA, DRĂGHICESCU TATIANA, *Studiul repartiției și transmiterii ereditare a factorilor M—N în România*, St. cerc. antropol., 1973, **10**, 2, 197.
3. BLAKE N.M., KIRK R.L., PRYKE E., SINNETT P., *Lactate Dehydrogenase Electrophoretic Variant in a New Guinea Highland Population*, Science, 1969, **163**, 701.
4. BOYER S.H., *Alkaline phosphatase in human sera and placenta*, Science, 1961, **134**, 1002.
5. DRĂGHICESCU TATIANA, BERONIADE SIMONA, ALOMAN S., *Efectul factorilor etnici și al izolării genetice asupra frecvențelor fenotipice și genotipice ale grupelor Hp*, Comunicare la Ses. an. de com. științ., Inst. V. Babeș, 10.III.1976, București.
6. DUMITRESCU MARIA, DANIELESCU MARIA, CĂLĂRAȘU ELENA, POPOVICI C., *Aspectul hematologic și secretor*, în *Atlasul complex „Porțile de Fier”*, Edit. Academiei, București, 1973.
7. GAGHEȘ RODICA, GAGHEȘ A., ALOMAN S., *Comparative study of the Alkaline Phosphatase phenotypes*, Ann. roum. Anthropol., 1976, **13**, 61.
8. SUTTON M.E., KARP G. W. jr., *Absorption of rivanol by potato starch in the isolation of transferrins*, Biochem. biophys. Acta, 1965, **107**, 153.

Institutul „Dr. V. Babeș”,
Laboratorul de antropologie București

NOI CONTRIBUȚII PRIVIND VARIABILITATEA LIPIDEMIEI ȘI A COLESTEROLEMIEI ÎN DOUĂ POPULAȚII DIN DOBROGEA

DE

MARIA ISTRATE, GEORGETA MIU și ANA-CEZARINA BĂLTEANU

626.153.915/.922 : 572.5

În lucrarea de față vom urmări variabilitatea lipidemiei și a colesterolemiei la două populații din zona Deltei: Enisala și Sfintu Gheorghe. Cele două populații cercetate prezintă diferențe atât în ceea ce privește mediul în care trăiesc, ocupațiile predominante, cât și deprinderile alimentare.

Astfel, satul Sfintu Gheorghe reprezintă, prin condițiile și modul de viață, o comunitate specifică biotopului deltaic, prin faptul că majoritatea bărbaților se ocupă cu pescuitul, peștele fiind principalul furnizor de proteine și grăsimi de origine animală. Populația satului Enisala, deși situată în imediata apropiere a lacului Razelm, se ocupă în principal cu agricultura, peștele constituind totuși un element important în alimentație, deși în mai mică măsură decât la populația din Sfintu Gheorghe.

Subiecții studiați, în vîrstă între 20 și 69 de ani, au fost în număr de 217 în satul Enisala și 155 în satul Sfintu Gheorghe.

LIPIDELE TOTALE

Valorile medii ale lipidelor totale au fost calculate pentru ambele populații pe sexe și decade de vîrstă. Studiind această variabilitate, observăm o tendință de creștere a nivelului lipidelor cu vîrsta pînă la 60 de ani la bărbații din satul Enisala, după care urmează o stagnare în decada 60—69 de ani. În populația masculină a satului Sfintu Gheorghe, creșterea nivelului lipidelor cu vîrsta se observă pînă la 50 de ani, urmînd o foarte ușoară scădere în decada 50—59 de ani și o scădere accentuată în decada 60—69 de ani.

Analizînd valorile medii ale lipidelor pentru etapa 20—49 de ani, observăm că între cele două populații masculine nu există nici o diferență, însă pentru etapa 50—69 de ani bărbații satului Sfintu Gheorghe sînt net avantațați, prezentînd un nivel mediu al lipidelor mult mai scăzut față de cei din Enisala.

Tabelul nr. 1

Valorile medii ale lipidelor, calculate pe sexe și decada de vîrstă

Decada de vîrstă (ani)	Bărbați					
	ENISALA			SFÎNTU GHEORGHE		
	N	M	σ	N	M	σ
20-29	15	5,39	1,38	15	5,32	0,90
30-39	32	6,30	1,70	16	6,66	1,09
40-49	28	6,86	2,02	26	6,70	1,57
50-59	19	7,25	2,27	13	6,33	1,31
60-69	6	7,25	1,32	10	5,45	0,90
20-49	75	6,31	1,85	57	6,33	1,26
50-69	25	7,25	2,08	23	5,95	1,23
	Femei					
20-29	28	5,18	1,02	17	5,11	0,80
30-39	28	6,33	1,64	15	6,02	1,23
40-49	29	6,92	1,52	16	6,47	1,14
50-59	18	7,61	1,99	15	6,72	1,44
60-69	14	8,07	1,79	12	7,13	1,92
20-49	85	6,15	1,62	48	5,85	1,25
50-69	32	7,75	1,90	27	6,90	1,68

La femeii, creșterea nivelului lipidelor cu vîrsta este progresivă pînă la ultima decadă de vîrstă. Femeile din Sfîntu Gheorghe prezintă însă în toate decadele valori medii inferioare celor din Enisala. Nivelul mai scăzut al lipidelor totale în populația din Sfîntu Gheorghe s-ar explica prin consumul mai ridicat de pește și deci de grăsimi nesaturate.

Comparînd cele două sexe din ambele populații, observăm că pentru etapa 20-49 de ani femeile oferă valori medii ale lipidelor mai mici decît bărbații. În etapa 50-69 de ani, din contra, balanța înclină net în favoarea bărbaților, nivelul lipidelor la bărbații din ambele populații fiind mai mic decît la femeii.

Coeficienții de corelație Brevais-Pearson între lipide și vîrstă vin să confirme cele comentate anterior, remarcîndu-se totodată un dimorfism sexual mai accentuat în populația satului Sfîntu Gheorghe față de cea din Enisala.


Tabelul nr. 2

Coeficienții de corelație și regresie între lipide și vîrstă

Seria	Bărbați		Femei	
	r	R	r	R
Enisala	+0,3170	+0,0564	+0,4518	+0,0618
Sfîntu Gheorghe	+0,0561	+0,0053	+0,4422	+0,0463

Studiind variabilitatea individuală a nivelului lipidelor, observăm că în ambele populații în etapa 20—49 de ani un procent mult mai mare de femei prezintă valori ale lipidelor sub 7,00 g⁰/₁₀₀ în comparație cu bărbații. După vârsta de 50 de ani, din contra, un procent mult mai mare de bărbați prezintă valori ale lipidelor sub 7,00 g⁰/₁₀₀.

Fig. 1. — Variabilitatea lipidelor totale pe baza coeficienților de regresie.



Comparând cele două populații în ceea ce privește variabilitatea individuală a lipidelor totale, observăm din nou un ușor avantaj la populația din Sfintu Gheorghe.

Tabelul nr. 3

Repartiția procentuală a subiecților în funcție de lipidele

Seria	Bărbați											
	20—49 ani						50—69 ani					
	x—7,0		7,1—11,0		11,1—x		x—7,0		7,1—11,0		11,1—x	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Enisala	19	65,33	26	34,66	—	—	16	53,33	14	46,66	—	—
Sfintu Gheorghe	41	71,91	16	28,07	—	—	19	82,60	4	17,39	—	—
	Femei											
Enisala	64	75,29	21	24,70	—	—	11	30,55	23	63,88	2	5,55
Sfintu Gheorghe	39	81,25	9	18,75	—	—	17	62,96	9	33,33	1	3,70

COLESTEROLUL

Variabilitatea valorilor medii ale colesterolului pe sexe și decade de vîrstă urmează în linii mari cele observate la lipidele totale.

Din tabelul nr. 4 se remarcă faptul că dimorfismul sexual în ceea ce privește nivelul colesterolului este mai puțin accentuat în ambele populații

Tabelul nr. 4

Valorile medii ale colesterolului, calculate pe sexe și decade de vîrstă

Decada de vîrstă (ani)	Bărbați					
	ENISALA			SFÎNTU GHEORGHE		
	N	M	σ	N	M	σ
20-29	15	1,64	0,27	15	1,62	0,27
30-39	32	1,75	0,31	16	1,88	0,32
40-49	30	1,93	0,38	26	2,00	0,40
50-59	19	2,09	0,38	13	2,10	0,35
60-69	6	1,95	0,22	10	1,85	0,35
20-49	77	1,80	0,35	57	1,87	0,38
50-69	25	2,01	0,36	23	2,00	0,37
	Femei					
20-29	28	1,65	0,24	17	1,68	0,26
30-39	28	1,79	0,28	15	1,81	0,37
40-49	29	2,02	0,40	15	1,95	0,34
50-59	18	2,13	0,27	15	2,04	0,48
60-69	14	2,19	0,37	12	2,16	0,35
20-49	85	1,82	0,35	47	1,81	0,34
50-69	32	2,19	0,33	27	2,09	0,47

pină la vîrsta de 50 de ani, după care bărbații prezintă o colesterolemie mult mai mică decît femeile. Dimorfismul sexual mai puțin accentuat este ilustrat și de coeficienții de corelație Brevais-Pearson între colesterol și vîrstă.

Tabelul nr. 5


Coeficienții de corelație și regresie între colesterol și vîrstă

Seria	Bărbați		Femei	
	r	R	r	R
Enisala	+0,3720	+0,0126	+0,5513	+0,0163
Sf. Gheorghe	+0,2626	+0,0075	+0,3725	+0,0108

Variabilitatea individuală a valorilor colesterolului pentru subiecții etapei 20-49 de ani arată că în ambele populații majoritatea subiecților prezintă valori sub-limita de 2,00 g/100. În etapa 50-69 de ani se remarcă un procent ridicat de femei cu hipercolesterolemie evidentă (2,6 - 3,0 g/100) în populația satului Sfintu Gheorghe.

Datele din literatură (7) arată că variațiile privind mediile lipidelor și ale colesterolului sînt strîns legate de alimentație, caracteristicile alimentației de lungă durată a populației constituind unul din factorii care influențează homeostazia metabolismului lipidic.

Fig. 2. — Variabilitatea colesterolului pe baza coeficienților de regresie.



În studiile noastre am încercat să facem o corelație între nivelul lipidelor totale și al colesterolului și regimul alimentar al celor două populații, prin efectuarea unor anchete alimentare în aceeași perioadă cu determinările biochimice.

Tabelul nr. 6

Repartiția procentuală a subiecților în funcție de colesterolemie

Seria	Bărbați											
	20—49 ani						50—69 ani					
	x—2,0		2,1—2,5		2,6—3,0		x—2,0		2,1—2,5		2,6—3,0	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Enisala	61	79,22	12	15,58	4	5,19	20	66,66	6	20,00	4	13,33
Sfintu Gheorghe	39	68,42	13	22,80	5	8,77	13	56,52	9	39,13	1	4,34
	Femei											
Enisala	65	76,47	16	18,82	4	4,70	13	36,11	18	50,00	5	13,88
Sfintu Gheorghe	33	70,21	13	27,65	1	2,12	15	55,55	6	22,22	6	22,22

Din analiza tabelului nr. 7 observăm că, deși consumul de lipide din totalul caloric este destul de ridicat în ambele populații, totuși valorile medii ale lipidelor și colesterolului (cu foarte mici excepții) se mențin în limitele normalului. Acest lucru ne-a determinat să ne gândim în primul rând la consumul ridicat de grăsimi nesaturate, care, după mulți autori (Brönte-Stewart, Wood, Shioda, Kinsell, Olson), ar avea rolul de a scădea nivelul lipidelor serice și mai ales al colesterolului. De asemenea, procentul de lipide totale consumate din totalul caloric este aproape egal la cele două populații. Procentul de lipide nesaturate din totalul caloric, ca de altfel și raportul lipide nesaturate/lipide totale, este însă ușor crescut în populația satului Sfintu Gheorghe. Acest lucru ar explica nivelul ceva mai scăzut al lipidelor plasmatică, presupunând totuși o mai mare stabilitate a metabolismului colesterolului.

Tabelul nr. 7

Rația calorică și cantitatea de lipide consumate de individ/zi

	Enisala	Sfintu Gheorghe
Calorii	3665	4100
Lipide totale	125,70	146,20
Lipide totale % din consumul caloric	34,29	35,65
Lipide nesaturate	83,60	111,30
Lipide nesaturate % din consumul caloric	22,81	27,14
Lipide nesaturate/lipide totale	66,52	76,12

Un al doilea factor care ar influența favorabil nivelul lipidelor totale și al colesterolului ar fi efortul fizic depus, date fiind ocupațiile bărbaților din cele două populații.

Tabelul nr. 8

Frecvența profesiunilor bărbaților studiați în cele două populații (%)

Seria	Țărani	Pescari	Muncitori	Funcționari
Enisala	52,66	9,33	29,33	8,66
Sf. Gheorghe	—	79,67	14,63	5,68

Femeile din Sfintu Gheorghe sînt în majoritate casnice, pe cînd cele din Enisala, dat fiind specificul agricol al satului, sînt angajate și ele în munca cîmpului aproape la fel cu bărbații. Acest lucru ar explica dimorfismul sexual mai accentuat în populația din Sfintu Gheorghe față de cea din Enisala.

CONCLUZII

Datele obținute de noi în prezenta lucrare sprijină concepția asupra orientării variabilității indicatorilor studiați (lipide și colesterol) în conformitate cu sexul, vîrsta și factorii ecologici (în special cu tipul de alimentație și ocupația).

În adevăr, consumul mai ridicat de lipide nesaturate în Sfintu Gheorghe determină la ambele sexe un nivel mai scăzut al lipidelor totale. Totuși, diferențe semnificative există numai între loturile de femei cuprinse între 20 și 59 de ani ($T = 2,3225$).

Diferențele sexuale sînt mai accentuate în populația din Sfintu Gheorghe, dat fiind că bărbații, prin ocupațiile lor, depun un efort fizic mai mare decît femeile, care în majoritate sînt casnice. La Enisala, aceste diferențe sînt mai puțin accentuate, datorită faptului că ocupația de bază a populației este agricultura, în care sînt angajate și femeile.

NOUVELLES CONTRIBUTIONS CONCERNANT LA LIPIDÉMIE ET LA CHOLESTÉROLÉMIE CHEZ DEUX POPULATIONS DE DOBROGEA

RÉSUMÉ

La variabilité des indicateurs biochimiques (lipides et cholestérol) étudiée dans deux localités rurales de Dobrogea (Enisala et Sf. Gheorghe), différentes sous quelques aspects écologiques, offre des différences significatives ($T = 2,3225$) en ce qui concerne le niveau moyen des lipides chez les femmes âgées de 20 — 59 ans ; il est plus bas à Sf. Gheorghe, où la consommation des graisses non saturées est supérieure à celle d'Enisala. Cette différence n'est point enregistrée à l'égard du cholestérol. D'autre part, entre les lots masculins et féminins, les différences du niveau des lipides sont toujours plus élevées à Sf. Gheorghe qu'à Enisala, tandis que pour le cholestérol elles deviennent bien marquées chez les deux populations seulement après l'âge de 50 ans.

BIBLIOGRAFIE

1. BRAUNER R., PANAITESCU GH., DEMAYO A., NIȚU V., IAMANDI I., *Interrelații meiolobice în ateroscleroză*, Med. int., 1968, **XX**, 12.
2. CRISTESCU MARIA, ISTRATE MARIA, BĂLTEANU CĂZARINA, *La variabilité de la lipidémie et de la cholestérolémie*, Ann. roum. Anthropol., 1976, **13**.
3. DAS B.C., *Etude de la tension artérielle et du cholestérol en relation avec l'âge et le poids chez les hommes adultes du Bengal*, Biotypologie, 1959, **XX**, 4.
4. DRĂGHICESCU TATIANA, ALOMAN S., *Cercetarea unor constante biochimice la populația rurală din Fundata*, St. cerc. antropol., 1968, **5**, 2.
5. DRĂGHICESCU TATIANA, ALOMAN S., *Cercetarea unor constante biochimice la populația rurală din satul Șirnea*, St. cerc. antropol., 1970, **7**, 1.
6. DUMITRU-TIBERA MARIA, MORTUN MARIA, DRĂGHICESCU TATIANA, *Constante biochimice în populația din zona de deal din regiunea Oltenia*, St. cerc. antropol., 1965, **2**, 2.
7. MOGA A., HĂRĂGUȘ ȘT., *Ateroscleroza*, Edit. Acad. R.P.R., Eucurești, 1963.
8. ORHA I., *Studiul unor factori de risc în apariția și dezvoltarea aterosclerozei*, Med. int., 1971, **XXIII**, 3.
9. WOOD P.D.S., SHIODA R., KINSELL L.W., *Reglarea metabolismului colesterolic prin regim alimentar*, Bul. inf., 1966, **6**, 12.

*Centrul de cercetări biologice Iași,
Colectivul de ecologie umană și paleontologie*

ASPECTE DEMOGRAFICE PRIVIND DOUĂ COMUNITĂȚI DIN DOBROGEA

DE

P. SEVASTRU și SILVIA GHIGEA


577.4 : 312

Investigațiile efectuate asupra unor populații din Delta Dunării și limitrofe ei au avut în vedere principalele fenomene demografice, acestea servind la întregirea caracterizării populațiilor respective și oferind rapoarturi interesante cu unele particularități biologice și de mediu ale comunităților.

Lucrarea de față se referă pe scurt la cîteva aspecte demografice ale populațiilor umane din satele Enisala și Sfintu Gheorghe, aflate primul în imediata vecinătate a lacului Razelm, iar cel de-al doilea la punctul de revărsare în mare a brațului Sfintu Gheorghe.

Gradul de deschidere demografică. Din totalul căsătoriilor înregistrate în fiecare din cele două sate, grupate pe perioade de cîte zece ani, figura 1 reprezintă curba frecvenței endogame, în care ambii parteneri sînt localnici. Se remarcă, în afara unui „vir” ce corespunde unei deschideri

Fig. 1. — Variațiile valorilor indicelui de endogamie în satele Enisala și Sfintu Gheorghe.



demografice foarte slabe, predominanța valorilor supramijlocii, cu tendință de scădere. Aceasta indică, în ansamblu, o moderată deschidere demografică ce tinde să se accentueze.

Față de alte sate studiate de noi anterior, unde, după o îndelungată perioadă de persistență a valorilor ridicate ale indicelui de endogamie,

urma o scădere aproape explozivă, coincidind cu deschiderea demografică caracteristică azi majorității comunităților noastre sătești, valorile indicelui de endogamie al satelor Enisala și Sfintu Gheorghe, după o primă perioadă de evoluție ascendentă, scad treptat în ultimele 4—5 decenii.

Accentuarea deschiderii demografice prin creșterea frecvenței căsătoriilor exogame, în care un partener este localnic și altul străin de sat, atrage după sine accentuarea gradului de heterogenitate a fondului biologic al populațiilor. Facem remarcă unei frecvențe mai mari a căsătoriilor exogame în care femeia este partenerul străin de sat comparativ cu căsătoriile în care partenerul străin este bărbatul. Aceasta arată că femeile sînt aici principalii „agenți” ai heterogenizării. Situația inversă a fost întilnită în satele Letea și C.A. Rosetti.

Condiția de sat azi relativ deschis demografic a localității Sfintu Gheorghe se explică prin poziția sa de dublu port, la Dunăre și la Marea Neagră. În ceea ce privește satul Enisala, situația lui aproape similară se explică prin așezarea la un punct nodal al căilor de circulație ce fac legătura între Babadag—Jurilovca—Tulcea, Tulcea—Babadag.

Structura populațiilor după vîrstă și sex a fost reconstituită pentru trei momente din anii 1956, 1966 și 1975 în cazul satului Enisala și pentru două momente din anii 1966 și 1976 în cazul satului Sfintu Gheorghe.

Pentru satul Enisala, grupa generațiilor 0—19 ani are o pondere relativ constantă, generațiile 20—64 de ani suferă o reducere, cu circa 4%, iar ponderea generațiilor vîrstnice (65 — x ani) crește cu 3—8%. Scăderea ponderii generațiilor adulte și creșterea celei a generațiilor vîrstnice reprezintă, pe de o parte, consecința creșterii duratei medii a vieții, iar pe de altă parte urmarea migrației spre centre urbane.

Mediana de vîrstă a populației ilustrează același lucru: 22,5 ani în 1956, 23,2 ani în 1966 și 24 de ani în 1975.

Raportul B/F (*sex ratio*) este echilibrat pe totalul populației la toate cele trei momente analizate. Pe grupe mari de vîrstă se remarcă, după cum era de așteptat, 1—2% în plus la sexul masculin în cazul vîrstelor tinere și la sexul feminin în cazul vîrstnicilor. Coeficienții de reinnoire a populației active se mențin peste valoarea de 1,5.

La Sfintu Gheorghe se înregistrează într-o oarecare măsură o scădere a ponderii generațiilor tinere, menținerea constantă a generațiilor adulte și creșterea ponderii generațiilor vîrstnice (de la 4 la 8,17% între 1966 și 1976). Tendința de evoluție a structurii vîrstelor în sensul „îmbătrînirii” demografice este confirmată și de mediana de vîrstă: 26,5 ani în 1966 și 31 de ani în 1976.

Raportul B/F (*sex ratio*) este relativ bine echilibrat; coeficientul de reinnoire a populației active este de 1,25 în 1976, ceea ce indică o creștere evidentă a ponderii generațiilor 40—64 de ani față de generațiile 15—39 de ani, aceasta fiind poate cea mai importantă schimbare în structura populației din Sfintu Gheorghe în perioada 1966—1976.

Natalitatea și fertilitatea. La Enisala se remarcă valori mici ale acestor indicatori în perioada 1941—1945, consecință a celui de-al doilea război mondial, și valori ridicate în perioadele următoare, datorate recuperării „aminării” căsătoriilor întîrziate de război, restabilirii condițiilor de procreare, ameliorării condițiilor economice. Este de asemenea de semnalat revenirea natalității la valoarea de 20,7‰ în 1975 față de 15,8‰

în 1966, ca urmare a eficienței politicii demografice. Prin aceasta, sporul migratoriu negativ înregistrat între 1966 și 1975 este compensat, rezultând un spor total pozitiv apreciabil.

Indicele de fertilitate generală atinge în 1975 154,67‰, valoare pe care o considerăm destul de ridicată.

În cazul satului Sfintu Gheorghe se remarcă valorile mici ale natalității între 1916 și 1920 și 1941 și 1945, ca urmare a războaielor mondiale, și valori mari în perioadele de după război.

Nupțialitatea, exprimată prin indicele general, crește în ultimii 10 ani de la 7,74 la 10,20‰ la populația din Enisala și oscilează între 6,3 și 11,0‰ la Sfintu Gheorghe.

Interesante ne apar oscilațiile vârstei medii de căsătorie (fig. 2 și 3), care la bărbații din Enisala descreește treptat de la 25,21 ani între 1919 și

Fig. 2. — Variația vârste medii la căsătorie la populația din Enisala.





Fig. 3. — Variația vârstei medii la căsătorie la populația din Sfintu Gheorghe.

1925 la 23,60 ani între 1966 și 1975, cu un vîrf în perioada ultimului război mondial. Aceeași tendință de reducere a vârstei la căsătorie se constată și la femei (de la 22,17 la 20,05 ani), de asemenea cu un vîrf în aceeași perioadă. Se remarcă pe figură paralelismul dintre oscilațiile vârstei femeilor și a bărbaților.

La Sfintu Gheorghe, vîrsta medie la căsătorie pentru bărbați descrește treptat de la 28 de ani (între 1896 și 1905) la 26 de ani (între 1966 și 1976). La femei, această tendință este mai puțin evidentă, dar în orice caz sigură după al doilea război mondial. În perioada războaielor mondiale, aminarea multor căsătorii, decesele în rîndul tinerilor necăsătoriți, condițiile economice precare și climatul psihic nefavorabil au fost cauze sigure ale căsătoriilor tardive.

În ceea ce privește **mortalitatea**, în ambele sate se manifestă tendința puternică de reducere, ajungîndu-se în ultimii ani la un indice general de 4,8‰ la Enisala și de 8,4‰ la Sfintu Gheorghe.

Vîrsta medie de deces crește la Enisala în cazul bărbaților cu 36,92 ani în perioada 1966—1975 față de 1921—1925, în timp ce la femei această creștere atinge 49,90 ani. La Sfintu Gheorghe, față de perioada 1926—1935, între 1966 și 1975 vîrsta medie de deces crește la bărbați cu 22,48 ani, iar la femei cu 36,25 ani. Creșterea vîrstei medii de deces este în ambele comunități mai substanțială la femei, ceea ce, credem, arată o receptivitate mai mare a sexului feminin la ameliorarea condițiilor de viață, la care se adaugă rezistența biologică mai ridicată.

Schimbarea structurii vîrstelor, în sensul scăderii ponderii generațiilor tinere prin migrare spre oraș, a determinat creșterea vîrstei medii de deces, dar influența hotărîtoare în această creștere a avut-o îmbunătățirea atît a asistenței medicale, cît și a calității vieții.

ASPECTS DÉMOGRAPHIQUES DANS DEUX COMMUNITÉS DE DOBROGEA

RÉSUMÉ

Une analyse démographique succincte de la population des villages de Sf. Gheorghe (Delta) et d'Enisala (complexe de Razelm) met en évidence une ouverture modérée avec tendance à une exogamie plus accentuée pendant ces derniers temps.

La structure des deux populations selon l'âge et le sexe indique une proportion favorable entre les groupes de générations et un équilibre normal entre les deux sexes.

Il faut cependant signaler une certaine diminution du pourcentage qui revient aux jeunes générations à Sf. Gheorghe et aux générations adultes à Enisala, en faveur des générations d'âge plus avancé, à la suite d'une longévité croissante et des migrations vers les centres urbains.

La natalité et la fertilité furent influencées d'une manière négative par les deux guerres mondiales, mais positive par les dernières mesures démographiques. De même le niveau de vie de plus en plus élevé et l'assistance médicale améliorée ont réduit la mortalité infantile et ont prolongé la durée de la vie.

L'âge moyen au moment du mariage a baissé continuellement, les périodes des deux guerres mondiales exceptées. Après la deuxième guerre, la moyenne a diminué jusqu'à des valeurs encore plus basses qu'avant la première guerre.

BIBLIOGRAFIE

1. BOTEZATU D., SEVASTRU P., ROȘCA MARIA-ELENA, *L'évolution de l'endogamie, des mariages mixtes dans une commune du Delta du Danube depuis la fin du XIX^{ème} siècle jusqu'à nos jours*, Ann. foum. Anthropol., 1976, **13**, 37.
2. CRISTESCU MARIA, BOTEZATU D., ROȘCA MARIA-ELENA, BĂLTEANU CEZARINA, GHIGEA SILVIA, MIU GEORGETA, SEVASTRU P., *Aspecte demografice la populația din Crișan*, St. cerc. antropol., 1975, **12**, 53.
3. GOMILLA D., *Les Bedik*, Montréal, 1971.
4. PRESSAT R., *Anali-a demografică*, București, 1974.
5. ROȘCA MARIA-ELENA, SEVASTRU P., TUDOSE OLIMPIA, *Aspecte demografice într-o populație endogamă din Țara Oașului*, St. cerc. antropol., 1976, **13**, 41.

Centrul de cercetări biologice Iași,
Colecțiul de ecologie umană și paleoantropologie

CERCETĂRI DE ANTROPOLOGIE CONSTITUȚIONALĂ OCUPAȚIONALĂ ÎN SECTOARE DE MUNCĂ EXPUSE TEMPERATURILOR RIDICATE

DE

ELENA D. RADU, CAMELIA LUNGU, IONEL STĂNESCU și DAN CIOTARU

572.512.025 : 613.6

Prezenta lucrare reprezintă primul studiu de antropologie ocupațională industrială românească asupra structurii constituționale somatice a unor muncitori care își desfășoară munca în condițiile de supraîncălzire calorică ale unei turnătorii de oțel.

S-a plecat de la premisa că toleranța la căldură în unele sectoare de muncă ar avea o determinare constituțională și că condițiile de microclimat ar reprezenta principalii factori selectivi în adaptarea organismului la un anumit gen de muncă.

MATERIAL ȘI METODĂ

Cercetarea noastră a fost efectuată asupra unui număr de 418 muncitori din trei sectoare de muncă (Pregătire, Formare, Curățitorie) ale unei turnătorii de oțel.

Pentru testarea gradului de disconfort termic s-a aplicat un chestionar de toleranță individuală la căldură.

Pentru determinarea tipologiei constituționale a fost aplicată metoda antropometrografică a lui Luigi Brian.

Au fost consemnate în fișele individuale profesiunea, vechimea în profesiune, un număr de 12 dimensiuni somatice constituționale, grupa de sânge și răspunsul la chestionarul de toleranță la căldură.

DISCUȚII

În sectoarele de muncă studiate de noi, principalul factor de supra-solicitare a mediului îl constituie temperatura.

„Selectia prin neadaptare”, care acționează printr-un mecanism de cernere, menținând într-o profesiune indivizi având o anumită conformație somatică și îndepărtând indivizii inadecvați din punct de vedere somatic (ipoteză avansată de noi prin 1971), se exercită în aceste condiții de microclimat asupra toleranței la căldură.

Se consideră deci temperatura ca principalul factor de selecție în adaptarea la muncă în sectoarele de activitate studiate de noi.

Supraîncărcarea calorică poate duce la o intoleranță termică, care poate genera o scădere a eficienței muncii, creșterea incapacității temporare de muncă, creșterea numărului de erori, creșterea absenteismului și, în sfârșit, fluctuația forței de muncă, ca o tentativă de adaptare eșuată.

În ce măsură toleranța la căldură poate avea o determinare constituțională, cunoscut fiind faptul că unii oameni tolerează foarte bine căldura, în timp ce alții o tolerează foarte greu. Cunoscând tipologia constituțional-somatică a indivizilor care tolerează o încărcare calorică deosebită, se pot aduce informații prețioase în acțiunea de orientare și de selecție profesională în aceste sectoare de muncă. Din analiza indicatorilor de variabilitate dimensională somatică (tabelele nr. 1, 2, 3 și 4) se constată că

Tabelul nr. 1

Variabilitatea dimensională somatică a unei serii de muncitori de la o turnătorie de oțel

Nr. crt.	Dimensiuni somatice	N	Valori extreme	$\bar{x} \pm m$	$\pm \sigma$	CV
1	Greutatea	418	44—118	66,60 ± 0,50	10,20	15,33
2	Statura	418	1500—1890	1666,91 ± 3,25	66,46	3,99
3	Înălț. șezândă	418	785—985	876,41 ± 1,65	33,78	3,85
4	Lung. membr. inferior	418	645—1020	784,63 ± 2,48	50,70	6,46
5	Înălț. anterioară torace	418	147—305	197,67 ± 0,97	19,86	10,05
6	Diam. ant.-post. toracic	418	124—284	214,38 ± 1,00	20,32	9,48
7	Diam. biacromial	418	310—438	380,86 ± 0,95	19,40	5,09
8	Diam. biliac	418	208—390	293,71 ± 0,93	19,09	6,50
9	Circ. torace repaus	418	790—1180	923,62 ± 3,25	66,41	7,19
10	Circ. abdomen	418	660—1300	843,22 ± 4,87	99,69	11,82
11	SST plan așezat	418	497—645	581,61 ± 1,87	38,19	6,57
12	XY plan așezat	418	300—455	383,95 ± 1,25	25,47	6,63

Tabelul nr. 2

Variabilitatea dimensională somatică a muncitorilor din sectorul Turnare-Pregătire

Nr. crt.	Dimensiuni somatice	N	Valori extreme	$\bar{x} \pm m$	$\pm \sigma$	CV
1	Greutatea	153	50—95	67,35 ± 0,78	9,63	14,30
2	Statura	153	1532—1890	1674,60 ± 5,27	65,20	3,89
3	Înălț. șezândă	153	800—985	881,89 ± 2,49	30,84	3,50
4	Lung. membr. inferior	153	709—1020	793,56 ± 3,60	44,50	5,61
5	SST plan așezat	153	507—687	586,36 ± 2,26	28,00	4,78
6	XY plan așezat	153	330—450	385,94 ± 2,07	25,57	6,63
7	Înălț. anterioară torace	153	160—305	200,64 ± 1,57	19,36	9,65
8	Diam. ant.-post. toracic	153	175—284	216,21 ± 1,60	19,72	9,12
9	Diam. biacromial	153	341—428	383,45 ± 1,52	18,76	4,89
10	Diam. biliac	153	255—340	295,29 ± 1,44	17,72	6,01
11	Circ. torace repaus	153	790—1070	935,98 ± 5,19	64,24	6,86
12	Circ. abdomen	153	670—1140	850,76 ± 8,26	102,12	12,00

muncitorii care lucrează în condiții de temperatură ridicată se caracterizează printr-o structură somatică relativ omogenă, deși ei fac parte din sectoare de muncă diferențiate sub raportul solicitării prin muncă.

Sub aspectul conformației somatice, se semnalează eutrofie cu tendință de variabilitate spre hipotrofie, mezosomie cu tendință de variabilitate spre dolicosomie.

Tabelul nr. 3

Variabilitatea dimensională somatică a muncitorilor din sectorul Turnare-Formare

Nr. crt.	Dimensiuni somatice	N	Valori extreme	$\bar{x} \pm m$	$\pm \sigma$	CV
1	Greutatea	138	47— 113	66,03 ± 0,82	9,58	14,51
2	Statura	138	1500— 1817	1661,96 ± 5,64	66,24	3,99
3	Înălț. șezindă	138	815— 955	887,69 ± 2,51	29,51	3,32
4	Lung. membr. inferior	138	645— 895	778,92 ± 3,57	41,90	5,38
5	SST plan așezat	138	530— 653	582,91 ± 4,48	52,64	9,03
6	XY plan așezat	138	332— 455	387,54 ± 2,27	26,70	6,89
7	Înălț. anterioară torace	138	153— 243	195,95 ± 1,64	19,21	9,80
8	Diam. ant.-post. toracic	138	124— 280	210,51 ± 1,83	21,52	10,22
9	Diam. biacromial	138	315— 420	383,70 ± 1,38	16,25	4,24
10	Diam. biliac	138	248— 355	291,24 ± 1,41	16,55	5,68
11	Circ. torace repaus	138	790— 1160	917,32 ± 5,27	61,88	6,75
12	Circ. abdomen	138	670— 1170	834,29 ± 8,23	96,69	11,59

Tabelul nr. 4

Variabilitatea dimensională somatică a muncitorilor din sectorul Curățitorie

Nr. crt.	Dimensiuni somatice	N	Valori extreme	$\bar{x} \pm m$	$\pm \sigma$	CV
1	Greutatea	127	44— 118	66,31 ± 1,01	11,43	17,24
2	Statura	127	1515— 1825	1663,04 ± 5,99	67,50	4,06
3	Înălț. șezindă	127	785— 970	857,56 ± 2,99	33,67	2,99
4	Lung. membr. inferior	127	680— 890	780,06 ± 4,19	47,20	6,05
5	SST plan așezat	127	497— 645	574,48 ± 2,45	27,64	4,81
6	XY plan așezat	127	300— 440	377,65 ± 2,01	22,69	6,01
7	Înălț. anterioară torace	127	147— 296	195,85 ± 1,84	20,71	10,57
8	Diam. ant.-post. toracic	127	185— 290	216,39 ± 1,69	19,05	8,80
9	Diam. biacromial	127	310— 438	374,66 ± 1,93	21,73	5,80
10	Diam. biliac	127	208— 390	294,50 ± 2,01	22,56	7,66
11	Circ. torace repaus	127	790— 1180	915,56 ± 5,52	62,24	6,80
12	Circ. abdomen	127	660— 1300	849,50 ± 8,80	99,14	11,67

Din punctul de vedere al structurii constituțional-somatice se înregistrează (tabelul nr. 5) predominanța tipului constituțional longilin (49,3%), urmat de tipul constituțional brevilin (39,7%). Se semnalează o mai bună toleranță termică de către tipul constituțional longilin micro-morf, caracterizat prin cea mai mică suprafață corporală medie (1,613), cea mai mică greutate și cel mai mic indice de plenitudine corporală (1,31). Tipurile constituționale breviline, indiferent de gradul de dezvoltare, se caracterizează prin greutate și indicii de plenitudine corporală Rohrer semnificativ mai mari față de tipurile longiline.

În ceea ce privește dinamica tipurilor constituționale în funcție de vîrstă, se semnalează că, pe măsura înaintării în vîrstă, au loc o descreștere a

frecvenței tipului constituțional longilin și o creștere a frecvenței tipului constituțional brevilin. Se semnalează că pentru prima clasă de vîrstă de 20—29 de ani predominanța tipului constituțional longilin este apre-

Tabelul nr. 5

Variabilitatea unor dimensiuni și indici conformativi somatici în funcție de tipul constituțional

Tipul constituțional	Supr. corp.	Statura	Greutatea	Ind. Rohrer
Longilin megamorf	1,836	1730,74	70,64	1,37
Longilin micromorf	1,613	1635,46	57,04	1,31
Brevilin megamorf	1,861	1687,00	75,79	1,59
Brevilin micromorf	1,686	1628,75	62,40	1,45

ciabilă (70,2%). Dinamica frecvenței tipurilor constituționale în funcție de vechimea în profesie indică de asemenea preponderanța într-o măsură mai mare sau mai mică a tipului constituțional longilin pentru toate clasele de vechime (tabelele nr. 6 și 7).

Tabelul nr. 6

Dinamica tipurilor constituționale pe clase de vîrstă

Tipul constituțional	20—29 ani		30—39 ani		40—49 ani	
	N	%	N	%	N	%
Longilini	66	70,2	46	53,5	75	50,6
Brevilini	28	29,8	40	46,5	73	49,4

Tabelul nr. 7

Dinamica tipurilor constituționale pe clase de vechime în profesie

Tipul constituțional	x — 9 ani vechime		10 — 14 ani vechime		15 — 19 ani vechime		20 — 25 ani vechime	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Longilini	62	69,7	42	60,0	46	53,5	54	51,4
Brevilini	27	30,3	28	40,0	40	46,5	51	48,6

În ceea ce privește simptomatologia intoleranței la căldură, se consemnează că tipurile constituționale longiline prezintă cea mai scăzută frecvență pentru simptomele cercetate, indiciu al unei mai bune adaptări la condițiile de muncă din turnătorie. Nu s-a găsit o corelație satisfăcătoare între patologia profesională și tipologia constituțională.

Deși se înregistrează predominanța tipului constituțional longilin în sectoarele expuse temperaturilor ridicate, toleranța la căldură pare să fie corelată mai mult cu gradul de dezvoltare al tipurilor constituționale.

RECHERCHES ANTHROPOLOGIQUES SUR LA CONSTITUTION OCCUPATIONNELLE DANS LES SECTEURS SOUMIS AUX TEMPÉRATURES ÉLEVÉES

RÉSUMÉ

Le présent travail représente des études orientées, pour la première fois, vers une recherche anthropologique de la constitution occupationnelle des travailleurs qui mènent leur travail dans les conditions de stress thermique d'une fonderie d'acier.

En partant de l'idée que la tolérance à la chaleur a une détermination constitutionnelle et que les conditions de microclimat représentent les principaux facteurs sélectifs dans l'adaptation de l'organisme à un certain genre de travail, on signale une tolérance thermique meilleure pour le type de constitution longiligne micromorphe, par rapport aux autres types constitutionnels.

Si le type constitutionnel longiligne est prédominant pour toutes les classes d'âge et d'ancienneté dans la profession, la tolérance à la chaleur paraît être mieux corrélée avec le degré de développement des types constitutionnels.

*Institutul „Dr. V. Bădăș”,
Laboratorul de antropologie București*

STRUCTURA OCUPAȚIONALĂ ȘI MEDIUL SOCIAL-ISTORIC ÎN METODOLOGIA CERCETĂRII AXIOLOGICE A CULTURII POPULAȚIILOR DIN BEREVOEȘTI ȘI CÎMPULUNG (JUD. ARGEȘ)

DE

VASILE V. CARAMELEA și CEZARA MIHĂESCU

572.025/.026

Structura ocupațională constituie unul dintre elementele incluse în conținutul mediului social-istoric, în cadrul căruia se explică valorile sistemului socio-cultural al oricărei comunități umane. Cercetările de specialitate de până acum au relevat că dominanța valorilor orientative ale culturii unei comunități variază nu numai în funcție de ecologie, de mediul urban sau rural, de dezvoltarea unei populații, de sex și de grupa de vîrstă a căreia îi aparțin indivizii cercetați, ci și după ocupația lor.

În acest scop s-a întreprins cercetarea structurii ocupaționale a două comunități sociale, satul Berevoești și orașul Cîmpulung.

La origine, aceste două comunități umane învecinate au cunoscut forma socială a *obștii agrare*. Amîndouă au fost așezări de țărani liberi, moșneni, cu teritoriile alăturate, două grupe de populație care se ocupau în principal de cultivarea pămîntului și creșterea animalelor.

Ulterior, comunitatea socială cîmpulungeană începe să se diferențieze ocupațional de comunitatea berevoeșteană. Astfel, în timp ce satul Berevoești continuă să rămînă o comunitate cu o structură ocupațională agricolă, Cîmpulungul se transformă într-un „oraș-tîrg”, în structura lui ocupațională începînd să dețină ponderea principală *negustorimea și meșteșugăria*. Această structură ocupațională, care caracterizează îndeosebi Cîmpulungul medieval, mai este încă „proiectată pe sol”, cum spune sociologul german Georg Simmel sau istoricul francez Albert Grenier.

Cîmpulungenii disting și astăzi în organizarea istorică teritorială a vetrei vechi a orașului străzile și „mahalalele”, devenite cartiere destul de centrale ale urbei lor : „Olari”, „Șubari” („Șubești”), „Tabaci”, „Fierari” etc., care păstrează și amintirea vechilor bresle ale acestui oraș. Alături de ele se mențin și vestigiile străvechei structuri ocupaționale de agricultori, păstrate, și deci mărturisite, prin existența unei „cooperative agricole de producție” a orașului Cîmpulung.

Atit orașul Cîmpulung, cit și satul Berevoești cunosc în prezent un rapid și intensiv proces de *industrializare socialistă*, cu o economie dezvoltată planificat.

Dezvoltarea procesului de industrializare este reflectată, între altele, de transformările ce au loc în structura ocupațională, prin creșterea

ponderii ce o deține populația ocupată în sectorul industrial concomitent cu diminuarea ponderii lucrătorilor din agricultură.

Apare și se dezvoltă și un proces de *modernizare*, care în dinamica lui este reflectat, între altele, de indicatorul „servicii sociale”. Acest indicator are o pondere din ce în ce mai mare în structura ocupațională pe seama diminuării volumului populației ocupate în sectorul agricol.

În intervalul 1973–1975, când la Cîmpulung și Berevoești, în baza unei colaborări internaționale, au fost efectuate cercetări asupra sistemului de valori al populației, s-a urmărit, în cadrul mediului social-istoric, și dinamica structurii ocupaționale (tabelul nr. 1).

Tabelul nr. 1

Dinamica structurii ocupaționale (%) a populației din Berevoești și Cîmpulung în intervalul 1973–1975

Sector de activitate	Anii					
	1973		1974		1975	
	Cîmpulung	Berevoești	Cîmpulung	Berevoești	Cîmpulung	Berevoești
Industrie și construcții	63,0	48,0	62,0	61,0	59,0	71,0
Agricultură	5,0	42,0	4,0	31,0	4,0	20,0
Servicii sociale	32,0	10,0	34,0	8,0	37,0	9,0

Urmărind datele înscrise în tabel, se constată că în 1975 populația care lucrează în agricultură reprezintă un procent scăzut atât la Berevoești, cât și la Cîmpulung, majoritatea locuitorilor fiind ocupați în industrie și în servicii sociale. De remarcant că la Berevoești ponderea populației din industrie crește semnificativ, atingând în decurs de numai doi ani 71%.

La Cîmpulung se înregistrează o creștere deosebită a ponderii populației din sectorul „servicii sociale”, la care apelează în egală măsură atât locuitorii orașului, cât și cei ai satului Berevoești, mulți dintre ei muncitori navetiști. Așa se explică de ce sectorul „servicii sociale” deține la Berevoești în structura ocupațională a satului o pondere mică și totodată staționară.

Cercetarea axiologică a culturii populațiilor din comunitățile Cîmpulung și Berevoești a evidențiat, în primul rînd, un proces de modernizare prin transformarea sau schimbarea în cadrul sistemului socio-cultural a unor valori dominante.

În al doilea rînd, a fost relevat, ca expresie a unor valori focale, un proces de *omogenizare* a celor două subculturi, una urbană (Cîmpulung) și alta rurală (Berevoești), contribuindu-se la realizarea unui „pattern cultural” tot mai unitar, la structura uneia și aceleiași personalități de bază a populației din zona cercetată.

Procese de modernizare și de omogenizare au fost puse în evidență prin cercetări întreprinse și în alte zone ale țării, ca Argeș, Suceava, Dîmbovița, Țara Oașului, Țara Oltului, Mărginimea Sibiului etc. Prin comparații interzonale se deduce tendința de realizare a unei configurații culturale al cărei specific va reflecta pe deplin „caracterul național” al poporului român. Unele direcții în care se efectuează analiza materiale-

lor de teren implică, între altele, cunoașterea structurii ocupaționale.

În concluzie, din nevoi de ordin metodologic, pentru a pune în valoare gnoseologică datele de ordin axiologic socio-cultural, antropologii sociali și sociologii comparatiști trebuie să asocieze, la studiul valorilor culturii, studiul structurii ocupaționale. Se impune alcătuirea și asigurarea eșantioanelor de populație reprezentative pentru cercetarea concretă a valorilor culturii unui grup uman, interpretarea corectă a rezultatelor cercetării, explicarea științifică a anumitor procese ce apar și se dezvoltă.

De altfel, aproape toate instrumentele de cercetare axiologică a culturii cuprind în structura lor indicatori pentru cunoașterea, odată cu valorile, și a structurii ocupaționale a comunității cercetate.

LA STRUCTURE OCCUPATIONNELLE ET LE MILIEU SOCIO-HISTORIQUE DANS LA MÉTHODOLOGIE AXIOLOGIQUE DE LA CULTURE DES POPULATIONS HABITANT BEREVOEȘTI ET CÎMPULUNG (DÉP. d'ARGÈŞ)

RÉSUMÉ

La structure occupationnelle est un des facteurs constitutifs du milieu social historique par lequel on peut expliquer le système des valeurs socio-culturelles de toute collectivité humaine.

Parmi les recherches à caractère international concernant le système des valeurs, effectuées au cours des années 1973 — 1976 à Berevoești et Cîmpulung, il faut mentionner en premier lieu l'observation de la dynamique de la structure occupationnelle. Cette direction dans l'activité des recherches non seulement a assuré le concret de celle-ci et, au point de vue méthodologique, des échantillons représentatifs pour les deux populations, mais a servi aussi à expliquer et à motiver scientifiquement le niveau du développement des processus d'industrialisation, de modernisation et d'homogénéisation des subcultures urbaine et rurale, ainsi que la tendance vers une configuration culturelle remarquable par la spécificité nationale.

Au point de vue gnoséologique, l'étude axiologique exige donc, de la part des anthropologues et sociologues comparatistes, une étude sur la dynamique de la structure occupationnelle dans le milieu social historique des populations observées.

BIBLIOGRAFIE

1. ANGHEL REMUS, *The pilot stations part in achieving the researches programme of the romanian social and cultural anthropology. Theories and methodes*, Ann. roum. Anthropol., 1973, 10, 103—109.
2. BANKS PENDLETON E., *Value orientations and industrialization among yugoslav peasants*, Amer. anthropol. Ass., 1968.

3. BANKS PENDLETON EUGENE, *Values and cultural ecology in a rapidly modernizing district in Romania*, American Anthropological Association annual meeting, Mexico City, November, 1974.
4. CĂRAMELEA V. VASILE, *Orientări de valoare în configurația culturii grupurilor umane „stație-pilot” Cîmpulung și Berevoești*, Universitatea din București, Laboratorul sociologic, Caiete de studii, referate și dezbateri, 1975, 6.
5. CĂRAMELEA V. VASILE, GEANĂ GH., PLOEȘTEANU GEORGETA, *An integralist dynamic anthropological inquiry on a changing culture. The experimentation a theoretical-methodological model in two romanian pilot stations*, Southern Anthropological Society, Florida, 1975.
6. GEANĂ GH., *Theoretical methodological aspects in the study of the national character of the romanian people. Experiment of cultural anthropology carrying out in the pilot stations Cîmpulung-Muscel and Berevoești-Argeș*, Ann. roum. Anthropol., 1973, 10, 95—101.
7. ZAMFIR ELENA, *Characterul sistemic al cercetărilor antropologice din „stațiile-pilot” Berevoești și Cîmpulung*, St. cerc. antropol., 1973, 10, 221—226.

Institutul „Dr. V. Babeș”,
Laboratorul de antropologie București

INDICATORI ÎN DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII DE COMUNICARE LA COPII

DE
ION OPRESCU

572.026 : 616 - 053.2

În cadrul temei de cercetare „Creștere și dezvoltare” am efectuat investigații de antropologie cultural-lingvistică cu metodele și tehnicile de lucru cunoscute ale acestei discipline. Conceptul de la care am pornit a fost relația limbă—gîndire—cultură. Am urmărit cum se dezvoltă la nivelul întregului grup mijloacele de comunicare verbale și neverbale. Menționăm că în comportamentul comunicațional al școlărilor mici există încă urme din perioada preșcolară; ei continuă să uzeze, spre exemplu, mijloace de comunicare neverbale (dar și verbale), anumite modulații ale vocii, pauze etc.

Am prelucrat datele obținute pe baza probelor de limbă culese de la un eșantion, format din 28 de elevi (14 băieți și 14 fete), în două serii, și anume în 1975, cînd erau în clasa I, și în 1976, cînd erau în clasa a II-a. Aceste două seturi le-am comparat între ele după următorii indicatori: 1) viteza de vorbire; 2) măsurarea comunicării, abilitatea de comunicare sau densitatea semantică; 3) coeficientul de redundanță; 4) frecvența calificativelor și a diminutivelor.

Viteza de vorbire crește în clasa a II-a față de clasa I. Reține atenția viteza de vorbire mai mare a fetelor față de băieți, aspect comparabil cu eșantioanele de adulți în care cercetările atît din țară cît și din străinătate au arătat că femeile vorbesc mai repede decît bărbații.

Tabelul nr. 1

Viteza de vorbire

Data recoltării probelor	Sexul	Număr total cuvinte	Timpul (secunde)	Viteza, cuvinte pe minut
Cl. I (1975)	băieți	407	411	59,40
	fete	388	365	63,78
	T o t a l	795	776	59,88
Cl. II (1976)	băieți	347	291	71,52
	fete	587	421	83,64
	T o t a l	934	712	78,66

Măsurarea comunicării (abilitatea de comunicare sau densitatea semantică) se obține raportînd numărul total de substantive și verbe la numărul total de cuvinte.

Abilitatea de comunicare scade de la un an la altul ; fetele se dovedesc mai constante (0,358—0,367). De menționat că indicii scad sub media abilității de comunicare pe care am calculat-o pentru eşantioanele de adulți (0,420). Rămâne de văzut cum vor evolua în anul următor.

Tabelul nr. 2
Abilitatea de comunicare

Data recoltării probelor	Sexul	Număr total cuvinte	T o t a l subst. + verbe	Abilitatea de comunicare	Subst.+verbe fără repet.	Abilitate fără repet.
Cl. I (1975)	băieți	407	184	0,452	142	0,348
	fete	388	139	0,358	109	0,280
	T o t a l	795	323	0,406	251	0,315
Cl. II (1976)	băieți	347	141	0,406	120	0,345
	fete	587	216	0,367	186	0,316
	T o t a l	934	357	0,382	306	0,285

Dacă facem însă raportul dintre numărul total de cuvinte și numărul de substantive și verbe ce nu se repetă, vom constata că abilitatea de comunicare scade în general, dar crește la fete, ceea ce ne-ar putea sugera ideea unei mai rapide dezvoltări intelectuale a fetelor.

Coefficientul de redundanță l-am calculat după următoarea formulă : numărul de substantive plus verbe înmulțit cu 100, împărțit la numărul total de cuvinte. Socotind că substantivele și verbele poartă greutatea încărcăturii semnificative, am însumat acele substantive și verbe care se repetă în discursul aceleiași subiect. Rezultatele obținute par expresive.

Tabelul nr. 3
Coefficienul de redundanță

Data recoltării probelor	Sexul	Subst. + verbe care se repetă	Număr total cuvinte	Coefficientul de redundanță
Cl. I (1975)	băieți	42	407	10,31
	fete	30	388	7,73
	T o t a l	72	795	9,05
Cl. II (1976)	băieți	21	347	6,05
	fete	69	587	11,75
	T o t a l	90	934	9,63

Coefficientul de redundanță crește pe total nesemnificativ de la un an la altul ; în schimb scade la băieți de la 10,31 la 6,05 (cu aproximativ 40% !) și crește la fete de la 7,73 la 11,75 (cu circa 35% !).

Freevența calificativelor și a diminutivelor. Ne-a surprins faptul că în datele culese în 1975, deci în clasa I, într-un total de 795 de cuvinte existau numai 7 calificative (adjective și verbe). În schimb am înregis-

trat 58 de diminutive. În clasa a II-a se înregistrează 23 de calificative și 51 de diminutive, deci o ușoară scădere a acestora din urmă și o triplare a calificativelor. Se remarcă o îmbogățire a mijloacelor de comunicare fără să se renunțe la marca virstei, diminutivul.

Tabelul nr. 4
Calificative și diminutive

Data recoltării probelor	Sexul	Număr total cuvinte	Calificative	Diminutive
Cl. I (1975)	băieți	407	2	37
	fete	388	5	21
	T o t a l	795	7	58
Cl. II (1976)	băieți	347	4	25
	fete	587	19	26
	T o t a l	934	23	51

CONCLUZII

Comparativ cu viteza medie de vorbire la eșantioanele de adulți, copiii au o viteză mai scăzută (78 de cuvinte pe minut la copii față de 86 de cuvinte pe minut la adulți). Fetele vorbesc mai repede decât băieții, dar mai redundant. Abilitatea de comunicare scade în clasa a II-a. Remarcăm relativa abundență a diminutivelor și creșterea marcată a numărului de calificative în clasa a II-a față de clasa I.

Putem afirma existența la nivelul mijloacelor de comunicare verbale (viteza de vorbire și coeficientul de redundanță) a unui dimorfism sexual, care apare în clasa a II-a, deci în jur de 8 ani. Acest dimorfism mai poate fi semnalat și la alți indicatori.

Compararea datelor obținute pe copii cu cele obținute pe adulți arată cum la anumiți indicatori copiii nu au atins performanțele adulților (ex. viteza de vorbire), iar la alți indicatori cifrele medii de la adulți au scăzut în clasa a II-a față de clasa I (ex. abilitatea de comunicare).

Socotim că instrumentele de măsură prezentate satisfac urmărirea, din unele unghiuri ale antropologiei cultural-lingvistice, a procesului de creștere și dezvoltare a copiilor ; datele și rezultatele noastre sînt corelabile cu ale altor ramuri de cercetare ale antropologiei.

INDICATORS FOR THE DEVELOPMENT OF THE MEANS OF COMMUNICATION WITH CHILDREN

SUMMARY

The work points out four indicators to be used in studying the development of the means of communication with a child group, based on language samples. Here are the indicators : 1. The speed of speech. 2. The


measurement of the ability of communication or semantic density. 3. The coefficient of redundance. 4. The frequency of the qualifiers (adjectives and adverbs) and diminutives.

Out of the results of our research, we mention the difference between boys and girls starting by the age of 8; the comparison with the adult sets shows that children do not come to the performances of the grown-up sets, etc.

BIBLIOGRAFIE

1. OPRESCU I., *Cercetarea mijloacelor de comunicație interumane*, Forum, Științe sociale, 1971, 2.
2. OPRESCU I., *Materii prime și tehnici de lucru ale cercetărilor concrete de antropologie cultural-lingvistică*, *Varia anthropologica*, 1973, 3.
3. OPRESCU I., *The contribution of Romanian Cultural-Linguistic Anthropology to the Complex Study of Modern Population*, in *Language and Man*, Mouton, Haga-Paris, 1976.
4. OPRESCU I., SĂHLEANU V., *Cercetări comparative asupra vitezei de vorbire*, *St. cerc. antropol.*, 1974, 1.
5. SĂHLEANU V., OPRESCU I., *Antropologia cultural-lingvistică. I. Principii, metode, probleme*, *St. cerc. antropol.*, 1972, 1.

*Institutul „Dr. V. Babeș”,
Laboratorul de antropologie București*



Dr. SUZANA GRINȚESCU-POP

1908—1977

Comitetul de redacție al revistei „Studii și cercetări de antropologie” anunță cu multă durere greaua pierdere suferită de antropologia românească prin moartea fulgerătoare, în urma cutremurului din 4 martie 1977, a unuia dintre membrii fondatori ai comitetului nostru, dr. Suzana Grințescu-Pop.

Născută în 25 noiembrie 1908, la Geneva, unde — pe atunci — mama sa, Alice Grințescu, născută Rodrigues, doctor în științe biologice, era șef de lucrări la Universitatea din Geneva, iar tatăl său, renumitul profesor de botanică de mai târziu, Ioan Grințescu, funcționa în cadrul aceleiași universități din Geneva, Suzana Grințescu-Pop și-a făcut studiile universitare, apoi și doctoratul în științe biologice, specialitatea antropologie, la profesorul Eugène Pittard, figură predominantă a antropo-

logiei internaționale, mare prieten și cetățean de onoare al statului român, membru de onoare al Academiei Române, aceasta ca o recunoaștere a meritelor sale în dovedirea deplinei unități de sine, deci și de origine, dintre românii din Transilvania și românii din Vechiul Regat, numeroasele sale contribuții științifice fiind depuse de statul român ca document de bază în susținerea cererii noastre de alipire a Transilvaniei la patria-mumă, cu prilejul lucrărilor Tratatului de pace de la Trianon (1920).

După susținerea cu deosebit succes a tezei de doctorat cu un subiect care reprezenta o contribuție științifică la un program internațional de elucidare a „problemei-enigmă” a originii boșimanilor, Suzana Grințescu-Pop se înapoiază în țară, la Cluj, unde, în lipsa unui post de antropolog, care pe atunci nu exista în rețeaua de cercetare, colaborează o vreme în mod benevol cu profesorii Victor Papilian, președintele și fondatorul Societății române de antropologie din Cluj, Marton Roșka, primul sistematizator de consacrare internațională a paleoliticului românesc, și Romulus Vuia, fondatorul etnologiei românești.

Atît lipsa unei posibilități de utilizare ca antropolog, cît și concepția sa ecologică despre rostul și organizarea unei vieți sub raportul a ceea ce astăzi numim „calitatea vieții” o determină pe Suzana Grințescu-Pop să nu accepte orice fel de utilizare pînă în anul 1950, cînd, odată cu reorganizarea antropologiei naționale, acad. Șt.-M. Milcu o cheamă la fostul Institut de antropologie „Fr.-I. Rainer”, unde continuă să activeze din 1950, apoi și în noua formulă a Centrului de cercetări antropologice, rămînînd în mod practic în activitate aici pînă la sfîrșitul vieții sale, putînd fi considerată în mod justificat drept unul dintre membrii fondatori ai școlii antropologice românești.

Ca om de știință cu multă forță de creație, Suzana Grințescu-Pop a contribuit în mod decisiv la fundamentarea și organizarea cercetărilor de antropologie contemporană, distingîndu-se în mod deosebit în cercetări de rezonanță națională și internațională, privind biologia dezvoltării fizice a nou-născutului, a antropologiei etnice, prin metodologia și prima sinteză bazată pe procedee originale asupra ciclurilor de forme etnice ale populațiilor românești, a antropologiei muncii cu probleme de selecție și adaptabilitate profesională și, în sfîrșit, deschiderea pentru țara noastră a vastului front de lucru al antropologiei industriale, prin asimilarea tehnicilor ergonomico-antropologice moderne și, consecutiv, prin realizarea primei acțiuni de prospectare ergonomico-antropologică a României.

Prin dispariția aceleia care a fost dr. Suzana Grințescu-Pop, membru a numeroase asociații de specialitate din țară și străinătate, antropologia românească pierde nu numai un excepțional om de știință, dar și un om de o rară probitate științifică, de o neegalată putere de muncă, dublată de o mare sensibilitate și bunătate sufletească.

Colegiul de redacție, colegii din cercetare și toți elevii săi îi vor păstra întotdeauna o amintire caldă Suzanei Grințescu-Pop, care, peste vremuri, va rămîne o măsură a seriozității și a dăruirii pentru binele altora.

OPERA ȘTIINȚIFICĂ A DR. SUZANA GRINȚESCU-POP

Lucrări proprii, ca prim semnatar și în colaborare

1. *Une nouvelle station magdalénienne dans la Dordogne : recourbie II*, Buletinul Societății de științe din Cluj, 1931, t. VI, p. 326—352.
2. *Le développement du crâne en fonction de la taille et du buste chez les roumains*, Buletinul Societății de științe din Cluj, 1931, t. VI, p. 39—53.
3. *Le développement de la face en fonction de la taille et du buste chez les roumains*, Buletinul Societății de științe din Cluj, 1932, t. VI, p. 481—508.
4. *Contribution à l'étude anthropologique du fémur des boschimans*, thèse présentée à la Faculté des sciences de l'Université de Genève pour l'obtention du grade de docteur ès sciences biologiques, thèse no. 926, Laboratoire d'Anthropologie — Prof. Eugène Pittard, Ed. Albert Kundig, Genève, 1933, p. 1—87.
5. *Studiu asupra indicelui orbital*, Dare de seamă a Societății române de antropologie din Cluj, 1933/1934.
6. *Considerațiuni asupra unui frontal de craniu preistoric*, Dare de seamă a Societății de antropologie din Cluj, 1934/1935.
7. *Proiect pentru crearea unui CENTRU DE STUDIU AL CREȘTERII*, 1950, Arhiva de manuscrise a Laboratorului de antropologie din București, nr. 326/1977, p. 1—7.
8. *Țara Loviștei și concepția unei anchete antropologice în lumina experienței de teren*, 1951, Arhiva de manuscrise a Laboratorului de antropologie din București, nr. 327/1977, p. 1—19, 18 anexe.
9. *Asupra unei lame de silex neolitic din stațiunea Boișoara — Țara Loviștei*, Arhiva de manuscrise a Laboratorului de antropologie din București, nr. 339/1977, p. 1—3.
10. *Dare de seamă asupra activității științifice pe anul 1951 a colectivului de antropologie pe viu, din Institutul de antropologie „Fr.-I. Râiner”*, Arhiva de manuscrise a Laboratorului de antropologie din București, nr. 332/1977, p. 1—17.
11. *Dare de seamă asupra peregrinării Hațeg-Pădureni*, Arhiva de manuscrise a Laboratorului de antropologie din București, nr. 328/1977, p. 1—19.
12. *Orientarea cercetărilor științifice de antropologie. Bazele teoretice ale cercetărilor de antropologie contemporană, specificul antropologic al cercetărilor, colaborarea antropologiei contemporane cu celelalte discipline antropologice ale colectivului de antropologie*, Arhiva de manuscrise a Laboratorului de antropologie din București, nr. 338/1977, p. 1—10.
13. *Dezvoltarea fizică a nou-născutului din București*, Probleme de antropologie, 1956, vol. II, p. 129—147.
14. *Variabilitatea caracterelor metrice ale nou-născutului și semnificația ei biologică din punct de vedere filogenetic și ontogenetic*, Probleme de antropologie, 1956, vol. II, p. 181—197.
15. *Variabilitatea dimensională a nou-născutului în funcție de condițiile de mediu. Aspecte generale*, Probleme de antropologie, 1957, vol. III, p. 161—175.
16. *Variabilitatea dimensională a nou-născutului în funcție de condițiile de mediu. Aspecte corelative*, Probleme de antropologie, 1957, vol. III, p. 175—191.
17. *Contribuție la studiul antropologic al populației din bazinul superior al Bistriței. Studiul antropologic al populației din comuna Hangu*, Probleme de antropologie, 1957, vol. III, p. 255—298.
18. *Considération sur la structure anthropologique de la population des Carpathes Orientales Roumains (Versant Est)*, Sborník sjezdových materiálů, I. Sjezdu ČSL Antropologů, Československá Akademie věd — Slezský ústav Opava, 1958, p. 199—200.
19. *Tipul antropologic*, în *Cercetări antropologice în Țara Hațegului, Clopoliva. Monografie*, sub îngrijirea acad. Șt.-M. Milcu și prof. Horia Dumitrescu, Edit. Acad. R.P.R., București, 1958, p. 67—183.
20. *Contribuție la studiul variabilității conformației corporale a nou-născutului, în funcție de condițiile de dezvoltare*, Probleme de antropologie, 1959, vol. IV, p. 233—245.
21. *Le dimorphismes sexuel chez le nouveau-né, dimensions et proportions*, Actes du VI-e Congrès International des Sciences Anthropologiques et Ethnologiques, Paris, 1960, Musée de l'Homme, t. I., p. 157—162.
22. *Contribuții la studiul dimorfismului sexual (Populația dinaro-nordică de pe Valea Bistriței Moldovenești — satul Buhalnița)*, Probleme de antropologie, 1960, vol. V, p. 171—182.

23. *Factori importanți în viața omului. Observații pe gemeni uni- și bivitelini, timp de 25 de ani, referat asupra lucrării „Wirksame Faktoren im Leben des Menschen Beobachtungen an ein- und zweieigen Zwillingen durch 25 Jahre”, de Otmar Frhr. von Verschuer, Franz Steiner Verlag, GmbH, Wiesbaden, 1954, Arhiva de manuscrise a Laboratorului de antropologie din București, nr. 330/1977, p. 1–31.*
24. *Faciesul antropologic al satului Alun, Ținutul Pădurenilor, regiunea Hunedoara, Probleme de antropologie, 1961, vol. VI, p. 111–156.*
25. *Dimorfismul sexual al nou-născutului în relația sa ontogenetică cu a-cultura. Dimensiuni și proporții, Probleme de antropologie, 1963, vol. VIII, p. 57–76.*
26. *An anthropological study of the Bulgarians of Vinga village, Bănal, Academia de științe bulgară, Buletinul Institutului de morfologie, 1963, t. VII, p. 109–147.*
27. *Sesiunea națională de antropologie (1962), comunicări de antropologie contemporană, Contribuții la studiul procesului de dinarizare (Valea Bistriței Moldovenești), St. cerc. antropol., 1964, t. I, nr. 1, p. 109.*
28. *Contribution à l'étude de la relation entre la variabilité et le processus de différenciation de la conformation hypsicéphale des dinarides, Ann. Roum. Anthropol., 1964, t. I, p. 55–64.*
29. *Contribution à l'introduction de quelques méthodes statistiques dans la pratique stomatologique (Reconstitution des dimensions verticales du visage en vue de l'exécution des prothèses dentaires), Ann. Roum. Anthropol., 1964, t. I, p. 121–124.*
30. *Contribuții la studiul relației dintre variabilitate și procesul de diferențiere a conformației hipsicefale la dinarizi, St. cerc. antropol., 1964, t. I, nr. 1, p. 89–97.*
31. *Le dimorphisme sexuel du nouveau-né dans son rapport ontogénétique avec l'adulte, Ann. Roum. Anthropol., 1964, t. I, p. 89–108.*
32. *Contribuție la studiul relației dintre dimorfismul sexual dimensional cefalic și structura taxonomică, St. cerc. antropol., 1965, t. II, nr. 2, p. 229–240.*
33. *Contribution à l'étude de la relation entre le dimorphisme sexuel dimensionnel céphalique et la structure typologique, Ann. Roum. Anthropol., 1965, t. II, p. 119–131.*
34. *Morfograma taxonomică. Dimensiuni, St. cerc. antropol., 1965, t. II, nr. 1, p. 151–159.*
35. *Probleme der psycho-sozialen und morphophysiologischen menschlichen Anpassungsfähigkeit im Industrialisierungsmedium Rumäniens, Ann. Roum. Anthropol., 1966, t. III, p. 3–8.*
36. *Contribution à la détermination du faciès anthropologique des populations contemporaines de Roumanie, Ann. Roum. Anthropol., 1966, t. III, p. 47–64.*
37. *Contribuții la studiul diferențierii morfologice a unui lot de forestieri în funcție de profilul de muncă, St. cerc. antropol., 1966, t. III, nr. 1, p. 145–154.*
38. *Le type anthropologique de la population des villages de Șimon et de Moeciu de Jos, Ann. Roum. Anthropol., 1967, t. IV, p. 47–52.*
39. *Contribuții la studiul adaptării femeii la muncă și modul de viață din societatea industrială. Nota I: Cercetări de antropologie fizică, socială și culturală la întreprinderea „Textila” — Pitești (Reg. Argeș), St. cerc. antropol., 1967, t. IV, nr. 2, p. 221–233.*
40. *Contribuții în vederea unei antropologii a muncii, fizică, socială și culturală. Câteva date privind grupurile tradiționale agricole din satele Berevoești-Pămînteni și Berevoești-Ungureni, Argeș, care se încadrează în munca minieră, St. cerc. antropol., 1967, t. IV, nr. 1, p. 135–141.*
41. *Contributions à l'étude de l'action des conditions de développement sur le dimorphisme sexuel du nouveau-né, VII^e Congrès international des Sciences Anthropologiques et Ethnologiques, Moscou, 1964, Izdatelstvo „Nauka”, 1967, vol. II, p. 136–138.*
42. *Asupra unor fenomene de microevoluție observate în populația actuală a României, St. cerc. antropol., 1967, t. IV, nr. 2, p. 175–185.*
43. *Sur les phénomènes de la microévolution observée dans la population actuelle de la Roumanie, Mitt. d. Sekt. Anthrop., 1967, Heft 21, p. 43–60.*
44. *Studiul antropologic al populației din câteva sate din Muntenia, situate în bazinele Argeșului și Teleajenului, St. cerc. antropol., 1967, t. IV, nr. 1, p. 63–92.*
45. *Tipul antropologic al populației de la Șimon, St. cerc. antropol., 1967, t. IV, nr. 1, p. 44–47.*
46. *Contribuții la studiul diferențierii morfologice a unui lot de forestieri, în funcție de profilul de muncă. Nota II: Profilul de muncă — factor selectiv și modelator al conformației morfologice, St. cerc. antropol., 1967, t. IV, nr. 1, p. 143–150.*
47. *Contribuții la studiul diferențierii morfologice în funcție de profilul de muncă. Nota III: Selecție și adaptabilitate, St. cerc. antropol., 1967, t. IV, nr. 2, p. 235–239.*
48. *Contribution à l'étude de la différenciation somatique en fonction du spécifique de travail chez un lot d'ouvriers forestiers, Ann. Roum. Anthropol., 1967, t. IV, p. 131–144.*

49. *Contribution à l'étude du processus de dinarisation*, VII-e Congrès International des Sciences Anthropologiques et Ethnologiques, Moscou, 1964, Izdatelstvo „Nauka”, 1968, vol. III, p. 155–158.
50. *Contribution à l'étude des relations clinico-athropométriques du nouveau-né normal, en fonction de la durée de gestation*, Ann. Roum. Anthropol., 1968, t. V, p. 135–144.
51. *Tipul antropologic al populației din satul Fundata (Seria masculină între 20 și 60 de ani)*, St. cerc. antropol., 1968, t. V, nr. 2, p. 130–144.
52. *Contribuții la studiul procesului de accelerație a dezvoltării fizice a nou-născutului (Nota I)*, St. cerc. antropol., 1968, t. V, nr. 2, p. 233–238.
53. *Research adaptation to industrial activity of two groups of workers (Miners and woodcutters) from the same ecological zone (Valea Brătiei, Argeș)*, Ann. Roum. Anthropol., 1968, t. V, p. 127–133.
54. *Utilizarea antropometriei în ergonomie*, în *Ergonomia în construcții de mașini*, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, Oficiul de documentare și publicații tehnice, 1969, vol. I, p. 64–99.
55. *Contributions à l'étude du dimorphisme sexuel du développement physique du nouveau-né en fonction de la durée de gestation*, Proceedings VIIIth International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, Tokyo and Kyoto, 1968, vol. I, Anthropology, 1969, Science Council of Japan, p. 244–247.
56. *Antropologia aplicată în industrie*, St. cerc. antropol., 1969, t. VI, nr. 1, p. 109–125.
57. *Contribution à l'étude du dimorphisme sexuel du développement physique du nouveau-né en fonction de la durée de gestation*, Ann. Roum. Anthropol., 1969, t. VI, p. 143–156.
58. *Quelques données d'écologie, d'archéologie, d'histoire sociale et économique et d'anthropologie ethnique, concernant les groupes autochtones de la „Station-Pilote” de Berevoești*, Ann. Roum. Anthropol., 1969, t. VI, p. 63–73.
59. *Contribuție la studiul diferențierii somatice a unui lot de forestieri în funcție de profitul de muncă*, Lucrările Simpozionului de ergonomie cu aplicații în sectorul forestier, Centrul de documentare tehnică pentru economia forestieră, București, 1969, p. 127–132.
60. *Nivelul de dezvoltare fizică a nou-născutului din mediul urban și rural. Orașul București și teritoriul fostei regiuni București (1967)*, St. cerc. antropol., 1969, t. VI, nr. 2, p. 207–216.
61. *Tipul antropologic al populației satului Șirnea (Bran)*, St. cerc. antropol., 1970, t. VII, nr. 1, p. 38–41.
62. *Le type anthropologique de la population du village de Moeciu de Sus*, Ann. Roum. Anthropol., 1970, t. VII, p. 27–38.
63. *Fizionomia constituțională a populației din satul Șirnea (Bran)*, St. cerc. antropol., 1970, t. VII, nr. 2, p. 193–205.
64. *Tipul antropologic al populației Sohodol (Bran)*, St. cerc. antropol., 1971, t. VIII, nr. 1, p. 33–45.
65. *Fizionomia constituțională a populației din satul Sohodol (Bran)*, St. cerc. antropol., 1971, t. VIII, nr. 2, p. 165–173.
66. *The ontogenetic specificity of the acceleration in the newborns physical developments. Note I: Direct measurements*, Ann. Roum. Anthropol., 1971, t. VIII, p. 27–31.
67. *Contribution to the study of secular-trend phenomenon in the physical development of the newborn child*, Anthropological Congress dedicated to Aleš Hrdlička 1969, Praha, Humpolec, Praha 1971.
68. *Tipul antropologic al populației satului Măgura*, St. cerc. antropol., 1972, t. IX, nr. 1, p. 19–27.
69. *Fizionomia constituțională a populației masculine din satul Măgura – Culoarul Bran*, St. cerc. antropol., 1972, t. IX, nr. 2, p. 139–144.
70. *Spécificité onthogénétique du nouveau-né*, Rivista di antropologia, 1972/1973, vol. LVIII, p. 363–380.
71. *Realizări și perspective ale studiului de antropologie fizică al populației din zona Cîmpulung Muscel*, Comunicare la Simpozionul din Cîmpulung-Muscel, 1973, cu ocazia inaugurării „Stației-pilot Cîmpulung Berevoești”, Arhiva de manuscrise a Laboratorului de antropologie din București, nr. 331/1977, p. 1–6.
72. *Contribuție la prospectarea de ergonomie antropometrică a României*, St. cerc. antropol., 1973, t. X, nr. 1, p. 23–34.
73. *Contribuții la determinarea antropologică a fondului autohton al populației sătești din Hălchiu (Helsdorf)*, județul Brașov, St. cerc. antropol., 1973, t. X, nr. 2, p. 147–163.
74. *Accelerație și microevoluție. Studiu comparativ a două generații de studenți, 1929–1972*, St. cerc. antropol., 1973, t. X, nr. 1, p. 35–44.

75. *The level of physical development of the newborn in urban and rural environment and its sexual dimorphism. The town of Bucharest and the territory of the former Bucharest region (1967)*, Ann. Roum. Anthropol., 1973, t. X, p. 35—41.
76. *Supravegherea antropologică a populațiilor*, 1974, Arhiva de manuscrise a Laboratorului de antropologie din București, nr. 335/1977, p. 1—10.
77. *Ontogenic specificity of the newborn. Contribution to the biologic significance of the acceleration Process*, Ann. Roum. Anthropol., 1974, t. XI, p. 9—19.
78. *Tipul antropologic al populațiilor din Țara Birsei*, 1974, Arhiva de manuscrise a Laboratorului de antropologie din București, nr. 334/1977, p. 1—15.
79. *Paramètres ergonomiques pour la construction des tracteurs utilisés dans les exploitations forestières*, Simpozionul internațional de ergonomie aplicată, București, 1974, Arhiva de manuscrise a Laboratorului de antropologie din București, nr. 336/1977.
80. *Contribution à l'étude de la relation entre longévité, type anthropologique et pression sélective dans un climat de montagne de Roumanie*, Ann. Roum. Anthropol., 1975, t. XII, p. 31—36.
81. *Tipul antropologic al populației din satul Peștera — Culoarul Bran*, St. cerc. antropol., 1975, t. XII, p. 17—21.
82. *Acceleration microevolution and professional selection*, 1976, Arhiva de manuscrise a Laboratorului de antropologie din București, nr. 337/1977, p. 1—6.
83. *Consideration on several patterns of selective pressure existing in present-day human populations*, Lucrările celui de -al VI-lea Congres internațional al Societății de antropologie din Iugoslavia, Kranjska Gora, 1977.

LUCRĂRI APĂRUTE ÎN EDITURA ACADEMIEI
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

- MARIA CRISTESCU, Aspecte ale creșterii și dezvoltării adolescenților din
Republica Socialistă România, 1969, 287 p., 16,50 lei.
- OLGA NECRASOV, Originea și evoluția omului, 1971, 277 p., 28 lei.
- D. PROTASE, Riturile funerare la daci și daco-romani, 1971, 223 p., 21 lei.
- LIGIA BĂRZU, Continuitatea populației autohtone în Transilvania în secolele
IV - V, 1973, 309 p., 5 pl., 32 lei.
- DARDU NICOLĂESCU-PLOPȘOR, WANDA WOLSKI, Elemente de demo-
grafie și ritual funerar la populațiile vechi din România, 1975, 292 p.,
1 pl., 23 lei.

St. cerc. antropol., București, tomul 14, 1977

